

# МАТЕРІАЛЫ

КЪ ПОЗНАНІЮ ФАУНЫ И ФЛОРЫ  
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

---

ОТДѢЛЪ ЗООЛОГИЧЕСКІЙ.

---

ВЫПУСКЪ XIV.

---

*Съ 5-ью таблицами.*



МОСКВА.

Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К<sup>о</sup>. Пименовская ул., соб. д.  
1915.

## Материалы къ познанію птицъ Костромской губ.

Б. Д. Кирпичникова.

### ОТЪ АВТОРА.

В 1909 и 1910 года я посвятилъ изслѣдованію орнитологической фауны Костромской губерніи. Мною были посѣщены слѣдующіе уѣзды: Костромской, Буйскій, Галицкій, Нерехтскій, Кинешемскій, Юрьевецкій, Макарьевскій, Кологривскій, Ветлужскій и Варнавинскій; совершенно не обследованными остались Чухломскій и Солигалицкій уѣзды. Сборы производились исключительно лѣтомъ (съ мая до сентября), если не считать какого-нибудь десятка экземпляровъ, которые были добыты въ зимніе мѣсяцы; такимъ образомъ почти вся пролетная фауна осталась совершенно не затронутой мною.

Кромѣ собственной коллекціи, въ моихъ рукахъ были сборы, которые мнѣ любезно предоставилъ г. Волнухинъ (около 50 экзмп.). Такимъ образомъ въ моихъ рукахъ образовалась коллекція въ 480 экземпляровъ, которая и послужила матеріаломъ для настоящей статьи.

Прежде чѣмъ перейти къ фактической части работы, я хочу выразить свою искреннюю благодарность М. А. Мензбину за то содѣйствіе и помощь, которую онъ мнѣ любезно оказывалъ во время моихъ поѣздокъ по Костромской губерніи, и Императорскому Московскому Обществу Испытателей Природы — за предоставленные мнѣ открытые листы.

## ВВЕДЕНИЕ.

Общій очеркъ мѣстности.—Дѣленіе птицъ на категоріи по образу жизни.—  
Объ отношеніи Костромской губерніи къ подраздѣленіямъ Палеарктиче-  
ской области.

Костромская губернія расположена между  $56^{\circ}47'$  и  $59^{\circ}18'$  сѣверной широты и между  $9^{\circ}45'$ — $17^{\circ}22'$  восточной долготы отъ Пулковскаго меридіана. Главной рѣкой Костромской губерніи является Волга, которая протекаетъ по ея южной половинѣ въ направленіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ и дѣлитъ всю площадь на двѣ неравныя части, при чемъ южная или, вѣрнѣе, юго-западная часть является гораздо болѣе населенной, чѣмъ сѣверо-восточная или сѣверная часть. Изъ Волжскихъ притоковъ, начиная съ запада и идя на сѣверо-востокъ по теченію Волги, надо упомянуть слѣдующіе: рѣка Кострома, Немда, Унжа и Ветлуга. Я не перечисляю многочисленныхъ мелкихъ притоковъ и останавливаюсь только на болѣе крупныхъ. Рѣка Кострома вытекаетъ изъ Солигаличскаго уѣзда, гдѣ близъ границы Чухломскаго уѣзда находятся ея истоки; затѣмъ она протекаетъ по Буйскому и Костромскому уѣздамъ; Немда начинается въ Галичскомъ уѣздѣ, затѣмъ протекаетъ по Макарьевскому и здѣсь же впадаетъ въ Волгу; Унжа вытекаетъ изъ Вологодской губерніи и протекаетъ по Кологривскому и Макарьевскому уѣздамъ; Ветлуга начинается въ Вятской губерніи, затѣмъ течетъ по Ветлужскому и Варнавинскому уѣздамъ, при чемъ въ Волгу она впадаетъ уже въ Нижегородской губерніи. Всѣ четыре главныхъ притока впадаютъ въ Волгу съ лѣвой, сѣверной, стороны. Всѣ они имѣютъ большіе поемные луга, частью заросшіе кустарниками. Кромѣ только что перечисленныхъ рѣкъ, слѣдуетъ упомянуть еще р. Вексу, которая соединяетъ Галичское озеро съ р. Костромой. Что касается озеръ, то въ Костромской губерніи мы находимъ два большія озера: Галичское и Чухломское.

Почва Костромской губернии относится къ двумъ главнымъ типамъ: дерново-подзолисту и песчаному. Первый типъ во всѣхъ уѣздахъ занимаетъ первенствующее положеніе; второй распространенъ во всей восточной половинѣ Макарьевского уѣзда по лѣвую сторону течения Унжи, въ юго-восточной части Кологривскаго уѣзда, въ западной Ветлужскаго и въ сѣверо-западной Варнавинскаго. Кромѣ этой главной площади песчаной почвы, которая располагается между рѣками Унжой и Ветлугой и отчасти по лѣвому берегу послѣдней, мы находимъ островки въ Кологривскомъ и Солигаличскомъ уѣздахъ.

Болота распространены главнымъ образомъ въ Ветлужскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, гдѣ они иногда занимаютъ весьма значительныя площади.

Лѣса Костромской губернии еще до сихъ поръ занимаютъ огромныя площади въ сѣверныхъ и восточныхъ уѣздахъ, гдѣ они сливаются со сплошными лѣсами Вологодской и Вятской губернии. Изъ лиственныхъ породъ преобладающее значеніе имѣетъ береза и осина; въ гораздо меньшемъ количествѣ попадаетъ ольха, дубъ и пр. Изъ хвойныхъ деревьевъ слѣдуетъ упомянуть сосну, ель, пихту и лиственницу.

Хвойный лѣсъ всюду играетъ первенствующую роль, особенно въ сѣверной и восточной частяхъ нашей губернии.

Прежде всего я постараюсь разбить всѣхъ птицъ, найденныхъ мною въ предѣлахъ Костромской губерніи, на категории по образу жизни. Слѣдя П. П. Сушкину („Птицы Тульской губерніи“), я буду разсматривать осѣдлыхъ и кочующихъ птицъ вмѣстѣ.

### Осѣдлыя птицы.

(Встрѣчающіяся круглый годъ.)

<i>Falco peregrinus</i> (?)	<i>Picus leuconotus</i> .
<i>Aquila chrysaetos</i> .	<i>Picus leuconotus cirris</i> .
<i>Archibuteo lagopus</i> (повидимому, только единичные экземпляры).	<i>Picus tridactylus</i> .
<i>Accipiter nisus</i> (?) (повидимому, только отчасти).	<i>Gecinus viridis</i> (?)
<i>Astur palumbarius</i> .	<i>Corvus corax</i> .
<i>Bonasa canescens</i> .	<i>Corvus cornix</i> .
<i>Tetrao tetrix</i> .	<i>Corvus monedula collaris</i> .
<i>Tetrao urogallus</i> .	<i>Pica caudata</i> .
<i>Lagopus albus</i> .	<i>Pica leucoptera</i> .
<i>Perdix cinerea</i> .	<i>Garrulus glandarius</i> .
<i>Columba livia</i> .	<i>Perisoreus infaustus</i> .
<i>Glaucidium passerinum</i> (?)	<i>Emberiza citrinella</i> .
<i>Bubo maximus</i> .	<i>Loxia curvirostra</i> .
<i>Surnia ulula</i> .	<i>Pyrrhula coccinea</i> .
<i>Syrnium uralense</i> .	<i>Passer domesticus</i> .
<i>Syrnium aluco</i> .	<i>Passer montanus</i> .
<i>Asio otus</i> (?)	<i>Chrisomitris spinus</i> (не всѣ особи).
<i>Picus martius</i> .	<i>Carduelis elegans</i> .
<i>Picus major</i> .	<i>Certhia familiaris</i> .
<i>Picus minor</i> .	<i>Lophophanes cristatus</i> .
	<i>Cyanistes cyanus</i> .
	<i>Poecile borealis</i> .

*Parus ater* (?). *Regulus cristatus*.  
*Parus major*. *Cinclus melanogaster*.  
*Acredula caudata*.

Знакомъ (?) отмѣчены тѣ птицы, относительно которыхъ существуетъ сомнѣніе въ принадлежности ихъ къ этой категоріи.

**Лѣтнія гнѣздящіяся птицы.**

<i>Colymbus arcticus</i> .	<i>Grus cinerea</i> .
<i>Podiceps cristatus</i> .	<i>Fulica atra</i> .
<i>Ardea cinerea</i> .	<i>Crex pratensis</i> .
<i>Botaurus stellaris</i> .	<i>Porzana maruetta</i> .
<i>Cygnus musicus</i> .	<i>Scolopax rusticola</i> .
<i>Anas circia</i> .	<i>Scolopax major</i> .
<i>Anas crecca</i> .	<i>Scolopax gallinago</i> .
<i>Anas boschas</i> .	<i>Scolopax gallinula</i> (?)
<i>Anas acuta</i> (?).	<i>Totanus pugnax</i> (?).
<i>Fuligula cristata</i> (?).	<i>Totanus hypoleucos</i> .
<i>Mergus albellus</i> (?).	<i>Totanus terekus</i> .
<i>Mergus merganser</i> (?).	<i>Totanus ochropus</i> .
<i>Pandion haliaëtus</i> .	<i>Totanus glareola</i> .
<i>Tinnunculus alaudarius</i> .	<i>Totanus glottis</i> .
<i>Erythropus vespertinus</i> .	<i>Numenius arquatus</i> .
<i>Falco subbuteo</i> .	<i>Numenius phaeopus</i> .
<i>Falco peregrinus</i> (можетъ быть, осѣдлая).	<i>Haematopus ostralegus</i> .
<i>Pernis apivorus</i> .	<i>Vanellus cristatus</i> .
<i>Milvus ater</i> .	<i>Charadrius minor</i> .
<i>Haliaëtus albicilla</i> .	<i>Charadrius hiaticula</i> .
<i>Aquila clanga</i> .	<i>Larus canus</i> .
<i>Aquila naevia</i> .	<i>Larus ridibundus</i> .
<i>Buteo vulpinus</i> .	<i>Larus minutus</i> .
<i>Accipiter nisus</i> (возможно, что от- носится къ первой категоріи).	<i>Sterna fluviatilis</i> .
<i>Circus cineraceus</i> .	<i>Sterna minuta</i> .
<i>Circus cyaneus</i> .	<i>Turtur auritus</i> .
<i>Circus aeruginosus</i> .	<i>Columba palumbus</i> .
<i>Coturnix communis</i> .	<i>Cuculus canorus</i> .
	<i>Cuculus intermedius</i> .
	<i>Alcedo ispida</i> .

<i>Asio accipitrinus.</i>	или не гнѣздится въ нашей
<i>Asio otus</i> (возможно, что отно- сится къ первой категоріи).	губерніи).
<i>Caprimulgus europaeus.</i>	<i>Locustella fluviatilis.</i>
<i>Cypselus apus.</i>	<i>Acrocephalus phragmitis.</i>
<i>Gecinus viridis</i> (возможно, что является осѣдлой).	<i>Acrocephalus palustris.</i>
<i>Alauda arvensis.</i>	<i>Acrocephalus dumetorum.</i>
<i>Sturnus sophiae.</i>	<i>Hypolais icterina.</i>
<i>Emberiza schoeniclus.</i>	<i>Phylloscopus viridanus.</i>
<i>Emberiza aureola.</i>	<i>Phylloscopus sibilatrix.</i>
<i>Carpodacus erythrinus.</i>	<i>Phylloscopus trochilus.</i>
<i>Acanthis cannabina.</i>	<i>Phylloscopus collybita.</i>
<i>Fringilla montifringilla.</i>	<i>Sylvia nisoria.</i>
<i>Fringilla coelebs.</i>	<i>Sylvia cinerea.</i>
<i>Chloris chloris.</i>	<i>Sylvia hortensis.</i>
<i>Chelidon urbica.</i>	<i>Sylvia curruca.</i>
<i>Cotile riparia.</i>	<i>Sylvia atricapilla.</i>
<i>Hirundo rustica.</i>	<i>Erythacus philomela.</i>
<i>Muscicapa atricapilla.</i>	<i>Erythacus suecicus.</i>
<i>Muscicapa grisola.</i>	<i>Erythacus rubecula.</i>
<i>Lanius collurio.</i>	<i>Ruticilla phoenicurus.</i>
<i>Lanius excubitor.</i>	<i>Pratincola rubetra.</i>
<i>Oriolus galbula.</i>	<i>Saxicola oenanthe.</i>
<i>Anthus arboreus.</i>	<i>Accentor modularis.</i>
<i>Motacilla flava.</i>	<i>Merula merula.</i>
<i>Motacilla alba.</i>	<i>Turdus viscivorus.</i>
<i>Parus ater</i> (возможно, что отно- сится или къ первой категоріи,	<i>Turdus musicus.</i>
	<i>Turdus iliacus.</i>
	<i>Turdus pilaris.</i>

Относительно гнѣздованія *Anas acuta*, *Fuligula cristata*, *Mergus albellus*, *Mergus merganser*, *Scolopax gallinula*, *Totanus pugnax* у меня нѣтъ достаточныхъ данныхъ и поэтому я отмѣтилъ ихъ знакомъ вопроса.

#### Пролетныя птицы.

Представители р. <i>Anser.</i>	<i>Anas penelope.</i>
<i>Anas clupeata.</i>	<i>Fuligula marila.</i>

<i>Mergus serrator.</i>	<i>Tringa alpina.</i>
<i>Tringa minuta.</i>	<i>Tringa subarquata.</i>
<i>Tringa temmincki.</i>	<i>Stercorarius pomatorhinus</i> (возможно, что долженъ разсматриваться какъ залетный).

Возможно, что сюда относятся *Anas acuta*, *Fuligula cristata* и пр., т.-е. тѣ птицы, которыя помѣщены мною въ предыдущей категоріи и отмѣчены знакомъ вопроса. Пролетныя птицы, какъ уже было сказано выше, мною почти не обследованы, поэтому и списокъ ихъ является весьма не полнымъ.

*Зимнія птицы* мною также почти не изучены. Возможно, что къ этой категоріи относится *Glaucidium passerinum*, которая помѣщена мною подъ знакомъ вопроса среди осѣдлыхъ и кочующихъ птицъ.

#### Случайно залетныя птицы.

*Stercorarius pomatorhinus* (возможно, что онъ относится къ категоріи пролетныхъ).

*Uria brünnichi.*

*Syrnhartes paradoxus* (относительно нахождения этого вида существуютъ не вполне достовѣрныя данныя).

Такимъ образомъ, число несомнѣнно гнѣздящихся птицъ равно 146; число несомнѣнно пролетныхъ 8, но, какъ указано выше, именно эта категорія птицъ и затѣмъ зимующія наименѣе изслѣдованы мною. Всего въ моемъ списокѣ находится 164 вида, т.-е. можно ожидать, что онъ увеличится еще видовъ на 60, и, безъ сомнѣнія, это будутъ преимущественно пролетныя, отчасти зимующія и лишь очень немногія гнѣздящіяся птицы. Впрочемъ, изъ этихъ приблизительно 60 видовъ около 30 вошли въ мой настоящій списокъ въ качествѣ сомнительныхъ, безъ №.

Для выясненія зоогеографическаго положенія Костромской губерніи могутъ служить исключительно гнѣздящіяся птицы, на которыхъ мы теперь и остановимся.

#### Птицы, широко распространенныя и не характеризующія ни одной изъ подобластей Палеарктики.

<i>Podiceps cristatus.</i>	<i>Anas circia.</i>
<i>Ardea cinerea.</i>	<i>Anas crecca.</i>
<i>Botaurus stellaris.</i>	<i>Anas boschas.</i>

<i>Anas acuta</i> (?).	<i>Bubo maximus</i> .
<i>Pandion haliaëtos</i> .	<i>Asio accipitrinus</i> .
<i>Falco peregrinus</i> .	<i>Cypselus apus</i> .
<i>Accipiter nisus</i> .	<i>Alauda arvensis</i> .
<i>Astur palumbarius</i> .	<i>Corvus corax</i> .
<i>Circus cyaneus</i> .	<i>Corvus frugilegus</i> .
<i>Circus aeruginosus</i> .	<i>Corvus collaris</i> .
<i>Haliaëtos albicilla</i> .	<i>Emberiza citrinella</i> .
<i>Coturnix communis</i> .	<i>Acanthis cannabina</i> .
<i>Grus cinerea</i> .	<i>Fringilla coelebs</i> .
<i>Crex pratensis</i> .	<i>Passer domesticus</i> .
<i>Scolopax major</i> .	<i>Passer montanus</i> .
<i>Scolopax gallinago</i> .	<i>Carduelis elegans</i> .
<i>Totanus hypoleucos</i> .	<i>Cotile riparia</i> .
<i>Totanus glottis</i> .	<i>Chelidon urbica</i> .
<i>Numenius arquatus</i> .	<i>Hirundo rustica</i> .
<i>Numenius phaeopus</i> .	<i>Muscicapa grisola</i> .
<i>Haematopus ostralegus</i> .	<i>Motacilla alba</i> .
<i>Charadrius minor</i> .	<i>Parus major</i> .
<i>Vanellus cristatus</i> .	<i>Acredula caudata</i> .
<i>Larus ridibundus</i> .	<i>Acrocephalus palustris</i> .
<i>Sterna fluviatilis</i> .	<i>Erythacus suecicus</i> .
<i>Sterna minuta</i> .	<i>Saxicola oenanthe</i> .
<i>Cuculus canorus</i> .	<i>Turdus musicus</i> .

**Птицы, характерные для подобластей тундры и тайги.**

<i>Colymbus arcticus</i> .	<i>Larus canus</i> .
<i>Cygnus musicus</i> .	<i>Glaucidium passerinum</i> (?).
<i>Mergus albellus</i> (?).	<i>Surnia ulula</i> .
<i>Mergus merganser</i> (?).	<i>Syrnium uralense</i> .
<i>Aquila chrysaëtos</i> .	<i>Picus martius</i> .
<i>Bonasa canescens</i> .	<i>Picus tridactylus</i> .
<i>Tetrao urogallus</i> .	<i>Perisoreus infaustus</i> .
<i>Lagopus albus</i> .	<i>Loxia curvirostra</i> .
<i>Scolopax gallinula</i> (?).	<i>Pyrrhula coccinea</i> .
<i>Scolopax rusticola</i> .	<i>Fringilla montifringilla</i> .
<i>Totanus pugnax</i> (?).	<i>Chrysomitris spinus</i> .

*Poecile borealis.*  
*Parus ater* (?).  
*Regulus cristatus.*

*Turdus pilaris.*  
*Turdus iliacus.*  
*Turdus viscivorus.*

**Птицы подобласти островныхъ лѣсовъ.**

*Fuligula cristata* (?).  
*Tinnunculus alaudarius.*  
*Falco subbuteo.*  
*Circus cineraceus.*  
*Fulica atra.*  
*Porzana maruetta.*  
*Totanus glareola.*  
*Totanus ochropus.*  
*Larus minutus.*  
*Turtur auritus.*  
*Columba palumbus.*  
*Asio otus.*  
*Caprimulgus europaeus.*  
*Pica caudata* (leucoptera).  
*Garrulus glandarius.*  
*Emberiza schoeniclus.*

*Chloris chloris.*  
*Certhia familiaris* (?).  
*Muscicapa atricapilla.*  
*Lanius collurio.*  
*Oriolus galbula.*  
*Motacilla flava.*  
*Acrocephalus phragmitis.*  
*Phylloscopus trochilus.*  
*Sylvia atricapilla.*  
*Sylvia cinerea.*  
*Erythacus philomela.*  
*Erythacus rubecula.*  
*Ruticilla phoenicurus.*  
*Pratincola rubetra.*  
*Merula merula.*

**Птицы подобласти степи.**

Отсутствуютъ совершенно въ предѣлахъ Костромской губерніи.

**Птицы западной части Палеарктической области.**

*Pernis apivorus* (островн. лѣса).  
*Aquila naevia* (остр. лѣса).  
*Archibuteo lagopus* (тундра).  
*Charadrius hiaticula* (тундра).  
*Alcedo ispida* (остр. лѣса).  
*Syrnium aluco* (остр. лѣса).  
*Picus minor* (остр. лѣса).  
*Picus leuconotus* (остр. лѣса).  
*Picus major* (остр. лѣса).  
*Gecinus viridis* (остр. лѣса).

*Lanius excubitor* (остр. лѣса).  
*Lophophanes cristatus* (тайга).  
*Accentor modularis* (остр. лѣса).  
*Hypolais icterina* (остр. лѣса).  
*Phylloscopus sibilatrix* (остр. лѣса).  
*Phylloscopus collybita* (тайга).  
*Sylvia nisoria* (остр. лѣса).  
*Sylvia hortensis* (остр. лѣса).  
*Sylvia curruca* (остр. лѣса).

### Птицы восточной части Палеарктики.

*Erythropus vespertinus* (остр. лѣса). *Emberiza aureola* (остр. лѣса).  
*Aquila clanga* (остр. лѣса). *Carpodacus erythrinus* (остр. лѣса).  
*Picus leuconotus cirris* (островн. лѣса). *Cyanistes cyanus* (остр. лѣса).  
*Phylloscopus viridanus* (тайга).

Такимъ образомъ, наибольшее число птицъ, гнѣздящихся въ Костромской губерніи, принадлежитъ къ широко распространеннымъ и не характернымъ ни для одной изъ подобластей Палеарктики; число это 53. Далѣе слѣдуютъ птицы, характерныя для полосы островныхъ лѣсовъ; изъ нихъ 50 видовъ являются несомнѣнно гнѣздящимися и 2 сомнительными. Количество гнѣздящихся птицъ, характерныхъ для подобластей тундры и тайги, равно 27 видамъ (и 6 сомнительныхъ). Далѣе по количеству гнѣздящихся видовъ слѣдуютъ западныя формы въ числѣ 19 видовъ, и, наконецъ, восточныя, числомъ всего 7 видовъ.

Интереснымъ фактомъ является численное преобладаніе птицъ, характерныхъ для полосы островныхъ лѣсовъ, надъ птицами, характеризующими подобласти тундры и тайги, а также преобладаніе западныхъ видовъ надъ восточными (сибирскими). Объясненіе для этихъ обоихъ явленій несомнѣнно нужно искать въ искусственной расчисткѣ тайги и въ превращеніи послѣдней въ станціи, характерныя для полосы островныхъ лѣсовъ. Въ самомъ дѣлѣ, только этимъ и можно объяснить вытѣсненіе таежныхъ формъ и заселеніе видами, характерными для полосы островныхъ лѣсовъ.

Переходя къ птицамъ западнымъ и восточнымъ, мы видимъ, что почти всѣ онѣ принадлежатъ къ формамъ, характернымъ для полосы островныхъ лѣсовъ. Исключеніе составляютъ *Archibuteo lagopus* (тундра) и *Phylloscopus viridanus* (тайга). Это явленіе мы уже объяснили искусственной расчисткой тайги.

Но тутъ возникаетъ вопросъ: почему формы западныя численно преобладаютъ надъ формами восточными? Объясненіе для этого явленія я нахожу въ географическомъ положеніи нашей губерніи и въ положеніи границы между полосой тайги и полосой островныхъ лѣсовъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ запада, вѣрнѣе съ юго-запада (такъ какъ почти всѣ птицы запада принадлежатъ къ формамъ, характернымъ для полосы островныхъ лѣсовъ), птицы свободно могли расселяться

въ предѣлы нашей губерніи по мѣрѣ расчистки тайги. Что же касается восточныхъ (сибирскихъ) птицъ, то для ихъ переселенія является весьма значительной преградой уральскій округъ съ его фауной, идущій на югъ по Уральскому хребту до 52° с. ш. и не позволяющій птицамъ сибирскимъ переселяться въ предѣлы нашей губерніи.

До сихъ поръ мы выясняли причины преобладанія видовъ, характерныхъ для полосы островныхъ лѣсовъ, надъ видами подобластей тундры и тайги и преобладаніе видовъ западныхъ надъ сибирскими формами, но ничего не говорили о положеніи Костромской губерніи съ зоогеографической точки зрѣнія.

На первый взглядъ, основываясь на преобладаніи формъ, характерныхъ для полосы островныхъ лѣсовъ, надъ формами тундры и тайги, казалось, слѣдовало бы отнести Костромскую губернію къ полосѣ островныхъ лѣсовъ. Но препятствіемъ для этого служитъ полное отсутствіе формъ, характерныхъ для полосы степей. На основаніи этого мы должны отнести Костромскую губернію къ полосѣ тайги и разсматривать ее какъ участокъ, сильно измѣненный искусственной вырубкой лѣсовъ и превращенный на большемъ своемъ протяженіи въ станціи, характерныя для полосы островныхъ лѣсовъ.

## ЧАСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ.

### Отрядъ *Colymbiformes*.

#### 1. *Colymbus arcticus*, L.

*Colymbus arcticus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 36.

Полосатая гагара принадлежит къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Мною была наблюдаема въ Макарьевскомъ и Варнавинскомъ уѣздахъ въ небольшомъ количествѣ на слѣдующихъ озерахъ: Медвѣжье и Большое озера (Макарьевскій уѣздъ) и Большое озеро (Варнавинск. уѣздъ), гдѣ этотъ видъ гнѣздится и держится все лѣто. Кромѣ того, одинъ экземпляръ былъ встрѣченъ мною 28.V.10 г. на рѣкѣ Ветлугѣ, въ Ветлужскомъ уѣздѣ, и есть данныя о нахожденіи ея въ Кинешемскомъ, Галицкомъ и Костромскомъ уѣздахъ (по разсказамъ охотниковъ). На основаніи этихъ данныхъ можно заключить, что полосатая гагара распространена во всей Костромской губ. и гнѣздится тамъ, гдѣ есть большія озера.

#### 2. *Podiceps cristatus*, L.

*Podiceps cristatus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 5.

Большая поганка принадлежит къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губ.

Что касается другихъ видовъ рода *Podiceps*, то относительно ихъ у меня нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Сабанѣевъ въ своемъ каталогѣ ярославскихъ птицъ, напечатанномъ въ „Трудахъ Ярославскаго Губернскаго Статистическаго комитета“ 1868 г. (стр. 253), приводитъ для Ярославской губерніи: *Podiceps auritus*, Gm., *P. cognatus*, Gm. и *P. cristatus*, L., но онъ не говоритъ ничего опредѣленнаго объ ихъ гнѣздованіи.

Экз. коллекціи: Нерехтск. у. Окрестности Плеса, на озерѣ, 18.V.07 г.

## Отрядъ Ciconiiformes.

### 3. *Ardea cinerea*, Briss.

*Ardea cinerea*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 811.

Сѣрая цапля принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губ.; встрѣчается главнымъ образомъ по долинамъ рѣкъ и гнѣздится отдѣльными парами въ прибрежныхъ лѣсахъ. Исключеніе представляетъ долина рѣки Вексы въ Галицкомъ уѣздѣ, гдѣ мнѣ пришлось наблюдать большія колоніи сѣрыхъ цапель, достигающія нѣсколькихъ десятковъ экземпляровъ. Интересно то, что здѣсь сѣрыя цапли поселились всего четыре года тому назадъ (по рассказамъ мѣстныхъ крестьянъ) и мѣстные крестьяне до этого времени ихъ никогда не видали.

Экз. коллекціи: Галичскій уѣздъ р. Векса 13.VIII.10 г.; Галичск. у., р. Векса 13.VIII.10 г.

### 4. *Botaurus stellaris*. L.

*Botaurus stellaris*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 781.

Выпь распространена всюду по болотамъ и на нѣкоторыхъ волжскихъ островахъ, но нигдѣ не бываетъ многочисленна. Принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ.

Экз. коллекціи: Костр. у., село Кунаково I.IX.09.

## Отрядъ Anseriformes.

### 5. *Cygnus musicus*, Bechst.

*Cygnus musicus*, Bechst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 706.

М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“ указываетъ на гнѣздованіе лебедя-кликунъ въ Костромской губ. Я наблюдалъ на гнѣздовьяхъ всего одну пару, которая постоянно гнѣздится на Медвѣжьемъ озерѣ, Макарьевского уѣзда. Сохраняется эта пара потому, что мѣстные крестьяне считаютъ лебедя птицей священной.

### Родъ *Anser*.

Гуси не гнѣздятся въ предѣлахъ Костромской губерніи, но на пролетѣ бываютъ въ большомъ количествѣ <sup>1)</sup>. Главными пролетными пу-

<sup>1)</sup> Несмотря на столь категорическое заявленіе автора, я весьма сомнѣваюсь въ его справедливости по отношенію къ *A. cinereus*. На пролетѣ, кромѣ сѣраго гуся, конечно, бываютъ и казарки. Ред.

тями служатъ рѣки: Волга, Кострома, Унжа и Ветлуга, а также отчасти и Немда.

#### 6. *Anas cyreata*, Briss.

*Anas cyreata*, Briss. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 665.

Нѣкоторыя данныя о гнѣздованіи широконоски въ Костромскомъ уѣздѣ у меня есть; но они основаны исключительно на разсказахъ охотниковъ. Въ моей коллекціи имѣется всего одинъ экземпляръ, добытый осенью на пролетѣ въ Костромскомъ уѣздѣ.

Экз. коллекціи: ♀ Костр. уѣздъ, Глушицкое оз. 20.IX.09.

#### 7. *Anas cirscia*, L.

*Anas cirscia*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 668.

Принадлежитъ къ гнѣздящимся и широко распространеннымъ птицамъ Костромской губ. Встрѣчается всюду, гдѣ есть водоемы, особенно многочисленна въ Макарьевскомъ, Кологривскомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ, Костромскомъ, Галицкомъ и Буйскомъ уѣздахъ вслѣдствіе ихъ малой населенности.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. р. Тиновка 25.VI.09 г.; ♀ Ветлужск. у. р. Ветлуга 9.VI.10 г.; Кинешемск. у. 2.VIII.10 г.

#### 8. *Anas crecca*, L.

*Anas crecca*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 671.

Гнѣздится въ большемъ количествѣ, чѣмъ предыдущій видъ.

Экз. коллекціи: ♂ Юрьевецк. у. 24.VI.09; ♂ Кинеш. у. 28.VII.09; ♀ Ветлужск. у. 9.VI.10; ♀ Ветлужск. у. 10.VI.10; ♂ Галицк. у. 13.VIII.10 г.

#### 9. *Anas boschas*, L.

*Anas boschas*, L. Птицы Россіи, т. I, стр. 681.

Кряква принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ данной губерніи, но встрѣчается въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ *A. cirscia* и *A. crecca*.

Экз. коллекціи: Костромск. у., оз. Стоенское 13.VII.09.

#### 10. *Anas acuta*, L.

*Anas acuta*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 690.

На гнѣздовѣ мнѣ не приходилось наблюдать шилохвость. Я могу привести свѣдѣнія знакомаго охотника, который утверждаетъ, что въ

1908 году наблюдалъ выводокъ *Anas acuta* въ Кинешемскомъ уѣздѣ близъ дер. Назарихи. Въ моей коллекціи есть только пролетный осенній экземпляръ. Въ сосѣдней Ярославской губерніи *Anas acuta* гнѣздится (по Сабанѣеву), но для Костромской я все-таки считаю этотъ видъ сомнительнымъ.

Экз. коллекціи: Костромск. у., оз. Боровое 18.IX.09.

#### ***Anas penelope*, L.**

*Anas penelope*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 693.

Связь на гнѣздовѣ мною не найдена и вообще мнѣ не удалось собрать никакихъ свѣдѣній о ея нахожденіи въ предѣлахъ Костромской губ., Сабанѣевъ приводитъ ее для Ярославской губерніи, какъ гнѣздящійся видъ.

#### **11. *Fuligula cristata*, Leach.**

*Fuligula cristata*, Leach. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 652.

Въ моей коллекціи есть одинъ экземпляръ хохлатой чернети, добытый на пролетѣ 6.X. О гнѣздованіи этого вида у меня нѣтъ никакихъ свѣдѣній.

Экз. коллекціи: Костромской у. 6.X.

#### **12. *Fuligula marila*, L.**

*Fuligula marila*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 657.

Морская чернеть принадлежитъ къ числу пролетныхъ птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 26.VIII.07 г.

#### **13. *Mergus albellus*, L.**

*Mergus albellus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 595.

Определенныхъ свѣдѣній о гнѣздованіи лутка въ Костромск. губ. у меня нѣтъ. Въ моей коллекціи имѣется только нѣсколько осеннихъ пролетныхъ экземпляровъ.

Экз. коллекціи: Костр. у., Боровое оз. 19.IX.09; Костромск. у. 6.X; тамъ же 6.X.

#### **14. *Mergus serrator*, L.**

*Mergus serrator*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 601.

Какъ и лутокъ, длинноносый вяхаль добытъ мною только на осеннемъ пролетѣ въ Костр. уѣздѣ. Другихъ свѣдѣній у меня не имѣется.

Экз. коллекціи: Костр. у., оз. Идоломское 22.IX.09 г.

**15. *Mergus merganser*, L.**

*Mergus merganser*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 604.

Большой крохаль былъ добытъ мною всего одинъ разъ 28.V, по-этому трудно говорить о несомнѣнномъ гнѣздованіи этой птицы, такъ какъ этотъ экземпляръ могъ быть и въ числѣ запоздавшихъ пролетныхъ.

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужскій уѣздъ, берегъ р. Ветлуги 28.V.10.

**Отрядъ Falconiformes.**

**16. *Pandion haliaëtus*, L.**

*Pandion haliaëtus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 5.

Скопа принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Въ южной части губерніи (по правую сторону теченія Волги) это весьма рѣдкая птица, то же надо сказать и о самой Волгѣ. Что касается сѣверной части губерніи, то здѣсь она является гораздо болѣе обыкновенной; особенно много скопъ по рѣкѣ Вексѣ, Галицкаго уѣзда. Вообще надо сказать, что скопа, избѣгаетъ крупныхъ водоемовъ и съ большей охотой поселяется на небольшихъ рѣчкахъ, изблюющихъ рыбой (р. Векса, Немда).

**17. *Tinnunculus alaudarius*, Briss.**

*Tinnunculus alaudarius*, Briss. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 11.

Пустельга является однимъ изъ самыхъ многочисленныхъ соколовъ въ Костромской губерніи. Излюбленными мѣстами пустельги являются рѣчныя поймы и доли, гдѣ этотъ сокологъ охотится за мышами и мелкими птицами.

Экз. коллекціи: Кинешемскій у. близъ дер. Назарихи 23.VII.09; ♂ Варнавинск. у. бер. р. Ветлуги 16.VI.10; ♀ Костромск. у., р. Кострома 17.VIII.10.

**18. *Erythropus vespertinus*, L.**

*Erythropus vespertinus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 22.

Сабанѣвъ указываетъ кобчика для Ярославской губерніи. Мною этотъ сокологъ былъ найденъ только въ западной части Костромской губерніи, близъ границы съ Ярославской, въ Буйскомъ и Костромскомъ уѣздахъ. Но, повидимому, этотъ видъ гнѣздится по всей Кост-

ромской губерніи, такъ какъ на востокъ въ губ. Нижегородской онъ также былъ добытъ на гнѣздовѣ (Серебровскій).

Экз. коллекціи: ♀ Костромской уѣздъ. Пойма рѣки Костромы 16.VIII.10 г.

#### **Lithofalco aesalon, Briss.**

*Lithofalco aesalon*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 30.

М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“ указываетъ дербника, какъ гнѣздящуюся птицу, для слѣдующихъ смежныхъ съ Костромской губерній: Вологодской, Ярославской, Владимірской; г. Серебровскій нашель его на гнѣздовѣ въ Нижегородской губерніи.

На основаніи этихъ данныхъ надо предполагать, что дербникъ гнѣздится также и въ Костромской губерніи, хотя мною этотъ видъ на гнѣздовѣ не найденъ.

#### **19. Falco peregrinus, Briss.**

*Falco peregrinus*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 44.

Сапсанъ принадлежитъ къ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи, но всюду встрѣчается рѣдко.

#### **20. Falco subbuteo, L.**

*Falco subbuteo*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 38.

Чеглокъ является однимъ изъ нашихъ обыкновенныхъ соколовъ. Для своего гнѣзда онъ выбираетъ обыкновенно опушку лѣса. 26.V мнѣ удалось наблюдать гнѣздо съ двумя еще не насиженными яйцами; гнѣздо помѣщалось на ели, около 8 сажень отъ земли. Въ іюль и августѣ чеглоки въ большемъ количествѣ встрѣчаются по поймамъ рѣкъ, гдѣ и держатся до осенняго отлета.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у., Пелеговская каз. дача, 27.V.09; ♀ Кинешемск. у. близъ дер. Назарихи, 23.VII.09; ♂ Ветлужск. у. бер. Ветлуги, 31.V.10; Костромск. у. бер. р. Костромы, 17.VIII.10 г.

#### **21. Pernis apivorus, L.**

*Pernis apivorus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 74.

Осоѣдъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ встрѣчается всюду, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ, хотя не можетъ считаться и рѣдкимъ. 27.V.09 г. мнѣ удалось найти гнѣздо осоѣда съ двумя слабо насиженными яй-

цами. Гнѣздо помѣщалось на ели на высотѣ 10 сажень отъ земли близъ дола.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. Пелеговская каз. дача 27.V.09; ♀ Кинешемск. у. близъ дер. Вандышки 22.VII.09; ♂ тамъ же 13.V.10; тамъ же 27.VII.10; тамъ же 28.VII.10; Варнавинск. у. 19.VI.10; ♀ тамъ же 22.VI.10.

## 22. *Milvus ater*, Gm.

*Milvus ater*, Gm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 80.

Коршунъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Излюбленными мѣстами для гнѣздованія коршуна являются прибрежные лѣса, гдѣ эти птицы охотно вьютъ свои гнѣзда на высокоствольныхъ деревьяхъ. Молодые вылетаютъ изъ гнѣзда обыкновенно въ началѣ іюля (5-го и 8-го).

Экз. коллекціи: Ветлужск. у. 28.V.10; Кинешемск. у. 12.VII.10 juv; ♂ Костромской у. р. Кострома 19.VIII.10.

## 23. *Haliaeetus albicilla*, Briss.

*Haliaeetus albicilla*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 96.

Сабанѣвъ указываетъ бѣлохвоста для Ярославской губерніи. Въ Костромской губерніи мнѣ удалось наблюдать бѣлохвоста всего одинъ разъ въ Макарьевскомъ у. на берегу рѣки Унжи.

## 24. *Aquila nobilis*, Pall.

*Aquila nobilis*, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 116.

Беркутъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается, какъ и вообще всѣ крупныя птицы, въ довольно ограниченномъ количествѣ. Что касается его распространенія въ нашей губерніи, то я съ увѣренностью могу сказать, что онъ гнѣздится въ слѣдующихъ уѣздахъ: Макарьевскомъ, Кологривскомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Буйскомъ—вообще въ уѣздахъ мало-заселенныхъ и изобилующихъ большими лѣсами. За два года изслѣдованій мнѣ удалось найти только одно гнѣздо беркута въ Нейской удѣльной дачѣ, Ветлужскаго уѣзда. Гнѣздо находилось на высокой и толстой (болѣе 3 четвертей въ діаметрѣ) соснѣ среди сосноваго бора вдали отъ устья. Гнѣздо было устроено въ развилкѣ на высотѣ 17 аршинъ отъ земли и имѣло около двухъ аршинъ въ діаметрѣ и

столько же въ толщину. На разстояніи 100—120 сажень отъ этого жилого гнѣзда мнѣ удалось найти другое старое, уже брошенное гнѣздо, которое также помѣщалось на высокой и толстой соснѣ. 6.VI мною были взяты изъ жилого гнѣзда два слабо оперенныхъ птенца, при чемъ одинъ былъ почти въ полтора раза больше другого. Какъ въ гнѣздѣ, такъ и на землѣ подъ гнѣздомъ было много заячьихъ костей, остатки *Syrnium ugalense* и шкурка ежа.

Когда мы подходили къ гнѣзду, то родители, еще издали увидя насъ, поспѣшили улетѣть отъ него, и сколько мы ни подстерегали, сколько разъ ни старались тихо подойти къ гнѣзду, они всегда успѣвали замѣтить насъ и скрыться.

Здѣсь я считаю не лишнимъ привести описаніе окраски одного изъ птенцовъ (болѣе крупнаго).

Лобъ темно-коричневый; темя, затылокъ и передняя часть верхней стороны шеи шоколадные, постепенно переходящіе сзади въ темно-коричневый цвѣтъ спины; перья темени и затылка—съ бѣлыми кончиками. Зобъ, грудь и брюхо почти черные. Плюсна бѣлая (пухъ) съ буро-желтыми пестринами; надхвостье и хвостъ (его выросшая, концевая часть) одного цвѣта со спиной; подхвостье и штаны—рыжеватобурые. Рулевья съ бѣлыми узкими кончиками. Горло, грудь и брюхо покрыты бѣлымъ пухомъ. Пальцы свѣтло-желтые; когти—черные; клювъ черный со свѣтло-синеватыми основаніями верхней и нижней челюстей; восковица зеленовато-свѣтложелтая; радужина орѣховая.

Экз. коллекціи: юв. Ветлужск. у., Нейская удѣльная дача 6.VI.10 (убить 8.VII.10); юв. тамъ же 6.VI.10 (убить 28.VIII.10).

## 25. *Aquila clanga*, Pall.

*Aquila clanga*, Pall. Птицы Россіи, т. II, стр. 145.

Въ моей коллекціи нѣтъ ни одного экземпляра большого подорлика, но мнѣ приходилось наблюдать этотъ видъ нѣсколько разъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ, одинъ разъ въ Ветлужскомъ и одинъ въ Костромскомъ.

## 26. *Aquila naevia*, Meyer.

*Aquila naevia*, Meyer. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 152.

Малый подорликъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но наблюдался мною только въ западной ея части, въ

Костромскомъ уѣздѣ. 16.VIII мною былъ найденъ цѣлый выводокъ, состоящій изъ двухъ птенцовъ (хорошо летающихъ), самца и самки. Молодые орлята вмѣстѣ съ родителями держались въ прибрежномъ хвойномъ лѣсу, близъ рѣки Костромы; гнѣзда поблизости не было. Здѣсь же (въ Костромскомъ уѣздѣ) мнѣ пришлось наблюдать еще нѣсколько экземпляровъ (3) малыхъ подорликовъ, хотя я не могу сказать съ полной опредѣленностью, что это были экземпляры *Aquila naevia*, а не *Aquila clanga*.

По Сабанѣву въ Ярославской губерніи *Aquila naevia* гнѣздится.

Экз. коллекціи: Костромской у., бер. рѣки Костромы 16.VIII.10.

### *Circaëtos gallicus*, Gm.

*Circaëtos gallicus*, Gm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 196.

О гнѣздованіи змѣяда у меня нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Я привожу этотъ видъ только потому, что онъ найденъ въ губерніи Нижегородской и возможно, что встрѣчается въ весьма ограниченномъ количествѣ также и въ Костромской.

### 27. *Archibuteo lagopus*, Brünn.

*Archibuteo lagopus*, Brünn. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 175.

Зимнякъ принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ. Единственный экземпляръ, находящійся въ коллекціи Волнухина, былъ добытъ изъ пары близъ гнѣзда на опушкѣ березоваго лѣса. Что касается смежныхъ губерній, то въ литературѣ имѣются слѣдующія данныя: М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“ говоритъ, что зимняки отъ времени до времени были добываемы лѣтомъ во Владимирской губерніи; въ Ярославской, по Сабанѣву, зимняки также встрѣчаются и лѣтомъ, и (въ большемъ количествѣ) зимою.

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 30.IV.08.

### 28. *Buteo vulpinus*, Licht.

*Buteo vulpinus*, Licht. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 189; *B. vulpinus*, Licht. Мензбиръ, „Орнитологическая географія“. Часть I, стр. 353.

Канюкъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ встрѣчается всюду и всюду является обыкновеннымъ и даже многочисленнымъ. Гнѣздятся конюки по большей части близъ лѣсныхъ опушекъ, хотя мнѣ удалось однажды найти гнѣздо въ са-

мой гущѣ лѣса вдали отъ опушки. Гнѣздо помѣщалось на высотѣ двухъ сажень отъ земли, въ промежуткѣ между елью и березой, и имѣло продолговатую форму; длинный діаметръ равнялся аршину. Въ гнѣздѣ находилось (30.V) 4 птенца (пуховыхъ), при чемъ самый крупный изъ нихъ былъ величиною съ дрозда-рябинника.

Изъ 18-ти экземпляровъ, имѣющихся въ моей коллекціи, почти всѣ принадлежатъ къ *V. vulpinus typicus* (Menzb.), хотя есть и уклоняющіяся формы. Изъ четырехъ старыхъ экземпляровъ три принадлежатъ къ *V. v. typicus*, а одинъ представляетъ уклоняющуюся форму. Здѣсь я привожу краткое описаніе окраски этого экземпляра. Все опереніе сильно изношенное; общій тѣнь окраски свѣтло-бурый. На головѣ отсутствуетъ рыжій налетъ, на спинѣ едва замѣтный, на верхнихъ кроющихъ крыла болѣе значительный. Окраска нижней стороны состоитъ изъ смѣси свѣтло-бурого и бѣлаго цвѣтовъ, за исключеніемъ боковъ шеи, гдѣ перья имѣютъ рыжеватые коемки. Рисунокъ нижней стороны представленъ въ видѣ продольныхъ свѣтло-бурыхъ пестринъ (у типичныхъ пестрины поперечныя и рыжія). Хвостъ свѣтло-сѣрый съ бурыми поперечными полосами, при чемъ у внутреннихъ опахалъ рулевыхъ свѣтло-сѣрый цвѣтъ болѣе или менѣе замѣненъ бѣлымъ.

Переходя къ молодымъ, я долженъ отмѣтить и остановиться на двухъ темныхъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ приближается къ *V. vulpinus fusco-ater* (Menzb.), а другой представляетъ переходъ къ *V. v. typicus* отъ темно-бурой формы.

Окраска первого экземпляра такова: верхняя и нижняя сторона темно-бурая съ рыжеватымъ налетомъ. Перья нижнихъ кроющихъ хвоста съ поперечными рыжими полосами. Хвостъ темно-бурый съ свѣтло-сѣрыми поперечными полосами.

Второй экземпляръ, какъ уже было сказано выше, представляетъ переходъ отъ темно-бурой къ типичной формѣ и характеризуется нѣсколько болѣе темнымъ цвѣтомъ спины и нижней стороны тѣла, при чемъ на послѣдней уже довольно много бѣлаго цвѣта, чего нѣтъ у 1-го экземпляра.

Всѣ остальные относятся къ *V. vulpinus typicus*, хотя среди нихъ мы и встрѣчаемъ незначительныя варіаціи въ окраскѣ нижней стороны тѣла и рулей.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевскій у., Пелеговская каз. дача, 30.V.09; ♀ Бинешемск. у., близъ дер. Вандышка, 14.VI.09; тамъ же,

22.VII.09; Кинешемск. у., близъ дер. Загорье, 28.VII.09; ♂ Кинешемск. у., близъ дер. Вандышка, 31.VII.09; ♂ Макарьевскій у., близъ дер. Чапыги, 9.VIII.09; Макарьевск. у., р. Немда, 13.VII.09; ♀ тамъ же, 14.VIII.09; ♀ Макарьевск. у., дер. Чапыги, 15.VIII.09; ♀ Кинешемск. у., 13.V.10; тамъ же, 15.VII.10; juv. тамъ же, 20.VII.10; juv. тамъ же, 25.VII.10; juv. тамъ же, 25.VII.10; ♀ Галичск. у., р. Векса, 13.VIII.10; тамъ же, 14.VIII.10; Костромской у., 17.VIII.10; juv. Кинешемск. у., 22.VIII.10.

### 29. *Accipiter nisus*, L.

*Accipiter nisus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 198.

Перепелятникъ распространенъ во всей Костромской губерніи въ качествѣ гнѣздящейся птицы, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ. 12.VII мною были добыты три молодыхъ экземпляра, которые, повидимому, только что покинули гнѣздо; у меня есть также и другія данныя, указывающія, что вылетъ происходитъ въ первыхъ числахъ іюля.

Экз. коллекцій: ♀ Кинешемск. у. 12.VII.10; juv. тамъ же 12.VII.10; juv. тамъ же 12.VII.10; juv. тамъ же 12.VII.10.

### 30. *Astur palumbarius*, L.

*Astur palumbarius*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 205.

Тетеревятникъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи и всюду встрѣчается въ незначительномъ количествѣ. 13.V мною было найдено гнѣздо въ сосновомъ бору Спасъ-Красногорскаго лѣсничества Макарьевскаго уѣзда. Гнѣздо помещалось на соснѣ, лишенной вѣтвей, на высотѣ 6-ти сажень отъ земли; въ гнѣздѣ находилось два 3—4-хдневныхъ птенца и два сильно насиженныхъ яйца. Тутъ же была убита и самка, которая вела себя весьма неосторожно.

Экз. коллекцій: ♀ Макарьевскій уѣздъ, Спасо-Красногорское лѣсничество, 13.V.09; Кинешемск. у. 15.X.10; тамъ же 15.X.10; тамъ же 15.X.10.

### 31. *Circus cineraceus*, Mont.

*Circus cineraceus*, Mont. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 217.

Луговой лунь принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи и является самымъ обыкновеннымъ изъ нашихъ луней, хотя нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 5.VII.10; Буйскій у., р. Кострома 15.VIII.10.

### 32. *Circus cyaneus*, L.

*Circus cyaneus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 229.

Полевой лунь распространенъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы во всей Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: ♂ Костромской у., р. Кострома 19.VIII.10.

### 33. *Circus aeruginosus*, L.

*Circus aeruginosus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 235.

Болотный лунь принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но является самымъ малочисленнымъ и рѣдкимъ изъ нашихъ луней.

Экз. коллекціи: ♀ Костромской у., р. Кострома 17.VIII.10.

## Отрядъ Galliformes.

### 34. *Bonasa canescens*, Sparrm.

*Bonasa canescens*, Sparrm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 480.

Рябчикъ—обычная гнѣздящаяся птица Костромской губерніи, но въ большомъ количествѣ встрѣчается только въ сѣверныхъ и восточныхъ уѣздахъ, хотя и тамъ за послѣдніе годы подвергается сильному истребленію. Особенно многочисленны рябчики въ Костромскомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, гдѣ онъ является промысловой птицей.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 18.V.09; Макарьевск. у. 8.VIII.09; ♀ Кинешемск. у. 24.VIII.09; ♂ Кинешемск. у. 24.VIII.09; ♂ Ветлужск. у. 1.VI.10.

### 35. *Tetrao tetrix*, L.

*Tetrao tetrix*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 493.

Обычная гнѣздящаяся птица Костромской губ.; особенно многочисленна въ сѣверныхъ, восточныхъ и западныхъ уѣздахъ.

Экз. коллекціи: ♀ Юрьевецкій уѣздъ 25.VI.09; juv. Кинеш. у. 28.VII.09; ♀ Ветлужск. у. 3.VI.10.

**36. Tetrao urogallus, L.**

*Tetrao urogallus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 502.

Глухарь въ большей части Костромской губерніи за послѣдніе годы подвергся сильному истребленію, хотя въ небольшомъ количествѣ встрѣчается несомнѣнно во всѣхъ уѣздахъ. Въ большомъ количествѣ онъ встрѣчается и до сихъ поръ въ Ветлужскомъ, Варнавинскомъ, Кологривскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ; относительно Чухломскаго и Солигаличскаго я свѣдѣній не имѣю. Глухариные тока обыкновенно продолжаются мартъ и апрѣль, такъ что къ 1-му мая на токовищахъ нельзя наблюдать ни одного глухаря.

**37. Lagopus albus, Gm.**

*Lagopus albus*, Gm. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 512.

Бѣлая куропатка гнѣздится главнымъ образомъ по поймамъ рѣкъ: Костромы, Унжи и Ветлуги и по ихъ притокамъ. Въ остальныхъ частяхъ губерніи она очень рѣдка и если встрѣчается, то въ очень незначительномъ количествѣ. Тока начинаются въ апрѣлѣ и кончаются 10—15 мая.

Экз. коллекціи: ♀ Костромск. у., бер. р. Костромы 17.VIII.10.

**38. Coturnix communis, Bonnat.**

*Coturnix communis* Bonnat. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 522.

Гнѣздится по всей губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ. Любимыя станціи—хлѣбныя поля и поймы.

**39. Perdix cinerea, Briss.**

*Perdix cinerea*, Briss. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 527.

Сѣрая куропатка принадлежитъ къ рѣдкимъ птицамъ Костромской губерніи, хотя, повидимому, встрѣчается всюду. Зимой иногда держится на волжскихъ островахъ, гдѣ обыкновенно успѣшно спасается отъ охотниковъ.

**Отря Gruiformes.**

**40. Grus cinerea, Bechst.**

*Grus cinerea*, Bechst. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 416.

Гнѣздится по всей Костромской губ., но обыкновененъ и даже многочисленъ только въ мало заселенныхъ уѣздахъ. Любимыя стан-

ціи для гнѣздованія—лѣсных болота и поймы. Въ августѣ мнѣ удалось наблюдать стаи штукъ до 30—35 (Макар. у.).

Экз. коллекціи: юв. Макарьевск. у. 8.VIII.09.

#### 41. *Fulica atra*, L.

*Fulica atra*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 449.

Лысуха принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 6.VIII.07.

#### 42. *Crex pratensis*, Bechst.

*Crex pratensis*, Bechst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 461.

Коростель обыкновененъ и даже многочисленъ во всей губерніи, гдѣ только есть поймы, луга и болота.

Экз. коллекціи. Кинешемск. у. 24.VIII.09; ♂ Ветлужск. у. 2.VI.10.

#### 43. *Porzana maruetta*, Leach.

*Porzana maruetta*, Leach. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 471.

Болотная курочка распространена, въ качествѣ гнѣздящейся птицы, всюду, гдѣ только есть заросшія травой болота.

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужск. у. 8.VI.10.

### Отрядъ Charadriiformes.

#### 44. *Scolopax rusticola*, L.

*Scolopax rusticola*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 205.

Вальдшнепъ принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Прилетъ обыкновенно начинается въ самыхъ послѣднихъ числахъ марта (28-го, 30-го). Въ Ветлужскомъ уѣздѣ мнѣ удалось наблюдать такъ наз. вторую тягу вальдшнеповъ, которая продолжается отъ 24—25-го мая до 4—5 іюня, при чемъ тянуло большое количество особей. Нужно сказать, что до 25-го мая, какъ и послѣ 5-го іюня, тяги почти не было, такъ какъ тянули только отдѣльныя рѣдкія особи. Сѣменники убитаго самца (30.V) равнялись въ длину 5-ти см. Прибавлю, что молодья къ этому времени были уже на лету.

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужск. у. 30.V.10.

#### 45. *Scolopax major*, Gm.

*Scolopax major*, Gm. Меззбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 212.

Дупель распространень по всей губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 14.V.09.

#### 46. *Scolopax gallinago*, Briss.

*Scolopax gallinago*, Briss. Меззбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 217.

Всюду, гдѣ есть болота и вообще сырыя мѣста, можно встрѣтить бекасовъ. Это обыкновенная гнѣздящаяся птица данной губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 6.V.09; ♂ Кинешемск. у. 22.VII.09; juv. Ветлужск. у. 10.VI.10; Кинешемск. у. 28.VII.10.

#### *Scolopax gallinula*, L.

*Scolopax gallinula*, L. Меззбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 225.

Свѣдѣній о гнѣздованіи и вообще о нахожденіи гаршнепа въ предѣлахъ Костромской губерніи у меня не имѣется. М. А. Меззбирь указываетъ гаршнепа для смежныхъ губерній: Ярославской, Вологодской, Вятской и Владимірской («Птицы Россіи», т. I, стр. 226), которыя почти полнымъ кольцомъ окружаютъ Костромскую губернію. На основаніи этого, казалось, нужно бы было признать гаршнепа гнѣздящейся птицей также и Костромской губерніи, но въ виду спорадичности, которая наблюдается въ распространеніи этого вида, я не рѣшаюсь говорить ничего опредѣленнаго объ его гнѣздованіи.

#### 47. *Tringa minuta*, Leisl.

*Tringa minuta*, Leisl. Меззбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 234.

Я положительно не могу причислить песочника къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, такъ какъ первые отдѣльные экземпляры этого вида мнѣ никогда не попадались раньше начала іюля. Во второй половинѣ іюля у насъ уже появляются большія стаи песочниковъ, которые обыкновенно держатся на волжскихъ островахъ до отлета на зимовку, хотя въ меньшемъ количествѣ ихъ можно встрѣтить и по притокамъ рѣки Волги.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у., островъ на Волгѣ 18.VII.09; ♂ тамъ же 28.VII.10.

**48. *Tringa temmincki*, Leisl.**

*Tringa temmincki*, Leisl. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 239.

Куличекъ-воробей, повидимому, отчасти пролетная, отчасти кочующая птица нашей губерніи, появляющаяся у насъ съ половины іюля. Держится обыкновенно вмѣстѣ съ песочниками (*Tr. minuta*) на волжскихъ островахъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 18.VII.09; ♂ Макарьевск. у. 10.VIII.09; ♂ Кинешемск. у. 25.VIII.09.

**49. *Tringa alpina*, L.**

*Tringa alpina*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 247.

Чернозобикъ у насъ встрѣчается въ іюлѣ мѣсяцѣ, повидимому, во время пролета на пути къ своимъ зимовкамъ. Въ гнѣздовой періодъ мною встрѣченъ не былъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у., островъ на Волгѣ 12.VII.09.

**50. *Tringa subarquata*, Guld.**

*Tringa subarquata*, Guld. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 255.

Краснозобикъ убитъ мною на пролетѣ въ августѣ изъ стайки въ 4 экземпляра.

Экз. коллекціи: Костромской уѣздъ, р. Кострома 16.VIII.10.

**51. *Totanus pugnax*, Briss.**

*Totanus pugnax*, Briss. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 275.

Мнѣ приходилось наблюдать турухтановъ въ первой половинѣ мая, а также въ іюлѣ и августѣ. Въ іюлѣ и августѣ они довольно многочисленны и держатся по лѣснымъ болотамъ и по поймамъ р. Костромы и р. Унжи. Я не могу сказать опредѣленно, гнѣздятся ли турухтаны въ Костромской губерніи, такъ какъ никогда ихъ не наблюдалъ на гнѣздовѣхъ, хотя въ сосѣдней Ярославской губерніи (по Сабанѣеву) турухтанъ гнѣздится.

Экз. коллекціи: ♀ Костромской у., оз. Идоломское, 13.VII.09; тамъ же 14.VII.09; тамъ же 14.VII.09.

**52. *Totanus hypoleucos*, L.**

*Totanus hypoleucos*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 282.

Перевозчикъ принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ нашей губерніи. Встрѣчается всюду, гдѣ только есть

водоемы. Только что вылупившихся молодых мнѣ удавалось наблюдать въ двадцатыхъ числахъ мая.

Экз. коллекціи: Макарьевск. у., р. Унжа 8.V.09; ♂ Макарьевскій у., Медвѣжье оз. 11.V.09; ♀ Кинешемск. у. 7.VI.09; Костромской у., оз. Идоломское, 14.VII.09; ♀ Макарьевск. у. 14.VIII.09; ♀ Макарьевск. у. 14.VIII.09; Кинешемск. у. 13.V.10.

### 53. *Totanus terekus*, Lath.

*Totanus terekus*, Lath. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 286.

Мородунка гнѣздится, и далеко не рѣдко, въ восточной части Костромской губерніи; относительно западной сказать ничего не могу, такъ какъ оттуда не имѣю ни одного экземпляра. Въ восточныхъ уѣздахъ мною наблюдались въ маѣ и іюнѣ. Для Ярославской губерніи Сабанѣевъ мородунку не указываетъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 8.V.09; Ветлужск. у., рѣка Ветлуга 22.V.10.

### 54. *Totanus ochropus*, L.

*Totanus ochropus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 291.

Куликъ чернышъ принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ нашей губерніи. Гнѣздится всюду, гдѣ есть лѣсныя болота.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 23.V.09; ♂ Ветлужск. у., берегъ р. Неи 9.VI.10.

### 55. *Totanus glareola*, L.

*Totanus glareola*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 295.

Фифи принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Встрѣчается всюду, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ. Осенью въ августѣ мнѣ приходилось наблюдать маленькія стайки штукъ до 4—5 (18.VIII) на берегу р. Костромы въ Костромскомъ уѣздѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Юрьеveckій у., дер. Писцво 24.VI.09; Кинешемск. у., р. Волга 26.VII.10; ♀ Галичск. у., р. Векса 13.VIII.10; тамъ же 13.VIII.10.

### *Totanus stagnatilis*, Bechst.

*Totanus stagnatilis*, Bechst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 298.

Мною найденъ не былъ; Сабанѣевъ указываетъ этотъ видъ для Ярославской губерніи.

### 56. *Totanus glottis*, L.

*Totanus glottis*, L. Мензбирь. Птицы Россіи, т. I, стр. 301.

Большой улитъ—гнѣздящаяся и довольно обыкновенная птица Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевскій у., Пелеговская каз. дача 25.V.09; ♂ Макарьевск. у., близъ дер. Чапыги, 9.VIII.09; Галичск. у., оз. Галичское 11.VIII.10; тамъ же 11.VIII.10.

### *Totanus calidris*, L. и *T. fuscus*, L.

*Totanus calidris*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 306. *Totanus uscus*, L., Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 308.

Эти два кулика мною не найдены въ предѣлахъ Костромской губерніи; для Ярославской оба вида указаны Сабанѣвымъ и внесены въ списокъ.

### 57. *Numenius arquatus*, L.

*Numenius arquatus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 321.

Большой кроншнепъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Макарьевскій у.) является даже многочисленнымъ. Гнѣздится по болотамъ и поймамъ притоковъ р. Волги.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у., р. Унжа 20.V.09; ♂ Варнавинскій у., р. Ветлуга 15.VI.10.

### 58. *Numenius phaeopus*, L.

*Numenius phaeopus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 327.

Средній кроншнепъ мною не найденъ въ Костромской губерніи, но въ моей коллекціи есть яйцо, принадлежащее этому виду, что свидѣтельствуетъ объ его гнѣздованіи въ нашихъ мѣстахъ. Для сосѣдней Ярославской губерніи средній кроншнепъ указанъ Сабанѣвымъ.

Экз. коллекціи: Яйцо, Кинешемск. у. 6.V.

### 59. *Haematopus ostralegus*, Briss.

*Haematopus ostralegus*, Briss. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 331.

Куликъ-сорока гнѣздится у насъ всюду по берегамъ большихъ рѣкъ: Волги, Костромы, Унжи и Ветлуги. 26-го мая мнѣ приходилось наблюдать бѣгающихъ по песку птенцовъ, величиною съ овсянку

(числомъ 4). Въ Ветлужскомъ уѣздѣ мнѣ попалось гнѣздо кулика-сороки, которое помѣщалось въ углубленіи подѣ бревномъ; въ этомъ гнѣздѣ сидѣло 4 маленькихъ куличка, величиною немного больше воробья (24.V.10).

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужск. у., р. Ветлуга 20.V.10; ♀ Варнавинск. у. р. Ветлуга 15.VI.10; ♀ тамъ же 17.VI.10.

#### 60. *Vanellus cristatus*, Meyer.

*Vanellus cristatus*, Meyer. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. 1, стр. 365.

Чибисъ—обыкновенная гнѣздящаяся птица Костромской губерніи; гнѣздится всюду на болотахъ и по рѣчнымъ поймамъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 8.VI.09; ♀ Ветлужск. у., р. Ветлуга 22.V.10; Ветлужск. у., р. Ветлуга 9.VI.10.

#### 61. *Charadrius minor*, Meyer et Wolf.

*Charadrius minor*, Meyer et Wolf. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 378.

Малый зукъ является обычной гнѣздящейся птицей данной губерніи. Встрѣчается и гнѣздится всюду по берегамъ проточныхъ водъ.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у., бер. Унжи 8.V.09; ♂ Ветлужскій у., бер. Неи 9.VI.10; ♂ Варнавинск. у., бер. Ветлуги, 18.VI.10; Кинешемск. у., бер. Волги 25.VII.10.

#### 62. *Charadrius hiaticula*, L.

*Charadrius hiaticula*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 381.

Зукъ-галстучникъ встрѣчается въ нашей губерніи только на пролетѣ. Можетъ быть, и гнѣздятся случайныя, рѣдкія пары, но во всякомъ случаѣ мнѣ никогда не приходилось наблюдать зуйка въ гнѣздовой періодъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у., островъ на Волгѣ, 29.VII.10.

#### 63. *Stercorarius pomatorhinus*, Temm.

*Stercorarius pomatorhinus*, Temm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 94.

Въ моей коллекціи имѣется одинъ экземпляръ средняго поморника, добытый въ Костромскомъ у. 6.X. Сабанѣевъ въ „Матеріалахъ...“ высказываетъ мысль о возможности гнѣздованія поморника въ Ярославской губерніи.

Экз. коллекціи: juv. Костромской у., оз. Идоломское 6.X.10.

**64. *Larus canus*, L.**

*Larus canus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 136.

Сизая чайка принадлежит къ гнѣздящимся птицамъ данной губерніи, хотя на гнѣздовьяхъ наблюдается въ незначительномъ количествѣ. Въ іюль къ гнѣздящимся особямъ присоединяются кочующія молодья, и къ этому времени у насъ число сизыхъ чаекъ сильно возрастаетъ.

Экз. коллекціи: ♀ Ветлужск. у., р. Ветлуга 13.VI.10; юв. Кинешемск. у., р. Волга 22.VIII.10; юв. Кинешемск. у., р. Волга 25.VIII.10.

**65. *Larus ridibundus*, L.**

*Larus ridibundus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 152.

Эта чайка принадлежит къ самымъ обыкновеннымъ и многочисленнымъ птицамъ Костромской губерніи. Держится и гнѣздится въ большомъ количествѣ по Волгѣ и на большихъ озерахъ (оз. Галицкое и Чухломское, а также озера Костр. уѣзда), но явно избѣгаетъ болѣе мелкихъ рѣкъ, гдѣ встрѣчается въ весьма ограниченномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Юрьевск. у., бер. Волги 1.VI.09; ♂ Кинешемск. у. 1.VII.09; юв. тамъ же 11.VII.09; ♀ Буйскій у., р. Кострома 15.VIII.10.

**66. *Larus minutus*, Pall.**

*Larus minutus*, Pall. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 158.

Малая чайка принадлежит къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но мною найдена на гнѣздовьяхъ только въ восточной части губерніи по теченію р. Ветлуги. Въ остальной части губерніи мною не встрѣчена и тамъ, повидимому, не гнѣздится. Въ Ярославской губерніи Сабанѣвымъ добытъ только одинъ экземпляръ, который, повидимому, надо считать случайно залетнымъ.

Экз. коллекціи: ♂ Варнавинск. у., р. Ветлуга 17.VI.10.

***Hydrochelidon nigra*, L.**

*Hydrochelidon nigra*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 172.

Черная крачка мною не была найдена въ предѣлахъ Костромской губерніи, но, повидимому, въ незначительномъ количествѣ все-таки гнѣздится, такъ какъ встрѣчается и въ Нижегородской и въ Ярославской губерніи. Трудно предположить, чтобы Костромская

губернія представляла перерывъ въ распространеніи этого вида по Волгѣ.

**67. *Sterna fluviatilis*, Naum.**

*Sterna fluviatilis*, Naum. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 182.

Крячка-мартышка распространена въ большомъ количествѣ по рѣкамъ и другимъ водоемамъ Костромской губерніи и всюду является обыкновенной.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у., р. Унжа 16.V.09; Костромской у., оз. Идоломское 14.VII.09; Кинешемск. у., р. Волга 25.VII.10.

**68. *Sterna minuta*, L.**

*Sterna minuta*, L., Мензбиръ. Птицы Россіи, т. I, стр. 198.

Малая крячка гнѣздится и встрѣчается въ Костромской губерніи какъ по Волгѣ, такъ и по ея притокамъ, но въ гораздо меньшемъ количествѣ, чѣмъ предыдущій видъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у., островъ на Волгѣ 9.VII.09; ♂ Варнавинскій у., р. Ветлуга 16.VI.10.

**69. *Uria brünnichi*, E. Sabine.**

*Uria brünnichi*, E. Sabine. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 63.

Въ коллекціи М. А. Мензбира есть одинъ экземпляръ гагарки, добытый въ Макарьевскомъ уѣздѣ въ ноябрѣ 1902 г. (♀), который надо признать для нашей губерніи случайно залетнымъ.

***Syrhaptus paradoxus*, Pall.**

*Syrhaptus paradoxus*, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 555.

О появленіи копытки въ Костромской губерніи у меня есть свѣдѣнія, доставленныя мнѣ однимъ мѣстнымъ крестьяниномъ. По его словамъ, копытки появились въ 1907 году близъ границы съ Вологодской губерніей, при впаденіи р. Виги въ Унжу (Бологривскій уѣздъ) и держались на поляхъ, иногда залетая въ деревни. Другихъ свѣдѣній о нахожденіи копытки въ нашей губерніи у меня не имѣется.

**70. *Turtur auritus*, Gray.**

*Turtur auritus*, Gray. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 569.

Распространенъ по всей Костромской губерніи. Въ июлѣ обыкновененъ по волжскимъ лугамъ, гдѣ держится вмѣстѣ съ *Columba livia* var. *domestica*, галками и грачами.

Экз. коллекціи: Кинешемскій у., берегъ Волги 9.VII.09.

**71. *Columba livia* var. *domestica*, Briss.**

Домашній голубъ встрѣчается въ большомъ количествѣ всюду въ сосѣдствѣ съ человѣкомъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 9.VII.09.

**72. *Columba palumbus*, L.**

*Columba palumbus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 587.

Вяхирь гнѣздится всюду въ подходящихъ мѣстахъ. Въ концѣ лѣта вяхири собираются въ стаи иногда штукъ до 40—50-ти и кормятся по полямъ, поймамъ и лугамъ, гдѣ находятъ обильный кормъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у., бер. Немды 10.VIII.09.

**Отрядъ Cuculiformes.**

**73. *Cuculus canorus*, L.**

*Cuculus canorus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 330.

Принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Во время спариванія многочисленна всюду по хвойнымъ, лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Во время кладки яицъ держится (самки) въ большомъ количествѣ по поймамъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 29.V.09; ♀ Ветлужск. у., берегъ Ней 3.VI.10; ♀ Ветлужск. у. 11.VI.10; ♀ тамъ же 11.VI.10.

**74. *Cuculus intermedius*, Vahl.**

*Cuculus intermedius*, Vahl. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 335.

Въ моей коллекціи есть всего одинъ экземпляръ малой кукушки, и я не имѣю данныхъ говорить, насколько она обыкновенна или рѣдка въ нашей губерніи, какъ гнѣздящаяся птица.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 3.VIII.09.

**Отрядъ Coraciiformes.**

***Coracias garrula*, L.**

*Coracias garrula*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 391.

Сизоворонка мною не встрѣчена въ предѣлахъ Костромской губерніи. Возможно, что она случайно и залетаетъ, такъ какъ по Мензбиру („Птицы Россіи“) извѣстна въ качествѣ случайно залетной для губерній Ярославской и Вологодской.

**75. Alcedo ispida, L.**

*Alcedo ispida*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 381.

Я наблюдалъ всего одинъ экземпляръ зимородка 27.V.10 г. на рѣкѣ Ветлугѣ въ Ветлужскомъ уѣздѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь зимородки гнѣздятся, хотя и въ незначительномъ количествѣ, такъ какъ въ сосѣдней Нижегородской губерніи они были добыты на гнѣздовѣ г. Серебровскимъ.

**76. Glaucidium passerinum, L.**

*Glaucidium passerinum*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 266.

Говорить что-нибудь определенное о гнѣздованіи сычика въ нашей губерніи я не могу, такъ какъ единственный экземпляръ моей коллекціи былъ добытъ осенью въ октябрѣ. Но въ виду того, что сычикъ найденъ на гнѣздовѣ въ Ярославской (Сабанѣевъ), Вологодской (Мензбиръ) и Вятской (Мензбиръ) губерніяхъ, можно высказать предположеніе, что онъ гнѣздится также и въ Костромской губ.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. X.09 г.

**77. Bubo maximus, Ger.**

*Bubo maximus*, Ger. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 269.

Филинъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ гнѣздится по большимъ хвойнымъ лѣсамъ. 30.V мною было найдено гнѣздо въ Макарьевскомъ уѣздѣ близъ р. Шомохты. Гнѣздо помещалось на землѣ въ старомъ сосновомъ бору и представляло родъ очень неглубокой ямки на небольшомъ бугоркѣ. Близъ гнѣзда были два пуховыхъ птенца, тутъ же валялась масса заячьихъ костей. Родители вели себя очень осторожно, не подлетая близко къ гнѣзду и держась на значительномъ разстояніи.

Экз. коллекціи: Макарьевск. у., р. Шомохта 30.V.09 (пойманъ), 1.VII.09 (убить); Костромской у., Идоломское оз. 19.X.09.

**78. Surnia ulula, L.**

*Surnia ulula*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 284.

Ястребиная сова принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Мною былъ добытъ всего одинъ экземпляръ въ Кинешемскомъ уѣздѣ 17.VI (молодая самка), на основаніи чего я и заключаю, что ястребиная сова гнѣздится въ нашей

губерніи. За это говоритъ также и то, что ястребиная сова гнѣздится въ Ярославской (Сабанѣевъ), Вятской (Мензбиръ, „Птицы Россіи“) и Вологодской (Мензбиръ) губерніяхъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 17.VI.09; тамъ же 15.X.10.

#### *Nyctala tengmalmi*, Gm.

*Nyctala tengmalmi*, Gm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 290.

Мохноногій сычъ мною не былъ найденъ въ Костромской губерніи. Что касается смежныхъ губерній, то по Мензбиру мохноногій сычъ гнѣздится въ губерніяхъ Ярославской, Вологодской и Вятской, на основаніи чего можно предполагать, что этотъ видъ долженъ встрѣчаться также и въ Костромской губерніи, но мною былъ пропущенъ.

#### *Syrnium lapponicum*, Retz.

*Syrnium lapponicum*, Retz. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 294.

Этотъ видъ мною не найденъ въ Костромской губерніи, но въ виду того, что онъ найденъ на гнѣздовѣ (по Мензбиру, „Птицы Россіи“) въ губ. Ярославской, Вологодской и Вятской, возможно, что онъ гнѣздится также и въ Костромской.

#### 79. *Syrnium uralense*, Pall.

*Syrnium uralense*, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 297.

Длиннохвостая неясыть была найдена мною въ Костромской губерніи, гдѣ несомнѣнно гнѣздится. То же говоритъ и М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“.

Экз. коллекціи: (крыло) Ветлужск. у. 5.V.10.

#### 80. *Syrnium aluco*, L.

*Syrnium aluco*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 301.

Сѣрая неясыть принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленной. Въ моей коллекціи имѣется одинъ экземпляръ неясыти рыжаго типа.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. 15.IV.10.

#### *Nyctea nivea*, L.

*Nyctea nivea*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 307.

Бѣлая сова мною не найдена въ Костромской губерніи. По утверженію одного мѣстнаго охотника она была встрѣчена имъ зимою въ

Макарьевскомъ уѣздѣ. По Сабанѣеву этотъ видъ гнѣздится въ сосѣдней Ярославской губерніи. Г. Серебровскимъ была найдена зимою въ Нижегородской губерніи. На основаніи этого я считаю вполне возможнымъ, что этотъ видъ зимою во время кочевокъ залетаетъ и въ Костромскую губернію.

### 81. *Asio accipitrinus*, Pall.

*Asio accipitrinus*, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 313.

Болотная сова является самой обыкновенной и многочисленной изъ нашихъ совъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у., дер. Блиново 21.V.09; Кинешемск. у. 12.VI.09; ♂ тамъ же 14.VI.09; ♂ тамъ же 5.VII.09; тамъ же 27.VII.09; ♂ тамъ же 27.VII.09.

### 82. *Asio otus*, L.

*Asio otus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 318.

Ушастая сова принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается значительно рѣже болотной совы.

Экз. коллекціи: ♂ juv. Кинешемск. у. 12.VI.09; тамъ же 5.X.1910.

### 83. *Caprimulgus europaeus*, L.

*Caprimulgus europaeus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 404.

Козодой принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи и всюду встрѣчается въ довольно значительномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 6.V.09; ♂ тамъ же 7.V.09; ♂ Кинешемск. у. 15.VI.09; ♀ тамъ же 23.VI.09; тамъ же 7.VI.10; ♂ тамъ же 25.VI.10.

### 84. *Cypselus apus*, L.

*Cypselus apus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 410.

Стрижъ является обыкновенной гнѣздящейся птицей Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 17.V.10; тамъ же 28.VII.10.

### 85. *Picus martius*, L.

*Picus martius*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 345.

Черный дятель принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ всюду обыкновененъ, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у., Пелеговск. каз. дача 25.V.09;  
♂ Юрьевецкій у., близъ дер. Писцово 24.VI.09.

### 86. *Picus major*, L.

*Picus major*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 350.

Большой пестрый дятель является самымъ обыкновеннымъ и многочисленнымъ изъ всѣхъ дятловъ нашей губерніи. Летныхъ молодыхъ мнѣ приходилось наблюдать въ середивѣ іюня. (Въ моей коллекціи есть экземпляръ, добытый 17.VI въ Кинешемск. уѣздѣ.)

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 17.XII.07; ♀ тамъ же 18.XII.08; тамъ же XII.08; ♀ тамъ же 17.VI.09; ♀ Ветлужск. у. 27.V.10; ♀ тамъ же 31.V.10; ♂ тамъ же 1.VI.10; ♀ тамъ же 2.VI.10; ♂ тамъ же 10.VI.10.

### 87. *Picus minor*, Pall.

*Picus minor*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 358.

Малый пестрый дятель принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается значительно рѣже, чѣмъ *Picus major*. Вылетъ молодыхъ мнѣ приходилось наблюдать 5.VI, хотя въ это же время я находилъ и сильно насиженные яйца.

Экз. коллекціи: ♂ Юрьевецкій у. 24.VI.09; ♀ Кинешемск. у. 25.VIII.09; ♀ Ветлужск. у. 5.VI.10; ♂ тамъ же 31.V.10; juv. тамъ же 5.VI.10.

### 88. *Picus minor piper*, Pall.

*Picus minor piper*, Pall. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 361.

Въ моей коллекціи имѣется одинъ экземпляръ малаго сибирскаго дятла, добытый въ октябрѣ 1909 года, и у меня нѣтъ данныхъ говорить, гнѣздится или нѣтъ этотъ *subsp.* въ нашей губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемскій у. X.09.

### 89. *Picus leuconotus*, Bechst.

*Picus leuconotus*, Bechst. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 363.

Бѣлоспинный дятель принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается всюду довольно рѣдко.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. 7.VIII.09; ♂ тамъ же 7.VIII.1909; ♂ тамъ же 14.VIII.09; ♂ Варнавинскій у. 15.VI.10.

**90. *Picus leuconotus cirris*, Pall.**

*Picus leuconotus cirris*, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 363.

Сибирская форма бѣлоспиннаго дятла добыта мною на гнѣздовѣ въ Кинешемскомъ уѣздѣ. Мною убитъ одинъ экземпляръ изъ пары 13.V.1910 г.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 13.V.10.

**91. *Picus tridactylus*, L.**

*Picus tridactylus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II.

Трехпалый дятель встрѣчается всюду въ весьма ограниченномъ количествѣ, хотя и является постоянною гнѣздящеюся птицей Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. 5.V.09; ♀ Ветлужск. у. 1.VI.10; ♀ тамъ же 7.VI.10.

**92. *Gecinus viridis*, L.**

*Gecinus viridis*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 374.

Зеленый дятель принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ не только многочисленнымъ, но даже обыкновеннымъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 12.VI.09; ♀ Макарьевск. у. 8.VIII.09; juv. тамъ же 9.VIII.09.

***Gecinus canus*, Gm.**

*Gecinus canus*, Gm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 378.

Сѣдоголовый дятель мною не найденъ въ предѣлахъ Костромской губерніи. Въ Ярославской губерніи онъ, по Сабанѣву, гнѣздится въ Вологодской, по Межакову, также найденъ на гнѣздовѣ, и потому нѣтъ ничего невѣроятнаго, что онъ будетъ также найденъ и въ Костромской.

**93. *Yunx torquilla*, L.**

*Yunx torquilla*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, 339.

Вертиголовка принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Она довольно обыкновенна по рѣчнымъ долинамъ (р. Ветлуга, Унжа).

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 7.5.09.

## Отрядъ Passeriformes.

### 94. *Alauda arvensis*, L.

*Alauda arvensis*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 447.

Полевой жаворонокъ принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 8.V.09; ♂ Кинешемск. у. 17.V.10.

### *Alauda arborea*, L.

*Alauda arborea*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 452.

Юла мною не найдена въ Костромской губерніи. Что касается смежныхъ губерній, то она найдена Сабанѣвымъ въ Ярославской, а по М. А. Мензбину гнѣздится въ Вологодской и Вятской. На основаніи этого можно предполагать, что этотъ видъ гнѣздится, хотя и весьма рѣдко, также и въ Костромской губерніи.

### 95. *Corvus corax*, L.

*Corvus corax*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 457.

Воронъ является обыкновенной гнѣздящейся птицей Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленнымъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 23.VII.09.

### 96. *Corvus frugilegus*, L.

*Corvus frugilegus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 462.

Грачъ встрѣчается и гнѣздится всюду въ довольно значительномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 12.VIII.09.

### 97. *Corvus cornix*, L.

*Corvus cornix*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, 469.

Ворона принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи. Въ большомъ количествѣ гнѣздятся у насъ вороны по поймамъ рѣкъ. Почти не насиженные яйца мнѣ приходилось находить 10.V.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 22.VI.09.

**98. *Corvus monedula collaris*, Drumm.**

*Corvus monedula collaris*, Drumm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 477.

Галка принадлежит къ самымъ обыкновеннымъ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 4.VI.08.

**99. *Pica caudata*, Ger.**

*Pica caudata*, Ger. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 483.

Сорока принадлежит къ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается значительно рѣже, чѣмъ предыдущій видъ. 26.V было найдено гнѣздо съ двумя не насиженными яйцами.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 13.XII.07.

**100. *Pica leucoptera*, Gould.**

*Pica leucoptera*, Gould. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 487.

Этотъ видъ встрѣчается значительно рѣже предыдущаго. Въ моей коллекціи есть всего одинъ экземпляръ.

Экз. коллекціи: ♀ Ветлужскій у. 11.VI.10.

**101. *Garrulus glandarius*, L.**

*Garrulus glandarius*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 490.

Сойка принадлежит къ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи. Молодые у насъ вылетаютъ изъ гнѣзда въ концѣ мая и въ началѣ июня. 7.VI мнѣ пришлось наблюдать стайку штукъ въ 30—40, состоящую изъ нѣсколькихъ выводковъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемскій у. 20.XII.08; ♂ тамъ же 15.V.10; ♂ Ветлужскій у. 7.VI.10; ♂ тамъ же 7.VI.10; ♂ тамъ же 10.VI.10; Костромск. у. X.10.

**102. *Perisoreus infaustus*, L.**

*Garrulus infaustus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 499.

Букша принадлежит къ довольно обыкновеннымъ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи, притомъ въ восточныхъ уѣздахъ встрѣчается въ значительно большемъ количествѣ, чѣмъ въ западныхъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 17.V.09; ♂ Кинешемск. у. 5.VII.09; Ветлужскій у. 3.VI.10; тамъ же 3.VI.10; ♂ тамъ же 3.VI.1910.

**Nucifraga caryocatactes, L.**

*Nucifraga caryocatactes*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 502.

Орѣховка мною не найдена въ предѣлахъ Костромской губерніи. Что же касается смежныхъ губерній, то, по Сабанѣву, она гнѣздится въ Ярославской, а по М. А. Мензбиру, въ Вологодской и Вятской. Поэтому есть основаніе предполагать, что она будетъ найдена также и въ Костромской.

**103. Sturnus sophiae, Bianchi.**

Этотъ видъ, повидимому, является единственнымъ скворцомъ нашей губерніи. Прилетъ скворцовъ происходитъ у насъ въ началѣ апрѣля.

Экз. коллекціи: ♂ Перехтскій у. 18.VI.08; Макарьевскій у. 19.V.09; Кинешемскій у. 17.V.10.

**р. Plectrophanes.**

Представители рода *Plectrophanes* мною не найдены въ Костромской губерніи, такъ какъ мои сборы производились почти исключительно въ лѣтніе мѣсяцы. Я не сомнѣваюсь, что подорожники будутъ найдены въ нашей губерніи, тѣмъ болѣе, что оба вида этого рода залегаютъ въ Ярославскую (по Сабанѣву) и въ Вологодскую (по Межакову) губернію.

**104. Emberiza schoeniclus, L.**

*Emberiza schoeniclus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 535.

Камышевая овсянка принадлежитъ къ довольно обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи; она всюду встрѣчается по ивовымъ и вообще кустарниковымъ зарослямъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 2.V.09; ♂ тамъ же 2.V.09; ♂ Макарьевскій у. 6.V.09; юв. Кинешемскій у. 18.VIII.09; юв. тамъ же 25.VIII.09; ♂ Ветлужск. у. 2.VI.10; ♂ тамъ же 9.VI.10; ♂ тамъ же 9.VI.10; юв. Кинешемск. у. 25.VII.10.

**105. Emberiza citrinella, L.**

*Emberiza citrinella*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 553.

Овсянка является одной изъ самыхъ обыкновенныхъ осѣдлыхъ птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемскій у. 6.IV.08; ♂ тамъ же 17. XII.08; ♂ тамъ же 30.IV.09.

**106. *Emberiza aureola*, Pall.**

*Emberiza aureola*, Pall. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 570.

Дубровникъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ. Первые экземпляры появляются у насъ въ половинѣ мая (1909 г.), улетаетъ же дубровникъ во второй половинѣ (около 20-хъ чиселъ) іюля.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевскій у. 19.V.09; ♂ тамъ же 20.V.1909; ♀ тамъ же 20.V.09; juv. Кинешемскій у. 9.VII.09; ♂ Ветлужскій у. 14.VI.10.

**107. *Loxia curvirostra*, L.**

*Loxia curvirostra*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 577.

Клестъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но гнѣздится каждый годъ въ различномъ количествѣ. Такъ, въ 1909 году клесты у насъ встрѣчались въ огромномъ количествѣ, въ 1910-мъ же ихъ почти не приходилось наблюдать.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемскій у. 17.XII.08; ♀ тамъ же 22.XII.08; тамъ же 24.III.09; тамъ же 24.III.09; ♂ тамъ же I.V.09; ♀ Макарьевскій у. 8.V.09.

***Loxia pityopsittacus*, Bechst.**

*Loxia pityopsittacus*, Bechst. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 581.

Клестъ-сосновикъ, хотя мною и не найденъ въ Костромской губерніи, но, повидимому, долженъ въ незначительномъ количествѣ гнѣздиться въ нашихъ хвойныхъ лѣсахъ, такъ какъ онъ гнѣздится, по Сабанѣву, въ губерніи Ярославской, а по Межакову—въ губерніи Вологодской.

**108. *Pyrrhula coccynea*, De Sel.**

*Pyrrhula coccynea*, De Sel. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 589.

Снѣгирь принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи; зимою, благодаря прилету кочующихъ болѣе сѣверныхъ особей, снѣгири у насъ становятся болѣе многочисленными.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемскій у. 17.XII.08; juv. тамъ же 15.VII.10.

**109. *Corpodacus erythrinus*, Pall.**

*Corpodacus erythrinus*, Pall. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 596.

Чечевица принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленной.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевскій у. 7.V.09; ♂ тамъ же 18.V.09; ♀ тамъ же 20.V.09; ♂ Кинешемскій у. 12.V.10; Ветлужскій у. 6.VI.1910.

#### 110. *Acanthis linaria*, L.

*Acanthis linaria*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 607.

Чечетка была встрѣчена мною только во время зимнихъ кочевокъ и, повидимому, не гнѣздится въ нашей губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемскій у. 19.XII.08.

#### 111. *Acanthis cannabina*, L.

*Acanthis cannabina*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 613.

Коноплянка принадлежитъ къ числу весьма рѣдкихъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи. Въ коллекціи г. Волнухина имѣется одинъ экземпляръ, добытый лѣтомъ.

#### 112. *Fringilla montifringilla*, Briss.

*Fringilla montifringilla*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 621.

Юрокъ былъ встрѣченъ мною на гнѣздовьяхъ только въ восточной части губерніи (уѣзды Ветлужскій и Варнавинскій), гдѣ онъ встрѣчается въ значительномъ количествѣ. Въ виду того, что, по Сабанѣву, юрокъ гнѣздится въ Ярославской губерніи, надо предположить, что этотъ видъ населяетъ всю нашу губернію, но во всякомъ случаѣ въ западной и центральной части губерніи онъ распространенъ въ весьма ограниченномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужскій у. 31.V.10; ♂ тамъ же 1.VI.10; ♀ тамъ же 3.VI.10.

#### 113. *Fringilla coelebs*, L.

*Fringilla coelebs*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 626.

Зябликъ—одна изъ самыхъ многочисленныхъ и обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемскій у. 29.IV.09; ♂ тамъ же 30.IV.1909; тамъ же 5.VI.09; juv. Макарьевскій у. 13.VIII.09.

#### 114. *Passer domesticus*, Briss.

*Passer domesticus*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 632.

Воробей у насъ живетъ осѣдло всюду въ сосѣдствѣ съ человекомъ и встрѣчается въ значительномъ количествѣ.

**115. Passer montanus, Briss.**

*Passer montanus*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 636.

Полевой воробей является одной изъ самыхъ обыкновенныхъ осѣдлыхъ птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 19.XII.08.

**116. Chrysomitris spinus, L.**

*Chrysomitris spinus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 646.

Чижь въ качествѣ гнѣздящейся птицы распространенъ въ Костромской губерніи всюду, но нигдѣ не встрѣчается въ большомъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевскій у. 17.V.09; ♀ Ветлужск. у. 3.IV.1910.

**117. Carduelis elegans, Stph.**

*Carduelis elegans*, Stph. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 651.

Щеголь гнѣздится во всей Костромской губерніи, но всюду встрѣчается рѣдко.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 31.XII.08; ♂ Кинешемск. у. 28.VII.10; juv. тамъ же 1.VIII.10.

**118. Chloris chloris, Briss.**

*Chloris chloris*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 661.

Зеленушка принадлежитъ къ числу гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи; въ восточныхъ уѣздахъ (Ветлужскій, Варнавинскій) я встрѣчалъ этотъ видъ въ значительномъ количествѣ. Молодой, хорошо летающій экземпляръ былъ добытъ мною 10.VI.

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужск. у. 31.V; ♀ тамъ же 10.VI.10; juv. тамъ же 10.VI. 10.

**119. Certhia familiaris, L.**

*Certhia familiaris*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 669.

На основаніи матеріала, добытаго мною, я не могу опредѣленно утверждать, что пищуха гнѣздится въ Костромской губерніи, такъ какъ одинъ экземпляръ былъ убитъ 20.VIII, а другой — 24.XII. Но на основаніи того, что пищуха гнѣздится, по Сабанѣву, въ Ярославской, а по Межакову, въ Вологодской губерніи, можно предположить

гнѣздованіе этого вида также и въ Костромской губерніи. Что же касается утвержденія Сабанѣева, что пищуха принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ и случайно зимующимъ птицамъ Ярославской губерніи, то мнѣ кажется, это положеніе должно быть отвергнуто, такъ какъ у насъ этотъ видъ зимою встрѣчается, хотя и не часто, но во всякомъ случаѣ постоянно. Повидимому, зимою къ нашимъ гнѣздящимся особямъ (если таковыя имѣются) прибавляются еще болѣе сѣверные экземпляры, которые или остаются у насъ на зимовку, или только посѣщаютъ насъ на пути своихъ болѣе далекихъ кочевокъ.

Экз. коллекціи: Кинешемскій у. 24.II.08; Кинешемск. у. 20.VIII.09.

#### 120. *Chelidon urbica*, L.

*Chelidon urbica*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, 674.

Городская ласточка принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи.

#### 121. *Cotile riparia*, Briss.

*Cotile riparia*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 679.

Береговая ласточка гнѣздится у насъ въ большомъ количествѣ, главнымъ образомъ по берегамъ рѣкъ. Первые яйца сносятся 20—25-го мая (въ это время можно найти обыкновенно одно, максимумъ два яйца). Приблизительно въ это же время мнѣ приходилось наблюдать ухаживанія самца за самочкой. Мнѣ ни разу не удалось наблюдать, какимъ образомъ береговая ласточка вырываетъ свои гнѣзда, можетъ быть потому, что въ это время всѣ гнѣзда были уже сдѣланы. Я попробовалъ сдѣлать опытъ: поймалъ одну самку и посадилъ ее въ едва начатое гнѣздо. Птичка сначала старалась ускользнуть въ промежутокъ между пальцами моей руки, которая служила преградой, но когда это ей не удалось, она стала энергично рыть въ глубину свою норку. Тѣло птички приняло горизонтальное положеніе, она опиралась головой и кончикомъ хвоста въ противоположныя стѣнки норки и энергично раскапывала песокъ своими лапками, при чемъ носикъ не принималъ почти никакого участія. Просматривая только что начатыя норки, я также находилъ исключительно слѣды лапокъ, которыя, повидимому, и служатъ почти исключительно орудіемъ для вырванія норокъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 23.V.09.

**122. *Hirundo rustica*, L.**

*Hirundo rustica*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 686.

Касатка является самой обыкновенной и многочисленной изъ нашихъ гнѣздящихся ласточекъ. Одинъ изъ экземпляровъ моей коллекціи заслуживаетъ вниманія въ томъ отношеніи, что у него кирпично-красный пигментъ заходитъ и на шейникъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 12.V.09; ♂ тамъ же 12.V.09; Кинешемск. у. 8.VI.09; тамъ же 5.VII.09.

**123. *Muscicapa atricapilla*, L.**

*Muscicapa atricapilla*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 701.

Мухоловка пеструшка принадлежитъ къ числу довольно обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 1.V.09; ♂ Макарьевск. у. 13.V.09; Юрьевецк. у. 25.VI.09; ♀ Кинешемск. у. 10.V.10; ♂ тамъ же 17.V.10.

**124. *Muscicapa grisola*, L.**

*Muscicapa grisola*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 704.

Сѣрая мухоловка приблизительно у насъ такъ же обыкновенна въ качествѣ гнѣздящейся птицы, какъ и пеструшка.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 7.V.09; ♂ Кинешемск. у. 31.VII.09.

**125. *Lanius collurio*, L.**

*Lanius collurio*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 717.

Жуланъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи; любимой станціей являются поймы рѣкъ, поросшія мелкой растительностью. 30.VI мнѣ удалось найти гнѣздо съ шестью птенцами, еще лишенными пуха.

Въ моей коллекціи имѣется одинъ экземпляръ жулана съ весьма сильной редукаціей рыжаго пигмента на спинѣ, что приближаетъ его къ, повидимому, не существующей кавказской формѣ *L. col. kobu-  
lini*, Buturl.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 8.V.09; ♀ тамъ же 12.V.09; ♂ тамъ же 28.V.09; тамъ же 28.V.09; ♀ Кинешемск. у. 22.VII.09; ♂ Ветлужск. у. 27.V.10; ♀ тамъ же 27.V.10; ♂ тамъ же 9.VI.10; ♂ тамъ же 9.VI.10; ♂ тамъ же 14.VI.10; Кинешемск. у. 14.VI.10;

♀ тамъ же 30.VI.10; тамъ же 13.VII.10; ♂ тамъ же 13.VII.10; ♀ тамъ же 28.VII.10.

**126. *Lanius excubitor*, L.**

*Lanius excubitor*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 728.

Большой сорокопутъ принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. За два года экскурсированія мнѣ удалось наблюдать всего одинъ выводокъ на слабо заросшей сѣчѣ Кинешемскаго уѣзда.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 12.VI.09; ♂ juv. тамъ же 12.VI.09.

**127. *Oriolus galbula*, L.**

*Oriolus galbula*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 735.

Иволга является довольно обыкновенной гнѣздящейся птицей Костромской губерніи. Весенній прилетъ происходитъ въ концѣ апрѣля.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. 1.V.09; ♀ Ветлужск. у. 1.VI.10; ♀ Кинешемск. у. 1.VIII.10.

**128. *Anthus arboreus*, Briss.**

*Anthus arboreus*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 753.

Лѣсной конекъ принадлежитъ къ весьма обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 1.V.09; ♂ Макарьевск. у. 20.V.09.

***Anthus pratensis*, Briss.**

*Anthus pratensis*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 761.

Луговой конекъ мною не найденъ въ предѣлахъ Костромской губерніи. Сабанѣевъ указываетъ этотъ видъ для Ярославской губерніи, поэтому есть основаніе предполагать, что онъ также будетъ найденъ и въ Костромской.

**129. *Motacilla flava*, L.**

*Motacilla flava*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 770.

Желтая трясогузка принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Всюду по болотамъ, волжскимъ островамъ и вообще на низкихъ мѣстахъ этотъ видъ встрѣчается въ огромномъ количествѣ. Въ моей коллекціи есть какъ типичная *M. flava*, такъ и переходы къ *M. beema* и *M. borealis*.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 2.V.09; ♂ тамъ же 2.V.09;

♂ тамъ же 2.V.09; ♂ Макарьевскій у. 12.V.09; ♂ тамъ же 19.V.09;  
♂ тамъ же 23.V.09; ♀ тамъ же 24.V.09; ♂ тамъ же 27.V.09; Вар-  
навинск. у. 16.VI.10; Кинешемск. у. 28.VII.10.

### 130. *Motacilla alba*, L.

*Motacilla alba*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 784.

Бѣлая трясогузка является одной изъ обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи. 10.V было найдено гнѣздо съ шестью не насиженными яйцами, помѣщавшееся въ разсѣлившій ивы; 24.V найдено три гнѣзда, каждое съ 6-ю яйцами, слабо насиженными; гнѣзда помѣщались въ обрывѣ рѣки Унжи. 18.VIII.09 я наблюдалъ большую стаю трясогузокъ на волжскомъ островѣ, почти цѣликомъ состоящую изъ молодыхъ особей; къ 25.VIII осталось очень небольшое количество,—повидимому, большинство уже улетѣло на югъ. Изъ этихъ наблюденій видно, что отлетъ у насъ происходитъ во второй половинѣ или, вѣрнѣе, въ концѣ августа.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. 28.IV.09; juv. тамъ же 18.VIII.09;  
juv. тамъ же 25.VIII.09.

### *Troglodytes parvulus*. L.

*Troglodytes parvulus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 789.

Крапивникъ мною не добытъ въ предѣлахъ Костромской губерніи, но возможно, что при болѣе тщательномъ изслѣдованіи онъ будетъ найденъ въ нашихъ мѣстахъ, такъ какъ онъ гнѣздится въ Ярославской (Сабанѣевъ) и въ Вологодской (Межаковъ) губерніяхъ.

### p. *Sitta*.

Ни уральскій, ни европейскій поползень мною не найденъ въ Костромской губерніи. По Сабанѣеву оба вида поползня (*S. europaea*, L. и *S. uralensis*, Licht.) гнѣздятся въ Ярославской губерніи, такъ что возможно нахожденіе этихъ видовъ и въ нашей губерніи.

### 131. *Lophophanes cristatus*, Briss.

*Lophophanes cristatus*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 802.

Хохлатая синица принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленна.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 24.XII.08; ♀ Макарьевск. у. 17.V.09; ♀ Велужск. у. 1.VI.10.

**Cyanistes coeruleus, L.**

*Cyanistes coeruleus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 806.

Зеленая лазоревка мною не найдена въ Костромской губерніи. По Сабанѣву, гнѣздится въ Ярославской.

**132. Cyanistes cyanus, Pall.**

*Cyanistes cyanus*, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 811.

Бѣлую лазоревку мнѣ удалось наблюдать всего одинъ разъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ, на берегу Унжи 15.V.09 года. По Сабанѣву, этотъ видъ гнѣздится въ Ярославской губерніи.

**133. Paecile borealis, De Selys.**

*Paecile borealis*, De Selys. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 815.

Гаичка принадлежитъ къ весьма обыкновеннымъ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи и встрѣчается одинаково въ большомъ количествѣ какъ зимою, такъ и лѣтомъ.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. 15.XII.08; ♂ тамъ же 27.III.09; ♂ Макарьевск. у. 5.V.09.

**134. Parus ater, L.**

*Parus ater*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 824.

Синица московка — у насъ довольно рѣдкая птица. Въ моей коллекціи есть одинъ экземпляръ, добытый 12.VIII, и поэтому я не могу сказать ничего опредѣленнаго о ея гнѣздованіи. По Сабанѣву, она гнѣздится въ Ярославской губерніи, а по Межакову — въ Вологодской. Опираясь на эти данныя, можно почти увѣренно сказать, что московка должна гнѣздиться также и въ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: Макарьевск. у. 12.VIII.09.

**135. Parus major, Briss.**

*Parus major*, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 828.

Большая синица принадлежитъ къ числу осѣдлыхъ птицъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленна, хотя не можетъ считаться и рѣдкой.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. 31.VII.09; ♂ тамъ же 22.VIII.09; ♂ Ветлужск. у. 23.V.10.

**136. *Acredula caudata*, L.**

*Acredula caudata*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 338.

Долгохвостая синица принадлежит къ числу гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 23.III.09; ♀ Макарьевск. у. 22.V.09.

**137. *Regulus cristatus*, Koch.**

*Regulus cristatus*, Koch. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 849.

Королекъ принадлежит къ осѣдлымъ птицамъ Костромской губерніи, но всюду встрѣчается въ ограниченномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 16.XII.08; ♂ Макарьевск. у. 17.V.09.

**138. *Locustella fluviatilis*, Wolf.**

*Locustella fluviatilis*, Wolf. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 861.

Рѣчная камышевка принадлежит къ числу довольно обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 22.V.09; ♂ Юрьевецк. у. 23.VI.09; ♂ тамъ же 24.VI.09.

***Locustella locustella*, Lath.**

*Locustella locustella*, Lath. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 868.

Камышевка сверчокъ не найдена мною въ предѣлахъ Костромской губерніи. Что же касается смежныхъ губерній, то Сабанѣевымъ она указывается для губ. Ярославской и Мензбиромъ (Птицы Россіи)—для Вологодской. Поэтому возможно, что этотъ видъ будетъ также найденъ и въ Костромской.

**139. *Acrocephalus phragmitis*, Bechst.**

*Acrocephalus phragmitis*, Bechst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 880.

Барсучокъ является самой обыкновенной изъ нашихъ гнѣздящихся камышевокъ. Его можно встрѣтить всюду, гдѣ есть водоемы. Особенно онъ многочисленъ по зарослямъ черныхъ рѣчекъ и на волжскихъ островахъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у., островъ на Волгѣ 2.V.09; ♂ тамъ же 2.V.09; ♂ Макарьевск. у. 18.V.09; тамъ же 20.V.09; ♂ тамъ же 20.V.09; Юрьевецкій у. 26.VI.09; Костромск. у. 13.VII.09; juv. Кинешемск. у. 25.VIII.09.

#### 140. *Acrocephalus palustris*, Bchst.

*Acrocephalus palustris*, Bchst. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 893.

Болотная камышевка принадлежит къ числу гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи, но встрѣчается въ значительно меньшемъ количествѣ, нежели предыдущій видъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевскій у. 18.V.09; ♂ Кинешемск. у., островъ на Волгѣ 7.VI.09; ♂ Кинешемск. у. 8.VI.09.

#### 141. *Acrocephalus dumetorum*, Blyth.

*Acrocephalus dumetorum*, Blyth. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 889.

Садовая камышевка принадлежит къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ нашей губерніи, но встрѣчается въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ *Acrocephalus phragmitis*. Найдена мною, какъ и оба предыдущіе вида, на волжскихъ островахъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 28.V.09; тамъ же 28.V.09. ♂ Кинешемск. у. 7.VI.09.

#### 142. *Hypolais icterina*, Vieill.

*Hypolais icterina*, Vieill. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 903.

Лѣсная малиновка является одной изъ самыхъ обыкновенныхъ гнѣздящихся пѣвчихъ птицъ Костромской губерніи. Она одинаково охотно селится какъ въ лиственныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ, такъ и въ сосновыхъ борахъ. 4.VI было найдено гнѣздо, помѣщавшееся на ольхѣ на высотѣ двухъ аршинъ отъ земли; въ гнѣздѣ было 5 не насиженныхъ яицъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемскій у. 27.V.08; Макарьевск. у. 5.V.09; ♀ тамъ же 11.V.09; ♂ Юрьеveck. у. 25.VI.09.

#### 143. *Phylloscopus viridanus*, Blyth.

*Phylloscopus viridanus*, Blyth. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 918.

Зеленая пѣночка принадлежит къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается въ довольно ограниченномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у., Соловатовская уд. дача (хвойный лѣсъ съ незначительной примѣсью березы) 17.V.09; тамъ же (заросли ольхи по рѣкѣ) 27.V.09.

**144. *Phylloscopus sibilatrix*, Bchst.**

*Phylloscopus sibilatrix*, Bchst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 922.

Пѣночка желтобровка является одной изъ самыхъ обыкновенныхъ и многочисленныхъ гнѣздящихся пѣночекъ Костромской губерніи. Селится охотвѣ всего въ смѣшанныхъ лѣсахъ, хотя встрѣчается также въ хвойныхъ и лиственныхъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. (смѣш. лѣсъ) 15.VI.09; тамъ же (листв. лѣсъ) 13.V.10; Ветлужск. у. (хвойн. лѣсъ) 31.V.10; ♂ тамъ же (смѣш. лѣсъ) 9.VI.10.

**145. *Phylloscopus trochilus*, L.**

*Phylloscopus trochilus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 926.

Этотъ видъ является самымъ обыкновеннымъ и многочисленнымъ изъ всѣхъ нашихъ пѣночекъ.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 29.IV.09; ♂ тамъ же 29.IV.09; ♂ Макарьевск. у. 5.V.09; Кинешемск. у. 5.VI.09; ♂ тамъ же 25.VIII.09.

**146. *Phylloscopus collybita*, Vieill.**

*Phylloscopus collybita*, Vieill. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 931.

Пѣночка кузнечикъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но всюду встрѣчается въ весьма ограниченномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. 25.V.09; ♂ Кинешемск. у. 17.VI.09.

**147. *Sylvia nisoria*, Bchst.**

*Sylvia nisoria*, Bchst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 946.

Ястребиная славка является весьма рѣдкой гнѣздящейся славкой Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 28.V.09; ♂? Кинешемск. у. 5.VII.09; juv. Юрьеveckій у. 23.VI.09.

**148. *Sylvia cinerea*, Bchst.**

*Sylvia cinerea*, Bchst. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 950.

Сѣрая славка является одной изъ обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 20.V.09; ♂ тамъ же 20.V.09; тамъ же 28.V.09.

**149. *Sylvia hortensis*, Bchst.**

*Sylvia hortensis*, Bchst. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 955.

Садовая славка у насъ такъ же многочисленна въ качествѣ гнѣздящейся птицы, какъ и предыдущій видъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 5.V.09; ♂ тамъ же 21.V.09; тамъ же 24.V.09; ♂ тамъ же 28.V.09; Ветлужск. у. 25.V.10; ♀ тамъ же 5.VI.10.

**150. *Sylvia curruca*, L.**

*Sylvia curruca*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 960.

Славка завирушка принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается нѣсколько рѣже предыдущаго вида.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. 9.V.09; ♂ Кинешемск. у. 17.VI.09.

**151. *Sylvia atricapilla*, L.**

*Sylvia atricapilla*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 966.

Черноголовая славка встрѣчается нѣсколько рѣже *S. curruca*; охотно гнѣздится по сырымъ листовнымъ лѣсамъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 7.V.09; ♀ Кинешемск. у. 6.VI.09.

**152. *Erithacus philomela*, Bchst.**

*Erithacus philomela*, Bchst. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 978.

Соловей принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Излюбленными мѣстами жительства являются поймы волжскихъ притоковъ. 25.V было найдено гнѣздо съ двумя не насиженными яйцами.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 5.V.09; ♂ тамъ же 7.V.09; ♂ тамъ же 8.V.09; тамъ же 18.V.09.

**153. *Erithacus sueticus*, L.**

*Erithacus sueticus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 985.

Варакушка принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 18.V.09.

**154. Erithacus rubecula, L.**

*Erithacus rubecula*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 990.

Зорянка принадлежит къ довольно обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Излюбленными мѣстами жительства являются хвойные (сосна, ель) и смѣшанные лѣса съ подлѣскомъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. (хвойн. лѣсъ) 17.V.09; ♂ Кинешемск. у. (хвойн. лѣсъ) 4.VI.09; ♀ тамъ же (смѣш. лѣсъ) 10.V.09; juv. тамъ же (смѣш. лѣсъ) 21.VIII.09.

**155. Rutililla phoenicurus, L.**

*Rutililla phoenicurus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1001.

Горихвостка лысушка принадлежит къ довольно обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Полныя кладки не насиженныхъ яицъ мнѣ приходилось наблюдать въ срединѣ мая (16-го). Гнѣзда съ еще голыми птенцами я находилъ въ первой половинѣ іюня (10-го и 12-го). Вылетъ птенцовъ происходитъ въ началѣ іюля (9.VII). Изъ всѣхъ найденныхъ гнѣздъ два помѣщались въ дуплахъ, одно въ кучѣ хвороста и одно подъ крышей крестьянскаго дома.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 30.IV.09; ♀ тамъ же 10.VI.09; juv. тамъ же 9.VII.09.

**156. Pratincola rubetra, L.**

*Pratincola rubetra*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1017.

Луговой чеканъ — довольно частая и обыкновенная гнѣздящаяся птица въ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевскій у. 13.V.09; ♂ тамъ же 19.V.09; ♂ Кинешемск. у. 12.VI.09; juv. тамъ же 5.VII.09; ♂ Ветлужск. у. 7.VI.10.

**157. Saxicola oenanthe, L.**

*Saxicola oenanthe*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1022.

Чеканъ каменка принадлежит къ числу довольно обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 11.VI.09; Макарьевск. у. 6.VIII.09; ♀ Кинешемск. у. 27.VI.10; ♂ тамъ же 27.VII.10.

**158. *Cinclus melanogaster*, Brehm.**

*Cinclus melanogaster*, Brehm. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1039.

Водяного воробья мнѣ пришлось наблюдать на гнѣздовѣ только въ Макарьевскомъ уѣздѣ, въ Пелеговской казенной дачѣ. Тамъ они гнѣздятся и держатся круглый годъ по двумъ быстро текущимъ рѣкамъ: Шомохтѣ и Вьюнчищѣ.

**159. *Accentor modularis*, L.**

*Accentor modularis*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1044.

Лѣсная завирушка принадлежитъ къ числу весьма рѣдкихъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи; мною наблюдалась всего одинъ разъ въ Кинешемскомъ уѣздѣ.

**160. *Merula merula*, L.**

*Merula merula*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1061.

Черный дроздъ распространенъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы во всей Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: Кинешемскій у. 4.VI.09; ♂ тамъ же 14.VI.10.

**161. *Turdus viscivorus*, L.**

*Turdus viscivorus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1068.

Деряба принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ Костромской губерніи. Вылетъ молодыхъ происходитъ въ послѣднихъ числахъ мая (28—30.V).

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. 11.V.09; ♀ Кинешемск. у. 17.VI.09; ♂ тамъ же 28.VI.09; ♂ Ветлужскій у. 23.V.10.

**162. *Turdus musicus*, L.**

*Turdus musicus*, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 1073.

Пѣвчій дроздъ распространенъ въ нашей губерніи еще въ большемъ количествѣ, чѣмъ предыдущій видъ. Онъ гнѣздится въ нашей губерніи дважды въ лѣто. Не насиженные яйца первой кладки мнѣ приходилось наблюдать въ серединѣ мая (14-го и 16-го); 2.VI найдены слабо насиженные; не насиженные яйца второй кладки встрѣчаются у насъ въ концѣ юня (23-го—три яйца).

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 14.V.08; ♂ Кинешемск. у. 10.VI.09; ♀ тамъ же 17.VI.09; ♀ тамъ же 21.VI.09; Макарьевск. у. 12.VIII.09; Кинешемск. у. 12.V.10; ♀ тамъ же 6.VII.10.

### 163. *Turdus iliacus*, L.

*Turdus iliacus*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 1076.

Бѣлобровый дроздъ является самымъ обыкновеннымъ и многочисленнымъ изъ нашихъ дроздовъ. Кладка, высиживание и вылупленіе обнимаютъ вторую половину апрѣля и май мѣсяць. Вотъ свѣдѣнія, которыя имѣются въ моемъ распоряженіи: 7-го мая найдено гнѣздо съ вылупляющимися и только что вылупившимися птенцами; 10 мая— гнѣздо съ 5-ю слабо насиженными яйцами; 25 мая— гнѣздо съ 6-ю не насиженными яйцами; 28-го мая— гнѣздо съ только что вылупившимися птенцами.

Повидимому, не насиженные яйца, найденныя 25-го мая, относятся уже ко второй кладкѣ, которая изрѣдка наблюдается въ нашихъ мѣстахъ.

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 7.V.08; ♀ Кинешемскій у., 16.V.08; ♂ тамъ же 7.VI.09.

### 164. *Turdus pilaris*, L.

*Turdus pilaris*, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 1079.

Рябинникъ найденъ только въ Нерехтскомъ уѣздѣ и притомъ въ весьма значительномъ количествѣ. Я не знаю, чѣмъ объяснить то, что нигдѣ въ остальной губерніи мнѣ не удалось встрѣтить этотъ видъ. Относительно гнѣздового періода у меня имѣется слѣдующій матеріалъ: 9.V найдено гнѣздо съ 4-мя голыми птенцами; 13.V— гнѣздо съ 5-ю голыми птенцами; 19.V наблюдался выводокъ летныхъ птенцовъ; 21.V— гнѣздо съ 5-ю начавшими оперяться птенцами; 23.V— гнѣздо съ 4-мя голыми птенцами и съ двумя яйцами.

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 4.V.08; ♀ тамъ же 22.V.08; тамъ же 13.VI.08.

### Списокъ литературы по орнитологіи сосѣднихъ губерній.

Л. П. Сабантеевъ. Матеріалы для фауны Ярославской губерніи. Труды Ярославскаго Губернскаго Статистическаго Комитета, выпускъ IV. 1868 г.

Л. П. Сабантеевъ. Матеріалы для фауны Ярославской губерніи. Bull. Soc. Natur. Moscou. 1869 г.

А. Мѣякофф. Catalogue des oiseaux observés dans le gouvernement de Wologda. Bull. Soc. Nat. Moscou, XXIX, 1856, ii, p. 625—635.

В. Д. Андреевъ и В. Бианки. Къ авифаунѣ Устьсольскаго уѣзда, Вологодской губерніи. Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, т. XV, 1910 г.

## МАТЕРІАЛЫ КЪ ПОЗНАНІЮ ФАУНЫ И ФЛОРЫ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

### Отдѣль зоологическій.

Выпускъ 1-й. П. П. Сушкинъ. Птицы Тульской губ.—Н. Зарудный. Матеріалы для орнитолог. фауны сѣвер. Персіи. — Его же, Птицы долины р. Орчика. — Н. Н. Сомовъ. *Astur brevipes*. (Съ 1 табл.). — И. Я. Слѣцовъ. Позвоночныя Тюменскаго округа.—М. Хомяковъ. Списокъ дневныхъ бабочекъ Рязанской и Тульской губерніи. Ц. 2 р.

Выпускъ 2-й. Н. Зарудный. Орнитологическая фауна Закаспійскаго края. Ц. 3 р. 50 к.

Выпускъ 3-й. Ф. В. Вильконскій. Орнитологическая фауна Аджаріи, Гуріи и сѣверо-восточнаго Лазистана. (Съ картой.)—Н. Динникъ. Медвѣдь и его образъ жизни на Кавказѣ. — Н. Зарудный. Дополненія къ „Орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края“.—Л. Круликовскій. Забѣтка о фаунѣ *Macrolepidoptera* окрестностей г. Уфы.—Н. Зарудный. Забѣтка по фаунѣ млекопитающихъ Оренбургскаго края. Ц. 2 р. 50 к.

Выпускъ 4-й. П. П. Сушкинъ. Птицы Уфимской губ. Ц. 2 р. 50 к.

Выпускъ 5-й. Н. Я. Динникъ. Млекопитающія горной полосы Кубанской обл.—Л. А. Круликовскій. Матеріалы для познанія фауны чешуекрылыхъ Россіи. (Съ 1 табл.)—Е. В. Цвѣтковъ. Орнитологическія наблюденія въ окрестностяхъ Бѣлаго Ключа.—М. М. Хомяковъ. Птицы Рязанской губ. (Съ 1 табл.)—А. Н. Карамзинъ. Птицы Бугурусланскаго у. — П. П. Сушкинъ. Дополнительные замѣтки о птицахъ Уфимской губ. Ц. 3 р.

Выпускъ 6-й. Н. Я. Динникъ. Кавказскій олень.—С. А. Рѣзцовъ. Птицы Пермской губ. (Съ 1 табл.)—Л. А. Круликовскій. Матеріалы для познанія фауны чешуекрылыхъ Россіи. (Съ 1 табл.) Ц. 2 р.

Выпускъ 7-й. Ф. Гельцерманъ. Каталогъ чешуекрылыхъ окрестностей г. Перми.—Н. Н. Аделунгъ. Прямокрылыя насѣкомыя Тургайской обл.—А. А. Яхонтовъ. Матеріалы по фаунѣ *Lepidoptera*.

Новая цена  
5 р. 75 к.

Rhoralosaga Владимірской и Нижегородской губ. — Б. П. Корѣвъ и Н. А. Зарудный. Орнитологическая фауна Семирѣченскаго края. — Л. А. Молчановъ. Списокъ птицъ естественно-историческаго музея Таврическаго губ. земства. — В. Левчунъ. Замѣтки изъ поѣздки на о. Челекенъ въ 1902 г.

Выпускъ 8-й. П. П. Сушкинъ. Птицы средней Киргизской степи. Съ 1 хромолит. и 7 фототип. Ц. 7 р. 50 к.

Выпускъ 9-й. Н. Я. Динникъ. Кавказскіе каменные козлы или туры. — Л. Круликовскій. Чешуекрылыя Вятской губ. — Г. И. Поляковъ. Къ орнитологической фаунѣ Московской губ. *Columbus arcticus*. — А. Н. Карамзинъ. Добавленіе къ статьѣ „Птицы Бугурусланскаго уѣзда“ и т. д. — С. И. Огневъ. Матеріалы для орнитофауны Смоленской губ. Ц. 2 р.

Выпускъ 10-й. Г. И. Поляковъ. Къ орнитологической фаунѣ Московской губ. — С. А. Рѣзцовъ. Матеріалы къ изуч. орнитологич. фауны Тамбовской губ. — М. Мензбиръ. Обзоръ ремезовъ туркестанско-сибирской фауны. — А. Ѳ. Котсъ. Замѣтки объ орнитологич. фаунѣ юго-западной Сибири. Ц. 2 р.

Выпускъ 11-й. В. Н. Бостанжогло. Орнитологическая фауна Арало-Каспійскихъ степей. Съ 2 картами. Ц. 2 р. 50 к.

Выпускъ 12-й. В. Н. Шнитниковъ. Птицы Минской губерніи. Съ картой и чертежами. Ц. 3 р. 50 к.

Выпускъ 13-й. Проф. П. П. Сушкинъ. Птицы Минусинскаго края, западнаго Саяна и Урянхайской земли. Съ картой, 5-ью фототип. и 1-ой хромолитографир. табл. Ц. 3 р. 75.

---

Цѣна 3 р.

---

---

Складъ изданій въ бюро Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы. Университетъ.