

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Московское отделение Всесоюзного орнитологического общества
Центральная научно-исследовательская лаборатория
охотничьего хозяйства и заповедников Главохоты
РСФСР

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ ЦЕНТРА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Москва 1990

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ИХ ОХРАНА

СВЕДЕНИЯ О ПТИЦАХ КРАСНОЙ КНИГИ СССР В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. Бакка, А.И. Бакка
Горьковский областной комитет по охране природы,
Горьковский университет

Материалом для настоящего сообщения послужили наши исследования 1980-1989 гг., результаты опросов охотников, работников лесного и охотничьего хозяйства, проведенных сектором "Фауна" Дружины охраны природы Горьковского университета в 1981-1989 гг. и литературные данные.

В Горьковской области доказано гнездование 7 видов и предполагается гнездование 1 вида птиц, занесенных в Красную книгу СССР.

Черный аист всегда был крайне редок. В литературе отмечены отдельные случаи его гнездования в 1930-40 годы по рекам Керженец, Сережа, Шанга (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967; Зимин, 1974). В последнее десятилетие достоверных сведений о гнездовании нет. В ходе опросов получены сведения о двух погибших гнездах: в 1981 г. в Ветлужском районе гнездо расстреляно браконьерами, и в 1984 г. в Тонкинском районе срублено дерево с гнездом. По свидетельствам многих очевидцев, в 1984 г. пара черных аистов держалась в течение всего лета в пойме р. Ветлуги у с. Горки Варнавинского района. Кроме того, основываясь на сведениях, полученных от местных жителей, можно предположить гнездование этих птиц на р. Люнде в Воскресенском районе.

Беркут был довольно обычен в Заволжье до 1950-х годов (Пузанов и др., 1955), но в последующем его численность сократилась, и уже Е.М. Воронцов (1967) отмечает, что эта птица нигде не является многочисленной, а Н.И. Зимин (1974) относит его к крайне редким видам. Нами гнездование беркута отмечено трижды. В 1984 г. обнаружено жилое гнездо в Ветлужском районе на границе с Костромской областью; при последующих проверках в 1985 и 1987 гг.

выяснено, что гнездо регулярно посещается беркутом, но птенцы не выводились. В 1987 г. беркут гнезвился близ оз. Б.Плотово в Воротыньском районе; однако, в 1988 г. выводка там не было, хотя у гнезда в течение всего лета держалась одиночная птица. В начале августа 1987 г. у истока р. Керженец в Ковернинском районе были отмечены слеток и взрослая птица; по свидетельству охотников, поблизости имеется гнездо беркута. В мае 1988 г. нами встречена одиночная птица в 6 км от оз. Линево в Воротыньском районе. По свидетельствам местных жителей, зимой 1988 г. около оз. Линево было срублено дерево с гнездом беркута. Кроме того, в ходе опросов населения получены данные о гибели в результате рубок еще трех гнезд: в 1978 и в 1979 гг. в Ветлужском районе и в 1985 г. в Тоншаевском районе. Местом вероятного гнездования беркута является Ивановский заказник, откуда имеются неоднократные сообщения о встречах птиц в гнездовой период (Путилова, устн. сообщ.). На осенних кочевках беркут наблюдался в Ветлужском, Ковернинском, Городецком, Спасском, Лысковском, Воротыньском районах. Эти птицы нередко становятся жертвой браконьеров или гибнут в капканах; за последние 10 лет нам известны 4 подобных случая.

Могильник. В литературе указываются единичные случаи его гнездования на юге области: на р. Пьяне близ Ичалок, на р. Крутец (Пузанов и др., 1955). Н.И. Зимин (1974) сообщает также о встрече одиночной птицы в 1958 г. на юге Сергачского района. В настоящее время известно одно гнездо могильника, используемое в течение многих лет - в Ичалковском бору (Перевозский район). В июле 1988 года одиночная птица была отмечена у с. Китово Сергачского района. По сообщению В.И. Токарева, гнездование могильника вероятно также в Вознесенском районе.

Орлан-белохвост. По мнению И.И. Пузанова с соавторами (1955), до 1950-х гг. этот вид был обычен по всем островам и отмелям Оки и Волги, хотя сведения о гнездовании скудные. В 1980-е годы ("по известно одно многолетнее жилое гнездо орлана-белохвоста в Ивановском заказнике, но в 1985 г. дерево с гнездом упало; с тех пор достоверных сведений о гнездовании нет. В августе 1988 г. отмечена одиночная птица у с. Каменка Воротыньского района. На основании результатов опросов населения, можно предположить гнез-

дование этого вида на Горьковском водохранилище у границы с Ивановской областью, на р. Перенге в Воскресенском районе, в районе пос. Васильсурск и у с. Каменка Воротынского района. По сообщениям местных жителей, за последнее десятилетие погибло по крайней мере четыре гнезда белохвоста, из них три - в результате рубок при расчистке ложа Чебоксарского водохранилища. На осенних кочевках орланы встречаются по р. Ветлуге.

Скопа в 1950-60-х годах была обычна по рекам Волга, Ока, Ветлуга, Керженец, Мокша, Сура, Алатырь и по крупным озерам Лысковского и Арзамасского районов (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967), в настоящее время очень редка (Зимин, 1974). Нам известны три жилых гнезда скопы: на болоте Дерябинском и оз. Озерошном в Лысковском районе и в пойме р. Волги ниже с. Михайловское •Воротынского района. В 1986 г. в течение всего лета пара скоп держалась на р. Юронге в Воскресенском районе. Основываясь на результатах опросов населения, можно предположить гнездование скоп в следующих местах: 4 пары по р. Ветлуге на всем ее протяжении в пределах области и по I паре в Ивановском заказнике и на прудах Илевского рыбхоза в Вознесенском районе. Кроме того, скоп отмечали в гнездовой период на Горьковском водохранилище, на р. Оке у с. Желнино Володарского района и на р. Теше в Ардамовском районе. На пролете скопа регулярно встречается по рекам Волга, Ока, Ветлуга, Сура, реже по рекам Вал, Уста, Керженец, Теша, Урга, Пьяна.

Змееяд. В литературе эту птицу относят к редким или даже нерегулярно гнездящимся видам. Змееяда очень редко отмечали в Заволжье (Семеновском, Лысковском, Ветлужском районах), несколько чаще в Предволжье, например, неоднократно в Пустынском заказнике (Станков, 1951; Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967; Зимин, 1974). Мы наблюдали пару змееядов на пролете в сентябре 1986 г. около г. Уреня. Одиночные птицы были встречены в июле 1988 г. в Пустынском заказнике (Вовнянко, устн. сообщ.) и летом 1985 г. в верховьях р. Керженец в Семеновском районе (Козлов, устн. сообщ.).

Сапсан. В литературе указаны два случая его гнездования: в 1929 г. в с. Воздвиженское Воскресенского района и в начале 50-х годов в Пустынском заказнике (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967). В настоящее время, на основании неоднократных встреч птиц

в гнездовой период в разные годы, мы предполагаем гнездование сапсана в Килемарском и Пустынском заказниках и на болоте Бакалдинском Лысковского района. Имеются свидетельства очевидцев, наблюдавших охоту сапсана в гнездовой период у с. Макарьево Ветлужского района, на р. Альце в Тоншаевском районе, в верховьях р. Керженец в Семеновском районе, около г. Уреня, у д. Кириллове Красно-баковского района и у с. Докукино Воскресенского района.

Балобан не зарегистрирован на гнездовании в Горьковской области, однако гнездился вблизи ее южных границ. Ряд авторов, основываясь на данных о встречах балобана на юге области (например, в августе-сентябре 1948-1949 гг. близ пос. Пильна на р. Сура), высказывают предположения о возможности его гнездования (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967). В течение более чем 30 лет никаких сведений о встречах балобана не было. Только в июне 1987 г. охотовед С.В. Котенков наблюдал охоту этого сокола около с. Яново Сергачского района. Этот факт также свидетельствует о возможности гнездования балобана на юге Горьковской области.

Кроме перечисленных видов, в Горьковской области ранее гнездились дрофа и стрепет. Однако, последние встречи этих птиц относятся к началу XX века (Пузанов и др., 1955).

В последние годы зарегистрированы нерегулярные залеты на территорию Горьковской области еще четырех видов птиц Красной книги СССР.

Розовый пеликан, подранок, пойман рыбаками в 1982 г. в Лукояновском районе. По свидетельствам многих очевидцев, пара пеликанов держалась летом 1984 г. на оз. Юронгском в Воскресенском районе. В 1985 г. местные жители видели одну птицу в Пильнинском районе.

Краснозобая казарка добыта в 1908 г. у с. Каменка Воротынского района (Пузанов и др., 1955). По сообщению охотоведа А.Я.Адырова, еще одна птица убита браконьером в 1981 г. в Починковском районе.

Белошекуя казарка наблюдали осенью 1983 г. в верховьях р. Керженец в Семеновском районе (Хейфиц, устн. сообщ.).

Стерх. А.М. Федулов наблюдал одиночную птицу, кормившуюся

на болоте на северо-западе Ветлужского района, в июле 1983 г.
(Встреча вида требует специальных документальных подтверждений:
фотографии, слайды или детальное описание - прим.ред.).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Воронцов Е.М. Птицы Горьковской области. Горький, 1967. 167 с.
2. Зимин Н.И. Птицы. - В кн.: Природа Горьковской области.
Горький, 1974. с. 320-365.
3. Пузанов И.П., Козлов В.И., Кипарисов Г.П. Животный мир Горь-
ковской области. Горький, 1955, 188 с.
4. Станков С.С. Очерки физической географии Горьковской области.
Горький, 1951. 295 с.