

Матеріалы къ изученію орнитофауны Нижегородской губерніи.

П. В. Серебровскаго.

Мои наблюденія надъ авифауной Нижегородской губерніи начались съ 1908—909 гг., но болѣе систематично велись только въ 1910 и 1911 годахъ. До 1910 г. я коллектировалъ преимущественно въ Нижегородскомъ уѣздѣ, а въ 1910 г. совершилъ нѣсколько экскурсій, продолжавшихся въ общемъ слишкомъ 2 мѣсяца, въ Семеновскій и Макарьевскій уѣзды. Здѣсь я коллектировалъ по Керженцу, начиная почти отъ устья и вверхъ до с. Хахалъ, затѣмъ посѣтилъ группу большихъ озеръ, лежащихъ приблизительно между Керженцемъ и Ветлугой, гдѣ велъ наблюденія въ окрестностяхъ дер. Красный Яръ (Анненка тожь), 22 верстами ниже большого села Воскресенскаго. Въ 1911 году въ теченіе первой половины апрѣля я коллектировалъ въ окрестностяхъ Н.-Новгорода, во вторую же половину этого мѣсяца мною была предпринята поѣздка на лодкѣ внизъ по Волгѣ отъ Н.-Новгорода до с. Бармина (около 120 верстъ). Это путешествіе заняло двѣ недѣли. Во второй половинѣ мая коллектировалъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ по р. Алатырю близъ границы Симбирской и Пензенской губ. Въ началѣ іюня и въ первой половинѣ іюля я обслѣдовалъ группу озеръ по р. Сурежѣ въ Арзамасскомъ уѣздѣ. Съ 20 іюля и по 5 августа я снова коллектировалъ въ Алатырѣ, на этотъ разъ у самой границы Симбирской губ. Двѣ послѣднихъ трети августа прошли въ экскурсіяхъ на лодкѣ по Волгѣ, преимущественно въ районѣ Жуковскій затонъ — Собчино. Кромѣ этихъ главныхъ экскурсій я, пользуясь каждымъ свободнымъ днемъ, совершалъ менѣе значительныя экскурсіи преимущественно по окрестностямъ Н.-Новгорода и по Волгѣ. Зимой наблюденія велись только въ каникуляр-

ное время и не далѣе окрестностей Н.-Новгорода. Результатомъ экскурсій явилась коллекція птицъ въ 600 экземпляровъ. Въ Н.-Новгородѣ я при всякомъ удобномъ случаѣ осматривалъ довольно богатый рынокъ, забирая все наиболѣе цѣнное въ научномъ смыслѣ. Часто сносился съ мѣстными охотниками и натуралистами. Изъ послѣднихъ необходимо назвать П. А. Покровскаго. Онъ занимается изученіемъ флоры и фауны Нижегородской губ. довольно долго и собралъ для Нижегородскаго Земскаго Естественно-Историческаго Музея довольно большую и интересную коллекцію птицъ. Эту коллекцію я видѣлъ и въ систематической части буду на нее неоднократно ссылаться. Кромѣ моей коллекціи и музейской, я пересмотрѣлъ нѣсколько другихъ, менѣе значительныхъ. Изъ нихъ упомяну о коллекціи безвременно погибшаго учителя народной школы Суркова, въ которой я видѣлъ добытыхъ въ Семеновскомъ уѣздѣ такихъ рѣдкихъ здѣсь птицъ, какъ *Sygnium lapponicum*, *Nyctala tengmalmi*, *Coccyzus gambelii* и нѣкоторыхъ другихъ. Такимъ образомъ въ моемъ распоряженіи оказался довольно значительный матеріалъ, который я и попытался обработать. Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить благодарность: Императорскому Московскому Обществу Испытателей Природы и профессору Михаилу Александровичу Мензбину за моральную и матеріальную поддержку, а также профессору Петру Петровичу Сушкину за указанія при составленіи этой работы, Николаю Александровичу Покровскому за предоставленіе мнѣ добытыхъ имъ свѣдѣній и веѣмъ другимъ, кто такъ или иначе способствовалъ моимъ работамъ.

П. Серебровскій.

Списокъ цитированной литературы.

1. М. Бойдановъ. Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины средней и нижней Волги (біо-географическіе матеріалы). Труды Общества Естественныхъ Испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Т. I. Казань. 1871.
2. М. А. Мензбиръ. Орнитологическая географія Европейской Россіи. Ч. I. Москва. 1882.
3. Dr. M. A. Menzibier. Die Zugstrassen der Vögel im Europäischen Russland. (Mit 2 Karten). Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. T. LXII. 1886. № 2.

4. М. Рухскій. Матеріалы къ изученію птицъ Казанской губерніи. Труды Общества Естественныхъ Испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Т. XXV, вып. 6. Казань. 1893.
 5. М. А. Мензбиръ. Птицы Россіи. Т. I и II. Москва. 1895.
 6. П. П. Сушкинъ. Птицы Уфимской губерніи. Москва. 1897.
 7. М. М. Хомяковъ. Птицы Рязанской губ. Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отдѣлъ зоологической. Выпускъ V. Москва. 1901.
 8. С. Алфераки. Гуси Россіи. 1904.
 9. В. М. Артоболевскій. Обзоръ птицъ юго-восточной части Пензенской губерніи. Предварительное сообщеніе. Кіевъ. 1904.
 10. Б. М. Житковъ и С. А. Бутурлинъ. Матеріалы для орнитофауны Симбирской губерніи. Петроградъ. 1906.
 11. Dr. Ernst Hartert. Die Vögel der paläarktischen Fauna. H. I—VII. Berlin. 1903—1912.
 12. Г. И. Поляковъ. Къ орнитологической фаунѣ Московской губерніи. Птицы отрядовъ *Pygopodes*, *Longipennes*, *Lamellirostres* и *Steganopodes*. Москва. 1910.
 13. С. А. Рыцковъ. Матеріалы къ изученію орнитологической фауны Тамбовской губерніи. Москва. 1910.
 14. Б. Д. Курличниковъ. Матеріалы къ познанію птицъ Костромской губ. Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отд. зоологической. Выпускъ XIV. Москва. 1910.
- Въ текстѣ систематической части работы вмѣсто названій только что перечисленныхъ трудовъ будутъ обозначаться только номера, подъ которыми они введены въ настоящій списокъ.

Физико-зоографическій очеркъ Нижегородской губерніи.

Нижегородская губернія лежитъ между 54°21' и 57°15' с. ш. и между 11°39' и 16°6' в. д. Это пространство по характеру флоры и фауны довольно рѣзко раздѣляется на 2 части: сѣверную меньшую и южную большую. Граница между этими частями идетъ по нижнему теченію рѣки Оки до впаденія ея въ Волгу и отсюда на востокъ по теченію Волги до восточной границы губерніи. Южная половина нѣсколько болѣе приподнята надъ уровнемъ моря, нежели сѣверная. За исключеніемъ большого лѣсного района въ юго-западномъ углу ея, она представляетъ однообразную распаханную равнину, прорѣзанную оврагами и рѣчками. Лѣсъ представленъ отдѣльными островами, вообще небольшими. Исключеніе составляетъ только лента лѣса по лѣвому берегу р. Алатыря, о которой будетъ упомянуто ниже. Фауна описываемой части губерніи характеризуется присутствіемъ представителей открытыхъ мѣстъ, каковы: *Alauda arvensis*, *Saxicola oenanthe*, *Circus cyaneus*, *Circus macrurus*, *Coracias garrula*... Въ этой мѣстности гнѣздятся *Aquila heliaca* и *Athene noctua*; сюда же залетаютъ дрофы и стрепета. Полоса лѣса, идущая съ запада на востокъ по лѣвому берегу Алатыря, дѣлитъ указанный открытый районъ на двѣ неравныя части: большую сѣверную и меньшую южную. На характеръ авифауны той и другой части эта полоса лѣсовъ замѣтнаго вліянія не оказываетъ. Прежде всего уже потому, что она не широка: въ Нижегородской губерніи не болѣе 20 верстъ въ самомъ широкомъ мѣстѣ. Составъ лѣса по Алатырю довольно разнообразенъ: на ряду съ высокими сосновыми борами здѣсь встрѣчаются участки лиственнаго, преимущественно дубоватаго, лѣса, мѣстами же обыкновеннѣе смѣшанный лѣсъ изъ березы, ели, осины, сосны и самыхъ разнообразныхъ кустарниковъ. Фауна этой полосы лѣса смѣ-

шанная. Здѣсь сохранились еще въ значительномъ количествѣ представители таежной фауны, каковыми являются, напр., *Tetrao urogallus*, *Tetrastes bonasia*, *Picus martius*. Однако, положеніе этого лѣса среди степныхъ пространствъ естественно влечетъ за собой присутствіе формъ степныхъ колковокъ, какими являются *Aquila heliaca*, *Genaja saker*, *Coracias garrula* и нѣкотор. др. Вышеописанный степной районъ безъ естественныхъ границъ переходитъ въ Симбирскую и Пензенскую губерніи. Весь юго-западный уголъ южной половины Нижегородской губерніи въ значительной своей части занятъ лѣсомъ. Именно: почти весь Ардатовскій уѣздъ, за исключеніемъ центрального пятна, представляющаго типичное для вышеописаннаго степного района поле, занятъ лѣсомъ; далѣе къ сѣверу лѣсомъ покрыты бассейны рѣкъ Течи и Сережи въ Арзамасскомъ и Горбатовскомъ уѣздахъ. Лѣса юго-западнаго угла безъ границъ переходятъ на югъ въ лѣсистый Темниковскій уѣздъ Тамбовской губерніи, на западѣ же соединяются съ лѣсами, лежащими во Владимирской губ. по правому берегу Оки. Такимъ образомъ въ цѣломъ получается довольно большая площадь, занятая лѣсомъ, преимущественно хвойнымъ. На такой обширной площади, конечно, встрѣтятся самыя разнообразныя комбинаціи лѣсныхъ породъ, но высокіе сосновые боры и смѣсь березы, ели и осины господствуютъ надъ всеми иными. Въ общемъ лѣса описываемаго района глухи, мѣстами трудно проходимы, вслѣдствіе болотистой почвы, и имѣютъ зачастую всѣ признаки тайги, но въ послѣднее время, по крайней мѣрѣ, въ Арзамасскомъ уѣздѣ, лѣса разрабатываются довольно интенсивно и характеръ мѣстности мѣняется. Среди лѣсовъ расположены болѣе или менѣе значительныя водоемы: озера, рѣки и болота. Всѣ они весьма разнятся отъ водоемовъ сѣверныхъ уѣздовъ главнымъ образомъ болѣе обильной и разнообразной растительностью по берегамъ: здѣсь не видно однообразнаго мохового ковра, которымъ преимущественно покрыты берега озеръ и болота типично таежныхъ мѣстъ сѣверныхъ уѣздовъ, его замѣняютъ богатыя заросли тростника, осоки, камыша и тальниковъ, что обуславливаетъ необыкновенное богатство и разнообразіе птичьяго населенія. Фауна этого интереснаго лѣсного района почти не изучена. Болѣе правильныя наблюденія велись С. А. Рѣзцовымъ въ 1898 г. въ Темниковскомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи, Л. В. Кондыревымъ тамъ же въ послѣдніе годы и мной въ Арзамасскомъ уѣздѣ въ 1911 году. Результаты, добытые нами, не велики, но все же позво-

люют сдѣлать нѣкоторыя общія замѣчанія: фауна этого лѣсного участка весьма близка къ таежной, на что указываетъ гнѣздованіе здѣсь *Tetrao urogallus*, *Tetrastes bonasia*, *Picus martius*, *Colymbus arcticus*, *Nyctala tengmalmi* (если только гнѣздованіе этого послѣдняго не является случайностью).

Недостатокъ наблюдений не позволяетъ пока говорить о другихъ типичныхъ представителяхъ тайги, каковы: *Nucifraga caryocatactes*, *Lagopus lagopus*, *Perisoreus infaustus*, *Fringilla montifringilla*, *Surnia ulula*, но не будетъ неожиданностью, если нѣкоторые изъ нихъ найдутся въ небольшомъ числѣ. Въ свою очередь здѣсь есть птицы, характерныя для полосы степей и островныхъ лѣсовъ: *Emberiza hortulana*, *Coracias garrula*, *Hydrochelidon leucoptera*, *Erythropus vesperinus*, *Ardeetta minuta*. Рѣки южной половины Нижегородской губ. не велики и, за исключеніемъ Суры, всѣ перепружены мельничными плотинами. На западѣ слѣдуетъ отмѣтить Тешу и Серезу. Эти рѣки начинаются въ Арзамаскомъ уѣздѣ, та и другая не очень далеко отъ Арзамаса; отсюда направляются на западъ, у самой границы Нижегородской губ. сливаются и впадаютъ въ Оку въ предѣлахъ Владимирской губерніи. Ихъ поймы богаты болотистыми низинами съ травянистымъ кочкарникомъ и таловыми кустами. По берегамъ, а на Серезѣ и по теченію рѣки, много озеръ съ заросшими камышомъ и травой берегами. Все это въ связи съ обширностью лѣсовъ по берегамъ этихъ рѣкъ обуславливаетъ присутствіе здѣсь богатой авифауны. Здѣсь живутъ въ большомъ количествѣ утки, гнѣздуютъ курочки и масса пѣвчихъ птицъ. На этихъ озерахъ, обильныхъ многочисленными, поросшими разнообразной водной растительностью заводями, можно видѣть: цапель, журавлей, различныхъ курочекъ, черныхъ и свѣтлокрылыхъ крачекъ, оба вида выпи, а изъ хищниковъ *Pandion haliaëtus*, *Aquila clanga* и *Aquila chrysaëtus*. Особенно интересны эти озера во время пролета. Здѣсь весной и осенью присаживаются гуси, лебеди и гагары. Въ юго-западномъ углу, близъ границъ Владимирской губ. расположены огромные пруды Выксунскаго и Велѣтминскаго заводовъ. Ихъ богатая орнитофауна извѣстна мнѣ мало и, къ сожалѣнію, лишь со словъ жившихъ тамъ охотниковъ, а поэтому я ограничусь только слѣдующимъ замѣчаніемъ: несомнѣнно, тамъ бываютъ на пролетѣ гуси, лебеди, поганки и гагары. Послѣдніе два рода весьма возможно имѣютъ здѣсь *гнездящихся* представителей. Въ юго-восточной части губерніи протекаетъ довольно

значительная рѣка Алатырь. Она пересѣкаетъ весь Лукояновскій уѣздъ въ направленіи съ запада на востокъ. Впадаетъ въ Суру въ Симбирской губерніи. Нойма Алатыря и впадающей въ него маленькой рѣчки Калши богата озерами, зарослими тальниковъ, травянистыми низинами и ольховыми уремами. Составъ гнѣздящихся и пролетныхъ птицъ очень интересенъ. Здѣсь мнѣ пришлось наблюдать *Aquila clanga*, *Aquila heliaca*, *Pandion haliaëtus*, *Hydrochelidon nigra*, *Totanus glottis*, *Totanus stagnatilis*, *Gallinula chloropus*, *Ciconia nigra*, *Botaurus stellaris*, *Ardeetta minuta*, *Budytes citreola werae*, *Sylvia nisoria*, и т. д. Б. М. Житковъ и С. А. Бутурлинъ наблюдали въ поймѣ этой рѣки (въ Симбирской губ.) *Totanus terekus*, *Totanus pugnax*, *Hydrochelidon leucoptera*, *Anas strepera*. Алатырь весной очень широко разливается и поэтому здѣсь пролетной птицы задерживается много. Останавливаются гагары, поганки, лебеди, гуси, крохали и огромныя стада утокъ и нырковъ. Изъ другихъ рѣкъ южной половины Нижегородской губерніи заслуживаютъ упоминанія слѣдующія: Сура, Пьяна, Кудьма и Имза. Первая по Нижегородской губерніи проходитъ очень немного—около 25 верстъ, вся же остальная часть рѣки принадлежитъ Казанской и Симбирской губ. Богатая фауна этой рѣки изучена и описана Рузскимъ, Житковымъ и Бутурлинымъ. Притокъ Суры Пьяна изливается по центральнымъ и восточнымъ уѣздамъ. По берегамъ этой рѣки очень большихъ лѣсовъ не имѣется. Нойма богата птицей, въ особенности утками и куликами. Житковъ и Бутурлинъ считаютъ долину этой рѣки въ общемъ сходной съ долиной Алатыря. Кудьма и Имза, правые притоки Волги, какъ по вѣшнему виду, такъ и по фаунѣ вообще мало отличаются отъ Тешы и Серезы. Кудьма интересна тѣмъ, что, начинаясь недалеко отъ праваго берега Оки, она служитъ какъ бы передаточной вѣтвью для птицъ, направляющихся весной по Окѣ на Волгу. Пролетныя птицы охотно пользуются долиной этой рѣки, потому что: 1) сокращаютъ немного расстояние, 2) обходятъ Н.-Повгородъ и Сормово-Канавинскую территорію.

Общая картина южной половины Нижегородской губ. представляется такимъ образомъ въ слѣдующемъ видѣ: здѣсь мы имѣемъ различной величины лѣсные участки, фауна которыхъ большею частью смѣшанная, состоящая изъ сохранившихся таежныхъ формъ, представленныхъ въ неодинаковомъ для отдѣльныхъ районовъ количествѣ видовъ, и изъ формъ, присутствіе которыхъ обуславливается соседствомъ степныхъ пространствъ. Эти послѣднія, какъ уже было упо-

мянуто, всюду распаханы и поэтому имѣютъ фауну хотя и близкую къ степной, но не типично-степную. Мы не находимъ, напр., здѣсь *Otis tarda* (на гнѣздовѣ), *Otis tetrax*, *Merops apiaster*, а нѣкоторые другіе степные виды представлены въ количественномъ отношеніи очень бѣдно, напр.: *Gennaja saker* и *Urupa erops*. Одной изъ причинъ неполноты степной фауны является вліяніе большихъ лѣсныхъ участковъ. Съ одной стороны, ихъ птичье населеніе замѣняетъ воцѣлѣ или отчасти близкіе виды, приуроченные къ степи, съ другой же — сама лѣсная площадь своей значительностью служитъ преградой степнымъ птицамъ при движеніи ихъ на сѣверъ изъ болѣе южныхъ губерній. Въ итогѣ получается картина характерная для такъ называемой полосы островныхъ лѣсовъ палеарктики.

Нижнее теченіе Оки и Волга заслуживаютъ особеннаго вниманія, прежде всего какъ пролетные пути. Взглянувъ на карту пролетныхъ путей Европейской Россіи (М. А. Menzbier. Die Zugstrassen der Vögel im Eurasiatischen Russland. Карта 1), мы видимъ, что по этимъ рѣкамъ направляются птицы, слѣдующія по *via caspia* къ Каспійскому и по вѣтвямъ *viae ponticae* къ Черному морямъ. Весной и осенью здѣсь пролетаютъ представители *Pygopodes*, *Limicolae*, *Longipennes*, *Alectorides*, *Lamellirosres*, *Herodiones*, *Raptores* и др. Такъ же разнообразенъ и богатъ составъ гнѣздящихся птицъ Волжской и Окейской долинъ, что зависитъ отъ ихъ обширности и разнообразія станцій. Большая часть праваго берега Оки и Волги (ниже Н.-Новгорода) возвышена, обрывиста и удобныхъ мѣстъ для гнѣздованія большинства птицъ не представляетъ. Здѣсь гнѣздуютъ только пѣвчія и рѣже хищныя, напр., *Milvus*. Отлогія мѣста праваго и весьма широкая полоса лѣваго береговъ составляютъ обширную пойму, въ которой можно отмѣтить по крайней мѣрѣ пять типовъ станцій.

1) Луга сухіе, съ открытыми озерами, поросшими у краевъ тростникомъ и рѣдкими таловыми кустиками. По этимъ лугамъ кое-гдѣ разбросаны кусты тальника, черемхи, черной смородины, шиповника, крушины и т. п. Излюбленное мѣстопребываніе *Emberiza aureola*, *Emberiza citrinella*, *Motacilla flava*, *Acrocephalus schoenobaenus*, *Acrocephalus palustris*, *Tinnunculus alaudarius*, *Circus cineraceus*, *Asio accipitrinus*, *Crex pratensis*, *Coturnix communis*, *Anas crecca*, *Anas crecca*, *Actitis hypoleucos* и др.

2) Травянистыя болота съ озерами, густо заросшими камышомъ, осокой, кувшинками и другими растеніями. Здѣсь держатся черныя

крачки, утки различныхъ породъ, *Botaurus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Scolopax major*, *Scolopax gallinago*, *Porzana maruetta*, *Acrocephalus phragmitis*, *Circus aeruginosus* и др.

3) Силошныя заросли кустовъ (уремы) тальника, ясеня, ольхи, часто оплетенныя хмелемъ и ежевикой. Между зарослями кое-гдѣ неширокія озера, рѣчки и протоки почти всегда съ илистымъ, вязкимъ дномъ. Здѣсь гнѣздятся различныя утки, нырки, курочки, малая выпь, *Alcedo ispida*; кусты даютъ пріютъ безчисленному множеству мелкихъ птицъ: *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus dumetorum*, *Phylloscopus trochilus*, *Locustella fluviatilis*, *Locustella locustella*, *Luscinia philomela*, *Cyanecula svecica*, *Accentor modularis*, *Pica leucoptera*, *Cyanistes cyanus*, *Cyanistes coeruleus*, *Sylvia curruca* et. cet.

4) Весьма часто по берегамъ, а въ особенности по островамъ можно видѣть высокій, старый лѣсъ изъ дубовъ и осокорей (*Populus nigra*). Такимъ лѣсомъ заняты, напр., Подновскіе острова ниже Н.-Новгорода, полуострова противъ Безводнаго и Кадницъ и т. д. по всему теченію Волги. Орнитофауна такихъ острововъ очень богата. Въ многочисленныхъ дуплахъ старыхъ деревьевъ живутъ *Striges*, *Sturnus intermedius*, *Monedula collaris*, *Jynx torquilla*, *Dendrocopus major*, *Parus major*, *Cyanistes cyanus*... На деревьяхъ выютъ гнѣзда многочисленныя *Corvus cornix*, *Columba oenas*, *Ardea cinerea*, *Milvus ater*, *Tinnunculus alaudarius*, *Pandion haliaëtus*, *Aquila clanga*...

5) Песчаные и иловатые берега, заводи и отмели (по-здѣшнему „косы“), поросшіе мѣстами низкими рѣдкими тальниковыми кустами и не высокой рѣдкой травой. Здѣсь держатся представители р. р. *Larus*, *Sterna*, *Totanus*, *Phalaropus*, *Tringa*, *Charadrius*, *Haematopus*, *Motacilla alba*, *Ardea cinerea*, *Scolopax gallinago*.

Изъ сочетанія этихъ пяти типовъ станцій состоятъ долины Волги и по крайней мѣрѣ нижняго теченія Оки. Ихъ внѣшній видъ и характеръ фауны настолько оригинальны, что удобнѣе разсматривать ихъ отдѣльно отъ другихъ физико-географическихъ и фаунистическихъ подраздѣленій Нижегородской губерніи.

Сѣверная половина Нижегородской губерніи по характеру мѣстности весьма однообразна. Она представляетъ низкую, болотистую равнину, поросшую лѣсами. Кое-гдѣ пятнами среди этого лѣсного царства расположены небольшіе участки неплодородной пахотной земли.

Лѣса въ большинствѣ случаевъ хвойные; часто расположены на моховыхъ болотахъ, или между ними. Они глухи, трудно проходимы

и имѣютъ все свойства таежныхъ лѣсовъ. Составъ бѣдной и однообразной фауны сплошныхъ сосновыхъ, или сосново-еловыхъ боровъ вообще таежный. Здѣсь живутъ: *Tetrao urogallus*, *Tetrao tetrix*, *Lagopus lagopus*, *Tetrastes bonasia*, *Garrulus infaustus*, *Nucifraga caryocatactes* sp., *Fringilla montifringilla*, *Picus martius*, *Picoides tridactylus*, *Aquila chrysaetos*, *Lithofalco aescalon*, *Surnia ulula*, *Syrnium uralense* и др. виды, свойственные тайгѣ. Изъ млекопитающихъ здѣсь сохранились: медвѣди, рысь, выдра, выхухоль, лоси и сѣверный олень (*Rangifer tarandus*). Наибольшее оживленіе наблюдается на обширныхъ моховыхъ болотахъ. Эти болота весьма своеобразны. Они обыкновенно представляютъ большія открытыя пространства, поросшія мхами, верескомъ, клюквой, брусникой и другими невысокими травами. Иногда по болоту растетъ рѣдкая, низкая, чахлая сосна. Коегдѣ видна вода и почти повсюду она выдавливается ногой изъ-подъ толстаго мягкаго моховаго ковра. Очень рѣдко встрѣчаются заболоченныя озера, по-здѣшнему „зыбуны“, гдѣ весь растительный коверъ съ кустиками колыхается подъ тяжестью идушаго и кажется вотъ-вотъ прорвется. Среди моховыхъ болотъ обыкновенно можно видѣть озера, въ большинствѣ случаевъ лишены растительности, а потому съ бѣдной и однообразной гнѣздящейся фауной. Какъ примѣръ такого болота можно указать на обширное въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ верстъ—Камское болото съ озеромъ того же имени. Это дикое малодоступное мѣсто, гдѣ до сихъ поръ еще сохранились олени. На такихъ болотахъ держатся слѣдующія птицы: *Lagopus lagopus*, *Numenius arquatus*, *Grus cinerea*, *Ciconia nigra*, *Totanus glottis*, *Corvus cornix*, *Budytes flava*, *Budytes citreola*. На озерахъ гнѣздятся: *Anas boschas*, *Anas crecca*, *Anas acuta*, *Fuligula cristata*, *Fuligula clangula*, *Colymbus arcticus*, *Cygnus musicus*, *Podiceps* (sp.?). Поблизости въ лѣсу гнѣздятся: *Pandion haliaetos*, *Aquila chrysaetos*, *Tetrao urogallus*. Вмѣстѣ съ разработкой лѣсовъ и увеличеніемъ населенія видъ нѣкоторыхъ частей сѣверной половины нѣсколько измѣнился. Однако пространство съ большимъ количествомъ пахотной земли немного. Таковы, напр., лѣвый берегъ Волги въ Балахнинскомъ и Семновскомъ уѣздахъ, окрестности Семенова и Воскресенскаго на Ветлугѣ.

Главные рѣки сѣверной части Нижегородской губерніи—Керженецъ и Ветлуга. Первая изъ нихъ, довольно значительная рѣка съ озерами и старицами по берегамъ вноситъ сравнительно мало жи-

вленія въ окружающую мѣстность. Это стоитъ въ зависимости отъ лѣсистаго характера береговъ и полнаго отсутствія луговъ и большихъ травянистыхъ или тальниковыхъ зарослей. Озера, расположенныя по берегамъ, не велики, заросшихъ травой между ними мало, обыкновенно же озеро имѣетъ видъ большой лѣсной лужи. Фауна долины Керженца однообразна по составу, но гнѣздящіяся здѣсь виды обыкновенно представлены большимъ количествомъ особей. Особенно много здѣсь утокъ и нырковъ. Куликовъ мало, да и тѣ оказываются самыми обыкновенными, широко распространенными. Въ видѣ рѣдкости здѣсь гнѣздится *Totanus terekus*. Зато скрытные голубые зимородки положительно любятъ эту угрюмую, безлюдную рѣку.

Ветлуга величиной, характеромъ береговъ и фауной значительно отличается отъ Керженца. Лѣса по этой рѣкѣ коегдѣ вырублены, поэтому не рѣдки открытые луговые берега. Въ поймѣ Ветлуги уже можно видѣть значительныя тальниковыя заросли съ травянистыми озерами. Въ серединѣ лѣта рѣка мелѣетъ, образуя илистые и песчаныя закраины, гдѣ держатся кулики и чайки. Озера и старицы, въ отличіе отъ того, что мы имѣемъ на Керженцѣ, обильно зарастаютъ всякой болотной и прибрежной растительностью. Вообще фауна Ветлуги приближается къ фаунѣ Волжской долины. По обилію и разнообразію птицъ—это одна изъ богатѣйшихъ рѣкъ Заволжья. Лѣтомъ здѣсь можно наблюдать: чаекъ, крачекъ, куликовъ, среди которыхъ слѣдуетъ отмѣтить *Naematopus ostralegus* и *Totanus terekus*, затѣмъ различныхъ утокъ, нырковъ, лебедей, цапель, скопъ, беркутовъ, подорликовъ и др.

Остальныя рѣки сѣверной половины Нижегородской губ. мелка и особаго вниманія не заслуживаютъ. Сѣверная часть, не мѣняя своего вида, переходитъ на западъ во Владимирскую губ., на сѣверъ въ Костромскую и Вятскую, а на востокъ въ Казанскую.

Такимъ образомъ, я принимаю три подраздѣленія Нижегородской губ., характеризуемая какъ внѣшнимъ видомъ, такъ и фауной: таежную часть, полосу островныхъ лѣсовъ, и долины Волги и Оки.

ЧАСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ.

Pygopodes.

1. *Colymbus cristatus* (L.).

- Podiceps cristatus*, L. Меназбирь. (5), стр. 5.
 " " " Рузскій. (4), стр. 37.
 " " " Житковъ и Бутурлинъ. (10), стр. 29.
 " " " Поляковъ. (12), стр. 26.

Мѣстное названіе: *чапарка*.

Гнѣздованіе *Colymbus cristatus* въ Нижегородской губерніи представляется весьма вѣроятнымъ. По даннымъ Рузскаго, Житкова и Бутурлина, Артоболевскаго и Полякова эта птица гнѣздится въ Казанской, Симбирской, Пензенской и Московской губерніяхъ, т.-е. въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ Нижегородской губ. съ востока, юга и запада. Я не наблюдалъ этой птицы въ сѣверной части губерніи, но думаю, что именно она гнѣздилась лѣтъ шесть назадъ на Сибтломъ озерѣ въ Макарьевскомъ уѣздѣ. Въ южной половинѣ Нижегородской губерніи она не гнѣздится ни на озерахъ по Серезѣ, ни по Алатырю, но ее можно ожидать на Вельтминскомъ и Выксуинскихъ прудахъ Ардатовскаго уѣзда. На весеннемъ и осеннемъ пролетахъ *Podiceps cristatus* обыкновенна не только по Окѣ и Волгѣ, но и по нѣкоторымъ второстепеннымъ водоемамъ губерніи.

Экземпляръ коллекціи:

10.V.911, ♀ Волга подъ с. Б.-Ельня, Нижегородскаго уѣзда.

2. *Proctopus nigricollis* (C. L. Brehm).

- Podiceps nigricollis*, C. L. Brehm. Меназбирь. (5), стр. 21.
 " " " Рузскій. (4), стр. 38.
 " " " Житковъ и Бутурлинъ. (10), стр. 30.
 " " " Поляковъ. (12), стр. 30.

Эта поганка встрѣчается въ нашей губерніи на пролетѣ и, повидимому, въ большемъ количествѣ, чѣмъ предыдущій видъ. Весною на нижегородскій рынокъ приносятъ черношейныхъ поганокъ очень часто и обыкновенно съ лѣваго берега Волги, что позволяетъ, какъ мнѣ кажется, предполагать, что этотъ видъ здѣсь гнѣздится, хотя бы въ очень незначительномъ числѣ. Въ долинѣ Суры по Житкову и Бутурлину эта птица гнѣздится и даже чаще, чѣмъ другія поганки.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 13.IV.910, ♂ С. Горюхино, Балахнинскаго уѣзда.
 2) 20.IV.910, ♀ С. Красная-Рамень, Семеновскаго уѣзда.
 3) 7.V.911, ♀ С. Толоконцево, Семеновскаго уѣзда.

Экземпляръ осенняго пролета у меня нѣтъ, но въ Нижегородскомъ Земскомъ Музеѣ имѣется ♀ juv., добытая 5.VIII.912 Б. И. Кунцевичемъ между Растяпнымъ и Чернымъ въ Балахнинскомъ у.

Dytes auritus (Linn.).

- Podiceps auritus*, L. М. А. Меназбирь. (5), стр. 17.
 " " " Рузскій. (4), стр. 38.
 " " " Житковъ и Бутурлинъ. (10), стр. 31.
 " " " Поляковъ. (12), стр. 33.

По даннымъ, имѣющимся въ орнитологической литературѣ, этотъ видъ рѣдко, но гнѣздится въ мѣстностяхъ непосредственно прилегающихъ къ Нижегородской губ., однако въ этой послѣдней онъ до сихъ поръ не найденъ даже и на пролетѣ. Въ Естественно-Историческомъ Музеѣ Нижегородскаго земства имѣется экземпляръ молодой птицы этого вида и очень вѣроятно, что Нижегородской губерніи, но онъ, какъ и многіе другіе, собранные для музея Э. Пельцамомъ, лишены даты.

3. *Urinator arcticus* (L.).

- Colymbus arcticus*, L. Меназбирь. (5), стр. 36.
 " " " Рузскій. (4), стр. 39.
 " " " Поляковъ. (12), стр. 41.
 " " " Житковъ и Бутурлинъ. (10), стр. 28.

Чернозобая гагара обыкновенная гнѣздящаяся птица Макарьевскаго и частью Семеновскаго уѣздовъ. Въ «Песовой и Ружейной Охотѣ» въ 1897 г., г. Бронскимъ сообщалось о томъ, что *Colymbus arcticus* ежегодно гнѣздится на лѣсныхъ озерахъ по р. Серезѣ на

границь Нижегородскаго, Горбатовскаго и Арзамасскаго уѣздовъ. Я лично не видѣлъ этого сообщенія и могу только догадываться, что рѣчь идетъ о гнѣздованіи *U. arcticus* на озерахъ, лежащихъ по Сержѣ между с. Старая Пустынь и дер. Новая Пустынь. Въ 1911 г. на этихъ озерахъ я не нашелъ гнѣздящихся гагаръ, но несомнѣнно, гдѣ-либо по близости онѣ гнѣздились и въ этомъ году, потому что 10.VII на Глубокомъ озерѣ я наблюдалъ прилетавшихъ на короткое время пару этихъ гагаръ. Нѣсколько разъ мнѣ удавалось подплыть къ нимъ почти на выстрѣль. Это были молодыя птицы. Мѣстнымъ охотникамъ гагара известна подъ названіемъ «водяной воронъ» (вѣроятно за ея клювъ и крикъ).

Повидимому, южная граница гнѣздовой области *U. arcticus* проходитъ черезъ южную половину Нижегородской губ. На пролетѣ, по рассказамъ, гагара бываетъ по всѣмъ важнѣйшимъ рѣкамъ и озерамъ Нижегородской губ. Самому же мнѣ удалось съ достовѣрностью видѣть только однажды одиночную пролетную гагару этого вида на Волгѣ у Бармина 6 мая.

Образъ жизни чернозобой гагары я наблюдалъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ. Здѣсь гагары держатся на озерахъ, въ большинствѣ случаевъ совершенно лишенныхъ зарослей травы и кустовъ. Таковы, напр., Большое и Малое Плотовыя, Нестіарь, Черное, Свѣтлое, Кривое, Камское, Язы, Пустое и многія др. Для гнѣздовья гагара выбираетъ обыкновенно небольшое озеро, расположенное всегда въ глухомъ, малодоступномъ мѣстѣ, среди обильнаго болотами таежнаго лѣса. Гнѣздо устраивается или на кочкѣ, выступающей изъ воды, или на берегу, всегда у самаго края и иногда такъ близко къ водѣ, что подстилка и яйца почти плаваютъ. Гнѣздо очень примитивно. Сухая (въ смыслѣ: мертвая) прошлогодняя трава приминается въ видѣ углубленія, которое обносится, да и то не всегда, небольшимъ валикомъ изъ того же матеріала. Яицъ бываетъ два или одно. Они опутываются слегка водорослями, что вмѣстѣ съ оливковымъ цвѣтомъ скорлупы дѣлаетъ ихъ даже на близкомъ разстояніи почти неотличимыми отъ общаго фона гнѣзда. Яйца кладутся во второй половинѣ апрѣля и во первыхъ числахъ мая. Въ насиживаніи принимаютъ участіе и самка, и самецъ. Гагара отводитъ отъ гнѣзда, симулируя раненую, точно такъ, какъ это дѣлаетъ, напр., криква. Пуховыхъ птенцовъ, немного болѣе чирка ростомъ, я находилъ въ первой половинѣ іюня. Птенцы этого возраста превосходно плаваютъ

и ныряютъ. Родители во время опасности иногда забываютъ свою обычную осторожность и, спрятавъ въ прибрежной травѣ или кочкахъ своихъ дѣтей, сами стараются привлечь на себя вниманіе подошедшаго. Гагары во время гнѣздового періода вовсе не привязаны къ своему озеру. Наоборотъ, въ поискахъ пищи онѣ улетаютъ иногда за 8—10 верстъ отъ гнѣзда. Вскрытіе желудковъ убитыхъ гагаръ показываетъ, что питаются онѣ пиявками и рыбой. Отыскивая кормъ, гагара ныряетъ на дно озера и держится тамъ отъ одной до двухъ минутъ. Наѣвшаяся гагара очень неохотно летитъ съ воды и если ее въ это время начать преслѣдовать на лодкѣ, она только ныряетъ сначала на большое разстояніе, потомъ утомляется и подпускаетъ на выстрѣль. Однажды я былъ свидѣтелемъ того, какъ гагара, спасаясь отъ преслѣдованія, перенянула разстояніе не менѣ трети версты. Допускаю, что въ это время она могла незамѣтно высовывать изъ воды голову для того, чтобы передохнуть и осмотрѣться. Подобный приемъ я наблюдалъ очень часто. Такъ уходилъ отъ лодки, напр., пуховой птенецъ гагары. Онъ показывалъ голову на поверхность воды на такое короткое время, что некогда было поднять ружья къ плечу. Въ Макарьевскомъ уѣздѣ гагаръ не преслѣдуютъ и онѣ такъ смѣлы тамъ, что летаютъ кормиться на озера, лежація среди селеній, каково, напр., Нестіарь, на берегахъ котораго расположено одно противъ другаго два селенія. Къ берегу подплываютъ такъ близко, что позволяютъ мальчишкамъ кидать въ себя камнями. Кричитъ гагара разнообразно. По зарямъ можно слышать протяжное «ку-а-а», похожее на плачь ребенка или на крикъ кота. Другой крикъ зычное «уы-ку-ку-вы-и», слышится на далекое разстояніе. Трудно подыскать удачное сравненіе, но ближе всего этотъ крикъ къ отчаянному визгу собаки. Наконецъ, когда гагары спокойно летаютъ около разоремаго гнѣзда или когда желаютъ позвать къ себѣ птенцовъ, онѣ издаютъ негромкіе звуки похожіе на «коор-коор» — почти какъ у ворона.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 14.IV.910 ♂ ad. С. Городецъ, Балахнинскаго уѣзда.
- 2) 28. V.910 ♂ ad. Оз. Нестіарь, Макарьевскаго уѣзда.
- 3) 1.VI.910 ♀ ad. Оз. Свѣтлое, Макарьевскаго уѣзда.
- 4) 6.VI.910 pull. Оз. Малое Плотовое, Макарьевскаго уѣзда.
- 5) 8.VI.910 ♀ ad. Оз. Пустое, Макарьевскаго уѣзда.
- 6) 1. V.911 ♂ ad. Оз. Ключкино, Макарьевскаго уѣзда.

4. *Urinator stellatus* (Pont.).

- Columbus septentrionalis*, L. Мензбирь (5), стр. 43.
 " " " Рузский (4), стр. 40.
 " " " Кирпичниковъ (14).
Columbus imber, Gann. Житковъ и Бутурлинъ (10), стр. 29.—

Краснозобая гагара въ Нижегородской губернии мною не найдена, да вѣроятно она здѣсь и не гнѣздится, потому что не найдена на гнѣздовѣхъ даже и сѣвернѣе — въ Костромской губернии (14). По мнѣнію Рузскаго (l. c.), эта гагара очень рѣдко гнѣздится въ Казанской губернии, но мнѣ кажется, что это еще не достаточно доказано. На средней Волгѣ бываетъ на пролетѣ, о чемъ единогласно свидѣлствуютъ все авторы, писавшіе о Поволжьи. Мнѣ извѣстно, что краснозобая гагара была убиваема весной и осенью на озерѣ Нестіарь въ Макарьевскомъ уѣздѣ.

5. *Uria brünnichi* (E. Sabine).

- Uria brünnichi*, E. Sabine. Мензбирь (5), стр. 63.
 " " " Поляковъ (12), стр. 51.

Г. П. Поляковъ (l. c.) пишетъ: «Ф. П. Лоренцъ говорилъ мнѣ, что ему было извѣстно о появленіи въ ту же осень (1902 г.) полярныхъ кайръ на востокъ отъ нашей мѣстности въ губерніяхъ: Владимирской, Нижегородской и Костромской, изъ которыхъ онѣ поступали въ большомъ количествѣ вмѣстѣ съ дичью на московскій рынокъ (Охотный рядъ)». Подтвержденіемъ словъ Ф. К. служитъ экземпляръ птицы этого вида изъ Костромской губернии, хранившійся въ коллекціи М. А. Мензбира. На основаніи всего этого вношу названную кайру въ списокъ птицъ Нижегородской губернии въ качествѣ случайно залетной.

Longipennes.

6. *Stercorarius pomarinus* (Temm.).

- Stercorarius pomarinus*, Temm. Мензбирь (5), стр. 94.
 " " " Поляковъ (12), стр. 53.
 " " " Кирпичниковъ (14), стр. 409.
Lestris pomarinus, Temm. Богдановъ (1), стр. 152.

Поморникъ этого вида былъ добытъ на Волгѣ подѣ Печерской слободой близъ Н.-Новгорода 1.VII.911. Благодаря Н. А. Покровскому

этотъ экземпляръ помѣщенъ въ музей губернскаго земства, гдѣ я могъ его видѣть. Этотъ экземпляръ — старый самецъ. Низъ бѣлый, за исключеніемъ зоба, гдѣ много бурыхъ продольныхъ пестринъ.

По даннымъ орнитологической литературы для сосѣднихъ губерній этотъ видъ поморника наблюдался: въ июлѣ 1867 г. въ Казанской губ. (Богдановъ l. c.), въ Ярославской губ. «лѣтомъ» (Сабанѣвъ) и въ послѣдніе годы на осеннемъ пролетѣ 26.VIII.906 въ Ярославской губ. (Поляковъ, l. c.), въ Московской 15.IX.908 (Поляковъ, l. c.) и въ Костромской 6.X.910 (Кирпичниковъ, l. c.). На основаніи этихъ находокъ пока еще нельзя считать *Stercorarius pomarinus* правильно залетающимъ въ центральныя губерніи, а потому я вношу его въ списокъ нижегородскихъ птицъ съ обозначеніемъ: *erraticus*.

7. *Stercorarius crepidatus* (L. Gm.).

- Stercorarius crepidatus*, L. Gm. Мензбирь (5), стр. 98.

Поморникъ этого вида добытъ въ Нижегородской губернии дважды: 1.VII.912, ♂ ad. на Волгѣ у Безводнаго В. П. Деметьевымъ и 25.VIII.912 ♀ juv. на Волгѣ противъ Н.-Новгорода Н. А. Покровскимъ. Первая птица принадлежитъ къ темной вариации. Не имѣя матеріала для сравненія, я могу сказать только, что этотъ экземпляръ не моложе одного года.

8. *Larus cachinnans* (Pall.).

- Larus cachinnans*, Pall. Мензбирь (5), стр. 125.

По словамъ Н. А. Покровскаго, эта чайка встрѣчалась въ очень небольшомъ количествѣ на осеннемъ пролетѣ на Волгѣ въ 1912 году. Этимъ наблюдателемъ былъ добытъ ♂ juv. 14.IX.912 на Волгѣ въ окрестности Н.-Новгорода. Мнѣ эта чайка не встрѣтилась. (Точнѣе: я не могу поручиться, что наблюдавшійся мною большія чайки, какъ напр., одиночка на Волгѣ у Мазы, Макарьевскаго у., въ концѣ апрѣля 1911 г., принадлежали именно къ *L. cachinnans*). Строго говоря, по экземпляру, добытому Н. А. Покровскимъ, нельзя съ несомнѣнной точностью опредѣлить видъ, но, судя по даннымъ орнитологической литературы, не приходится сомнѣваться, что большинство пролетающихъ черезъ Нижегородскую губ. большихъ чаекъ принадлежатъ къ *L. cachinnans*, а не къ *L. affinis* или *L. argentatus*.

9. *Larus glaucus* (Brünn.).

Larus glaucus, O. Fabr. Меззбирь (5), стр. 117.

Чайка этого вида была добыта под Печерским монастырем на Волгѣ (окр. Н.-Новгорода). Чучело этой птицы сохраняется. Я его видѣлъ. Это молодая птица. По словамъ убившаго ее крестьянина, эта чайка была добыта „года три назадъ“ поздною осенью, когда Волга уже стала. Держалась на полянкахъ. Была очень жирна.

10. *Larus canus* (L.).

Larus canus, L. Меззбирь (5) стр. 136.

„ „ „ Рузскій (4), стр. 44.

„ „ „ Киричниковъ (14), стр. 410.

Сизая чайка—обыкновенная гнѣздящаяся птица на Волгѣ. По М. Д. Рузскому встрѣчается и на Сурѣ (Рузскій, I. с.). На Ветлугѣ мнѣ не попадалась, но Киричниковъ (I. с.) наблюдалъ ее на этой рѣкѣ въ июнѣ въ Костромской губерніи. На пролетѣ весной не многочисленна. Летитъ небольшими, до 10 шт., стайками; если вдоль Волги, то съ 0 на W, или съ 80 на NW. Последнюю стайку видѣлъ 21.IV. Къ концу лѣта количество сизыхъ чаекъ сильно возрастаетъ. Въ августѣ держится стаями до 30 штукъ. Въ нѣкоторыхъ стаяхъ преобладаютъ старыя птицы, въ другихъ же обратно—молодыя.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1) 11.VIII.911 ♀ ad. | } Волга противъ Безводнаго. |
| 2) 11.VIII.911 ♀ juv. | |
| 3) 11.VIII.911 ♂ juv. | |

Экземпляръ № 1 имѣетъ уже сѣровато-бурыя пестринки на головѣ и верхней сторонѣ шеи (зимній нарядъ).

11. *Larus ridibundus* (L.).

Larus ridibundus, L. Меззбирь (5) стр. 152.

Мѣстное названіе: *мартышка*.

Обыкновенная чайка гнѣздится въ большомъ количествѣ какъ на главныхъ рѣкахъ: Волгѣ и Окѣ, такъ и на второстепенныхъ: Ветлугѣ и Сурѣ, но на двухъ послѣднихъ она не многочисленна. Пролетъ начинается обыкновенно въ концѣ марта и началѣ апрѣля. Лѣтомъ летаетъ кормиться на поля и свалки нечистотъ (напр., подъ Н.-Нов-

городомъ на „вывозномъ паркѣ“ среди воронъ и галокъ можно всегда видѣть нѣсколько чаекъ, чаще молодыхъ). Въ срединѣ лѣта старыя птицы исчезаютъ.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) 15.VII.910 ♂ juv. | } Волга противъ Кстова, Нижегородскаго у. |
| 2) 15.IV.911 ♂ | |
| 3) 15.IV.911 ♂ | |
| 4) 17.IV.911 ♂ | |
| 5) 15.VII.911 ♀ juv. | } Оз. Широкое въ Арзамасскомъ у. |
| 6) 15.VII.911 ♀ juv. | |
| 7) 15.VIII.911 ♀ juv. | |

12. *Larus minutus* (Pall.).

Larus minutus, Pall. Меззбирь (5), стр. 158.

„ „ „ Рузскій (4), стр. 47.

„ „ „ Киричниковъ (14), стр. 410.

Larus minutus на гнѣздовѣ въ Нижегородской губ. пока не найдена, но возможно, что спорадично гнѣздится въ небольшомъ количествѣ въ Московской губ., на Окѣ и сѣверитѣ (Меззбирь). Найдена гнѣздящаяся въ Казанской губ. и убита лѣтомъ (17.VI.910) на Ветлугѣ въ Костромской губ. Киричниковымъ, который считаетъ малую чайку гнѣздящейся въ восточной части Костромской губерніи. Въ моей коллекціи имѣется экземпляръ, добытый 10.V.911 на Волгѣ. Н. А. Покровский добылъ эту чайку 14.VII.911 въ Васильскомъ уѣздѣ.

Экземпляръ коллекціи:

- 10.V.911 ♂ ad. Волга у Города, Балахнинскаго уѣзда.

13. *Hydrochelidon nigra* (L.).

Hydrochelidon nigra, L. Меззбирь (5), стр. 172.

Черная крачка найдена на гнѣздовѣ въ долинахъ Волги и Оки, гдѣ она довольно обыкновенна. Гнѣздится по Серезѣ, Тешѣ и Алатырю; возможно, и на Пьянѣ. Рузскимъ отмѣчается для Суры. Въ сѣверной половинѣ, по крайней мѣрѣ въ Семеновскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ не гнѣздится.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1) 8.VI.909 ♀ ad. | Дер. Новая на Кудьмѣ, Нижег. у. |
| 2) 17.V.911 ♂ ad. | Алатырь близъ Кемли, Лукоян. у. |
| 3) 17.V.911 ♂ ad. | „ „ „ „ |

14. *Hydrochelidon fissipes* (L.).

Hydrochelidon leucoptera, Sch. Меззбирь (5), стр. 169.

" " " Хомяковъ (1), стр. 109.

" " " Житковъ и Бутурлинъ (10), стр. 38.

" " " Поляковъ (12), стр. 83.

Свѣтлокрылая крачка встрѣчена мною только однажды: 4. VI. 911 въ Арзамасскомъ уѣздѣ на оз. Широкомъ въ стайкѣ черныхъ крачекъ въ количествѣ 10 экз., изъ которыхъ одна была добыта. Я предполагаю, что эти крачки гнѣздились гдѣ-либо поблизости, потому что на указанное озеро онѣ лишь прилетали на нѣсколько часовъ. Гнѣздиться онѣ могли или ниже по Серезѣ (Сереза течетъ черезъ это озеро), или на Тешѣ. И здѣсь, и тамъ удобныхъ мѣстъ для гнѣздованія крачекъ достаточно. Ежегодно ли гнѣздятся здѣсь свѣтлокрылыя крачки — не извѣстно. Вѣроятно же, что ежегодно, такъ какъ по свидѣтельству М. А. Меззбира эта крачка — рѣдкая гнѣздящаяся птица Московской губерніи, Хомяковымъ (1. с.) найдена обыкновенной на гнѣздовѣ въ Рязанской губ. и по Полякову (1. с.) гнѣздится въ Покровскомъ уѣздѣ, Владимирской губ., слѣдовательно, въ бассейнѣ Оки онѣ довольно нерѣдки. Я не находилъ этой птицы на Алатырѣ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, но по свидѣтельству Житкова и Бутурлина (1. с.) она гнѣздится въ долинѣ этой рѣки въ Симбирской губерніи.

Экземпляръ коллекціи:

4. VI. 911 ♀ ad. Оз. Широкое на Серезѣ въ Арзамасскомъ у.

15. *Sterna fluviatilis* (Naum.).

Sterna fluviatilis, Naum. Меззбирь (51), стр. 182.

Рѣчная мартышка очень обыкновенна на Волгѣ, Окѣ, Суры и Ветлугѣ. На Алатырѣ я встрѣтилъ ее только однажды во второй половинѣ мая въ количествѣ 2 экз. и потомъ 21. VII въ количествѣ 4 экз., изъ которыхъ одинъ былъ добытъ. Этотъ же видъ гнѣздится, вѣроятно, въ долинахъ Тешы и Серезы, потому что я часто наблюдалъ ихъ на оз. Широкомъ, гдѣ онѣ, однако, не гнѣздились, а лишь кормились. О времени прилета и отлета свѣдѣній не имѣю, но въ 911 г. весной до 4 мая на Волгѣ я не наблюдалъ ни одной крачки.

Экземпляръ коллекціи:

21. VII. 911 ♂ ad. Алатырь около Н.-Пчизокъ, Лукояновскаго уѣзда.

16. *Sterna minuta* (L.).

Sterna minuta, L. Меззбирь (5), стр. 198.

Малая крачка гнѣздится по Волгѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже не рѣже чѣмъ *St. hirundo*. Кромѣ Волги гнѣздится, вѣроятно, и на Окѣ. Здѣсь я встрѣчалъ ее при устьѣ рѣки. Не разъ наблюдалъ ее въ іюнѣ на Ветлугѣ. По этой рѣкѣ она заходитъ и въ Костромскую губернію, гдѣ была добыта Киричничковымъ. Отмѣчена и для Суры въ качествѣ гнѣздящейся птицы.

Limicolae.

17. *Scolopax rusticola* (L.).

Scolopax rusticola, L. Меззбирь (5), стр. 205.

Вальдшнепъ гнѣздится по всей губерніи. Тяга начинается въ первой половинѣ апрѣля и кончается около 25 мая.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 13. IV. 911 ♂ „Марьяна Роца“ подъ Н.-Новгородомъ.
- 2) 25. IV. 911 ♂ Жуковский затонъ, Макарьевскаго уѣзда.
- 3) 22. V. 911 ♂ Лѣсъ по лѣвому бер. Алатыря, Лукоян. у.

18. *Gallinago media* (Lath.).

Scolopax major, Gm. Меззбирь (5), стр. 212.

Дунель принадлежитъ къ числу гнѣздящихся птицъ, но встрѣчается значительно рѣже бекаса.

Экземпляръ коллекціи:

21. V. 911 Калша, притокъ Алатыря, Лукояновскаго уѣзда.

19. *Gallinago gallinago* (L.).

Scolopax gallinago, Briss. Меззбирь (5), стр. 217.

Бекасъ на гнѣздовѣ очень обыкновененъ по всей губерніи. Молодыхъ, едва летавшихъ, я наблюдалъ 7. VI. Сообщу одно интересное наблюденіе, изъ области біологіи этой птицы. На Волгѣ мнѣ пришлось убѣдиться, что бекасъ не всегда прячется днемъ въ травѣ или кочкахъ, но можетъ, какъ и другіе кулики, держаться на совершенно открытомъ, гладкомъ, илисто-песчаномъ берегу. Когда Волга

мельтеть, то въ затонахъ и заводяхъ обнажаются илистые отлогія впадины съ водой въ болѣе глубокихъ мѣстечкахъ. Здѣсь держатся положительно все виды куликовъ, какіе только встрѣчаются по Волжскимъ берегамъ и среди нихъ бекасъ. Ведеть себя бекасъ въ такихъ случаяхъ совершенно своеобразно. Онъ постоянно прижимается, какъ будто его не держатъ ноги. Перебѣжить и тотчасъ присядеть, если нужно взять замѣченный кормъ. Подойдя изъ-за кустовъ можно такимъ образомъ убить бекаса сидячаго. Волжскіе промышленники устраиваютъ въ такихъ мѣстахъ шалашъ изъ ивовыхъ вѣтокъ и отъ шалаша по радіусамъ выкапываютъ въ грязи борозды. Въ борозду бекасъ садится, конечно, охотиѣе, чѣмъ на совершенно гладкое мѣсто. [Такой шалашъ и борозды устраиваются и среди обыкновеннаго мѣстопробыванія бекаса: среди травянистой, кочковатой мочажины и тогда такая охота можетъ быть очень интересной. Изъ сосѣднихъ зарослей на борозды выходятъ такіе скрытно живущіе виды, какъ: *Pogona squarrosa*, *Rallus aquaticus*, *Ardetta minuta*, а однажды къ шалашу, въ которомъ я притаился, близко подошла большая вынь и я имѣлъ удовольствіе слышать ея крикъ въ 3-4 шагахъ (сама птица была сзади меня и я ее не видѣлъ). Цѣлый рядъ наблюденій надъ поведеніемъ, половой жизнью, криками и т. д. съ избыткомъ вознаграждаетъ за терпѣливое ожиданіе птицъ и за массу неприятностей, связанныхъ съ сидѣніемъ въ болотѣ.]

Экземпляры коллекціи:

- 1) 7.VI.910 juv. Нестіарь, Макарьевского уѣзда.
- 2) 20.V.911 ♂ ad. Р. Калша въ Лукояновскомъ уѣздѣ.
- 3) 3.VII.911 ♀ juv. Оз. Широкое на Серезѣ, Арзамасскаго у.
- 4) 20.VIII.911 ♂ juv. Жуковский затонъ, Макарьевского уѣзда.

20. *Gallinago gallinula* (L.).

Scolorax gallinula, L. Менабиръ (5), стр. 225.

По имѣющимъ у меня свѣдѣніямъ гаршнепъ—только пролетная птица Нижегородской губерніи.

21. *Tringa minuta* (Leisl.).

Tringa minuta, Leisl. Менабиръ (5), стр. 234.

Найдены на пролетѣ на Волгѣ, Ветлугѣ и Сурѣ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.VIII.911 ♂ juv. } Собчинскій затонъ на лѣвомъ бер. Волги.
- 2) 10.VIII.911 ♂ juv. } Семеновскаго уѣзда.
- 3) 11.VIII.911 ♂ juv. }
- 4) 14.VIII.911 ♀ juv. } Жуковский затонъ, Макарьевского уѣзда.
- 5) 20.VIII.911 ♀ juv. }
- 6) 22.VIII.911 ♂ juv. Жуковский затонъ, Макарьевского уѣзда.
- 7) 22.VIII.911 ♀ juv. Кадницы, Макарьевского уѣзда.

22. *Tringa temmincki* (Leisl.).

Tringa temmincki, Leisl. Менабиръ (5), стр. 239.

Этотъ куличекъ бываетъ на Волгѣ ежегодно весной и осенью. Въ количествѣ уступаетъ первому. Осенью наблюдался и на Сурѣ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 26.VII.910 ♂ juv. Собчинскій затонъ на Волгѣ, Семеновск. уѣзда.
- 2) 10.VIII.911 ♀ juv. *ibidem*.
- 3) 19.VIII. ♀ juv. Жуковский затонъ на Волгѣ, Макарьевского уѣзда.

23. *Calidris leucocerphala* (Pall.).

Tringa arenaria, L. Менабиръ (5), стр. 242.

Песчанка наблюдалась въ 1911 и 1912 годахъ на осеннемъ пролетѣ на Волгѣ съ конца первой трети іюля и по 8. IX. Держалась небольшими стайками по песчанымъ отмелямъ и грязямъ. Н. А. Покровский добылъ ихъ 9 экзempl., изъ которыхъ два поступили въ мою коллекцію. Два экзempl. ♂ и ♀, убитые 15. VII. 911, близъ Разнѣжи, Макарьевского у.—старыя птицы, остальные молодыя.

Экземпляры коллекціи:

- 1) и 2) 31.VIII.911 juv. juv. Волга подъ Печорскимъ монастыремъ.

24. *Tringa platyrhyncha* (Temm.).

Tringa platyrhyncha, Temm. Менабиръ (5), стр. 231.

2-го, 5-го и 19-го августа 1912 года Н. А. Покровский добылъ на Волгѣ подъ Сормовымъ 3 экзempl. *T. platyrhyncha*. Я видѣлъ ихъ въ музей Нижегородскаго земства.

25. *Tringa alpina* (L.).

Tringa alpina, L. Мензбирь (5), стр. 247.

Чернозобикъ найденъ въ Нижегородской губерніи пока только на осеннемъ пролетѣ. Первые добыты 9. VII. Последніе — 27. VIII. За этотъ промежутокъ чернозобики очень обыкновенны.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) 10.VIII.911 ♀ juv. | } Жуковский затонъ на Волгѣ, Макарьевского уѣзда. |
| 2) 13.VIII.911 ♀ ad. | |
| 3) 13.VIII.911 ♂ | |
| 4) 19.VIII.911 ♂ juv. | |
| 5) 27.VIII.911 ♀ ad. | } Волга противъ Кадницъ, Макарьевского уѣзда. |
| 6) 27.VIII.911 ♀ ad. | |
| 7) 27.VIII.911 ♀ | |
| 8) 27.VIII.911 ♀ | |
| 9 и 10) 12.VIII.913 ad. ad. | |
- Волга противъ Собчинскаго затона.

26. *Tringa canutus* (L.).

Tringa canutus, L. Мензбирь (5), стр. 251.

Куликъ этого вида былъ убитъ въ срединѣ осени 1911 года на оутѣ подъ Н.-Новгородомъ. Экземпляръ сохраняется въ Земскомъ Музеѣ въ Н.-Новгородѣ, гдѣ я его могъ видѣть.

27. *Tringa subarquata* (Guld.).

Tringa subarquata, Guld. Мензбирь (5), стр. 255.

Осенью краснозобикъ на Волгѣ довольно обыкновененъ, по крайней мѣрѣ въ промежутокъ между 9.VII и 31.VIII. На пролетѣ встрѣчается и на Сурѣ.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) 10.VIII.911 ♀ juv. | } Собчинскій затонъ на лѣвомъ бер. Волги, Семеновскаго уѣзда. |
| 2) 10.VIII.911 ♂ juv. | |
| 3) 10.VIII.911 ♂ juv. | |
| 4) 14.VIII.911 ♂ juv. | } Жуковский затонъ на Волгѣ, Макарьевск. у. |
| 5) 14.VIII.911 ♂ juv. | |
| 6) 20.VIII.911 ♀ juv. | |

Въ 1911 году пролетъ куликовъ по Волгѣ наблюдали: Покровский, преимущественно съ 8.VII. по 16.VII и я съ 10.VIII. по 30.VIII. По-

кровскій наблюдать и добывалъ въ большомъ количествѣ куликовъ р. *Tringa* исключительно старыхъ. Онъ привезъ для коллекціи Нижегородскаго Земскаго Музея слѣдующихъ птицъ:

<i>Tringa minuta</i>	отъ 9.VII ♂ ad.	Работки, Макарьевского у.
<i>Tringa alpina</i>	9.VII ♂ ad.	Кувардино, Макарьевского у.
<i>Tringa alpina</i>	15.VII ♂ ad.	Разивъжье, Васильскаго у.
<i>Tringa subarquata</i>	9.VII ♂ ad.	Работки, Макарьевского у.
<i>Tringa subarquata</i>	9.VII ♀ ad.	Кувардино, Макарьевского у.
<i>Tringa subarquata</i>	14.VII 3 ♀ ad. ad.	Бармино, Васильск. у.
<i>Tringa arenaria</i>	15.VII ♂ ad.	Разивъжье, Васильскаго у.
<i>Tringa arenaria</i>	15.VII ♀ ad.	Разивъжье, Васильскаго у.

Начиная съ 10.VIII и не встрѣчалъ старыхъ *Tringa*, за исключеніемъ *Tringa alpina* (среди которыхъ стариковъ было около $\frac{1}{2}$ общаго числа), тогда какъ молодыхъ было много. То же явленіе наблюдалось съ *Charadrius hiaticula*. Этотъ куликъ летѣлъ позднѣе другихъ, такъ что Покровскій до 16.VIII ихъ не находилъ. Я наблюдалъ сначала только стариковъ, потомъ летѣли стайки старыхъ и молодыхъ и, наконецъ, въ послѣднихъ числахъ августа попадались почти исключительно молодые. *Phalaropus hyperboreus* наблюдался только мной. Стайки этихъ куличковъ состояли изъ молодыхъ птицъ. Турухтаны попадались какъ старые, такъ и молодые. Молодые, конечно, преобладали. Всѣ кулики рода *Tringa*, *Charadrius hiaticula* и *Ch. minor*, *Totanus riphae* и *Phalaropus hyperboreus* очень часто держатся всѣ вмѣстѣ общей стаей, но при этомъ *Ph. hyperboreus* никогда не смѣшивается съ другими куличками, а образуетъ отдѣльную стайку съ краю общей. Всѣ эти кулики чрезвычайно доверчивы и подпускаютъ очнь близко, особенно миловидные плавунчики, которыхъ нельзя взять развѣ только рукой.

28. *Limosa limosa* (L.).

Limosa melanura, Leisl. Мензбирь (5), стр. 263.

М. А. Мензбирь, опредѣляя область распространенія этой птицы, говоритъ, что въ средней Россіи *L. melanura* обыкновененъ на пролетѣ и гнѣздится въ небольшомъ числѣ въ Московской губерніи, а въ среднемъ Поволжьѣ до Казанской губ. включительно довольно обыкновененъ. Въ Нижегородской губ. веретенникъ съ достовѣрностью добытъ пока только однажды: 12.IV.913 въ поймѣ Волги у Городца,

Балахнинского уезда, Н. А. Покровскимъ была убита старая самка изъ пары. Въ Естественно-Историческомъ Музеѣ Нижегородскаго Земства имѣется экземпляръ молодого веретенника этого вида, но безъ даты (изъ сбора Э. Пельцама).

29. *Limosa lapponica* (L.).

Limosa rufa, Briss. Мензбирь. (5), стр. 269.

Веретенникъ этого вида былъ добытъ 22.VIII.912 на Волгѣ у Сормова Н. А. Покровскимъ. Онъ оказался молодой самкой. Вѣроятно же, что это случайно залетѣвшая птица.

30. *Arenaria interpres* (L.).

Streptilas interpres L. Мензбирь. (5), стр. 258.

Въ 1912 году на осеннемъ пролетѣ камнешарка была добыта 12.VIII на Окѣ у д. Сысоевки, Горбатовскаго уезда П. М. Соловьевымъ (2 экз.) и 16.VIII на Волгѣ противъ Нижегородской ярмарки Н. А. Покровскимъ (3 экз.)

31. *Machetes pugnax* (L.).

Totanus pugnax, Briss. Мензбирь. (5), стр. 275.

М. А. Мензбирь (I. c.) о гнѣздованіи турухтана въ Европейской Россіи говоритъ между прочимъ слѣдующее: «Въ губ. Казанской, Рязанской, Московской, Тульской и вѣроятно во многихъ другихъ губерніяхъ центральной Россіи гнѣздится мѣстами даже въ большомъ количествѣ». Изъ болѣе позднихъ сообщеній о гнѣздованіи этой птицы отмѣчу только статью Б. М. Житкова въ № 2 „Орнитологическаго Вѣстника“ за 1911 г. Въ ней авторъ сообщаетъ о совершенно точно констатированномъ случаѣ гнѣздованія турухтана въ Симбирской губерніи въ поимѣ р. Алатыря. Слѣдовательно гнѣздованіе турухтана въ Нижегородской губ. болѣе, чѣмъ вѣроятно. У насъ имѣются положительныя данныя только для долины Волги. Н. А. Покровскій добылъ при устьѣ Керженца старую самку 13.VI.913 и видѣлъ 17.VI.913 двухъ старыхъ самцовъ у Васная-Сурска. Охотники увѣряютъ, что турухтанъ гнѣздится нормально въ „Артемьевскихъ лугахъ“ по Волгѣ немного ниже Н.-Новгорода. На пролетѣ какъ весной, такъ и осенью турухтанъ на Волгѣ очень обыкновененъ. Весною бои пѣтуховъ наблюдаются во многихъ мѣстахъ по Волгѣ. На рынокъ весной турухтановъ носить и иногда въ большомъ количествѣ по крайней мѣрѣ до 10 мая.

Экземпляры коллекціи:

- 6 экз. ♂♂ доб. отъ 4—6.V.911 на р. Ватомѣ въ Семеновскомъ у.
39 экз. ♂♂ доб. отъ 6—8.V.911 на лѣвомъ берегу Волги въ окрестн. Толоконцева, Балахнинскаго у.
2 экз. ♂♂ доб. 10.V.911 на лѣвомъ бер. Волги противъ Н.-Новгорода.
48) 10.VIII.911 ♂ ad. } Собчинскій затонъ на Волгѣ, Семеновскаго у.
49) 10.VIII.911 ♀ juv. }
50) 10.VIII.911 ♂ juv. }
51) 14.VIII.911 ♂ juv. Кадницы, Макарьевскаго уезда.
52) 17.VIII.911 ♀ juv. Жуковский зат. противъ Кадницъ.

32. *Actitis hypoleucos* (L.).

Totanus hypoleucos, L. Мензбирь. (5), стр. 282.

Перевозчикъ очень обыкновенная птичка описываемой мѣстности. Прилетаетъ во второй половинѣ апрѣля. Полныя кладки яицъ (изъ 4 шт.) я находилъ не ранѣе 12.V.

Экземпляръ коллекціи:

3.VI.909 ♀ Дор. Новая на Кудьмѣ, Нижегородскаго уезда.

33. *Terekia cinerea* (Guld.).

Totanus terekus, Lath. Мензбирь. (5), стр. 286.

Simorhynchus cinerea (K. et Bl.) Guld. Богдановъ. (1), стр. 134.

Terekia cinerea Guld. Житковъ и Бутурлинъ. (10), стр. 74.

Totanus terekus, Lath. Хомяковъ. (7), стр. 113.

Мородунка принадлежитъ къ рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ Макарьевскаго и Балахнинскаго уездовъ, слѣдовательно гнѣздится съ достовѣрностью лишь въ сѣверныхъ уѣздахъ. Въ южной половинѣ Нижегородской губ. пока не найдена, но вѣроятно гнѣздится тамъ, хотя бы и рѣдко, потому что найдена гнѣздящеюся въ долинѣ Алатыря въ Симбирской губ. (Житковъ и Бутурлинъ I. c.) и въ Рязанской губ. (Хомяковъ I. c.). Сообщу о своихъ встрѣчахъ съ этой птицей. Въ Макарьевскомъ уездѣ я нашелъ мородунку на Керженцѣ недалеко отъ его устья. Здѣсь 2.V.911 мнѣ встрѣтилась стайка въ 6 экз., повидимому пролетная. Въ этотъ же день я нашелъ одиночку, оказавшуюся ♀. Въ яйцеводѣ ея оказалось яйцо, уже въ скорлупѣ и слегка пигментированное. Правильно ли гнѣздится на Керженцѣ мородунка—сказать не могу, но во всякомъ случаѣ она здѣсь очень рѣдка. Повидимому рѣдка она и на Ветлугѣ. Здѣсь я наблюдалъ

пару гнѣздящихся мородунокъ у дер. Сусуева 20.VI.910. Въ это время были только пуховые птенцы, едва бѣгающіе. Старая мородунка, оказавшаяся ♂, съ отчаяннымъ крикомъ, то летала около меня, то принималась убѣгать, хромая и повѣсивъ крыло. Она вертѣлась такъ близко отъ меня, что я, рѣшивъ выстрѣлить, принужденъ былъ цѣлить немного въ сторону, чтобы не разбить птицы. Послѣ неудачнаго выстрѣла мородунка отлетѣла дальше, но снова вернулась, когда запищала пойманный мной птенецъ.

Что касается Балахнинскаго уѣзда, то по сообщенію Богданова (I. с.) „29 іюня 64 г. убиты старый и молодой, летный въ лугахъ около с. Чернорѣчья, А. В. Сапожниковымъ“. Указанное село находится на лѣвомъ берегу Оки въ Балахнинскомъ уѣздѣ. Неподалеку, на Окѣ же, противъ с. Повинокъ, молодой съ остатками пуха на перьяхъ былъ добытъ Н. А. Покровскимъ 2 го или 3-го іюля 1908 г. На пролетѣ бываетъ на Окѣ и Волгѣ. Весною замѣчена въ первыхъ числахъ апрѣля на Кудьмѣ. По этой рѣкѣ, какъ я уже говорилъ въ географическомъ очеркѣ Нижегородск. губ., птицы, летящія по Окѣ внизъ, сворачиваютъ на Волгу, чтобы сократить разстояніе и облетѣть городъ. Слѣдовательно замѣченныя на Кудьмѣ мородунки прилетѣли вѣроятно съ Оки. Осенью мородунки летятъ по Волгѣ начиная съ конца первой трети іюля. Въ концѣ августа ихъ уже здѣсь не видно. Последняя птица наблюдалась 18.VIII.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 2.V.910 ♀ Керженецъ въ 8 верст. отъ устья.
- 2) 20.IV.910 ♂ ad. } Ветлуга близъ дер. Сусуева, Макарьевского у.
- 3) 20.VI.910 pull. }
- 4) 18.VIII.911 ♀ juv. Волга противъ Кадницъ, Макарьевского у.

34. *Totanus ochropus* (L.).

Totanus ochropus. Меназбиръ, (5), стр. 291.

Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ гнѣздящихся куликовъ. Прилетаетъ въ первыхъ числахъ апрѣля, но кочующія стайки можно видѣть и въ первыхъ числахъ мая.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 1.VI.909 ♀ ad. Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 7.VI.911 ♂ Р. Кудьма въ Нижегородскомъ уѣздѣ.
- 3) 13.VIII.911 ♂ juv. Стар. Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 4) 22.V.911 ♂ ad. Рѣчка Козулейка въ Лукояновскомъ у.

35. *Totanus glareola* (L.).

Totanus glareola, L. Меназбиръ. (5), стр. 295.

Фифи, какъ и чернышъ, очень обыкновененъ на гнѣздовьяхъ, но распространенъ спорадичнѣе его.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 24.VI.909 ♂ Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 7.VI.910 ♀ Нестяръ, Макарьевского уѣзда.
- 3) 13.VII.911 ♀ juv. }
- 4) 13.VII.911 ♀ juv. } Стар. Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.

36. *Totanus stagnatilis* (Bechst.).

Totanus stagnatilis, Bechst. Меназбиръ. (5), стр. 298.

Поручейника я наблюдалъ только однажды въ 1911 г. въ Лукояновскомъ уѣздѣ. Въ поймѣ Калши, лѣваго притока Алатыря, я начиная съ 19.V. почти ежедневно видѣлъ одного кулика этого вида. Онъ былъ очень остороженъ и не подпускалъ на выстрѣлъ. Возможно, что здѣсь была пара гнѣздящихся поручейниковъ, но доказать это точно я не могу. На гнѣздовьяхъ въ данномъ мѣстѣ этого кулика можно ожидать, потому что онъ найденъ поблизости въ Ардатовскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи (Житковъ и Бутурлинъ).

Экземпляръ коллекціи:

- 24.V.911 ♂ ad. Калша, Лукояновскаго уѣзда.

37. *Glottis nebularius* (Gunn.).

Totanus glottis, L. Меназбиръ. (5), стр. 301.

Большой улитъ гнѣздится въ сѣверной части Нижегородской губ. и въ долинѣ Волги. Къ югу отсюда я встрѣчалъ улитовъ въ концѣ мая на Калшѣ въ Лукояновскомъ уѣздѣ. Однако возможно, что здѣсь я наблюдалъ бродячую особь. Въ Семеновскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ улитъ можетъ быть названъ обыкновенной птицей. Здѣсь онъ гнѣздится по лѣснымъ моховымъ болотамъ, но иногда встрѣчается и въ болотахъ, расположенныхъ среди полей. Мѣсто гнѣздовья отыскать очень легко, потому что старые птицы у гнѣзда забываютъ всякую осторожность и налетаютъ подошедшему, какъ говорится, на голову. Первые улитовъ я наблюдалъ 15.IV.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 23.VII.908 juv. Волга выше Кстова, Нижегородскаго у.
- 2) 25.VII.909 ♂ juv. Волга противъ дер. Столбицы, Нижегород. у.
- 3) 21.V.910 ♀ ad. Нестарь, Макарьевского уѣзда.
- 4) 30.IV.911 ♂ Юркино, Макарьевского уѣзда.
- 5) 2.V.911 ♀ Оз. Язы, Макарьевского уѣзда.
- 6) 8.VII.911 ♂ juv. }
7) 8.VII.911 ♂ juv. } Оз. Широкое, Арзамасскаго уѣзда.
8) 15.VII.911 ♂ juv. }
- 9) 26.VIII.911 ♂ juv. }
10) 26.VIII.911 ♂ juv. } Кадницы, Макарьевского уѣзда.

Totanus calidris (L.).

- Totanus calidris*, L. Мензбирь. (5), стр. 306.
Totanus calidris (Linn.) Рузскій. (4), стр. 61.
Totanus totanus L. Житковъ и Бутурлинъ. (10), стр. 73.
Totanus calidris, L. Киричниковъ. (14), стр. 408.

М. А. Мензбирь въ „Птицахъ Россіи“ указываетъ, что травникъ гнѣздится почти во всей Европейской Россіи. Мнѣ въ Нижегородской губ. травникъ не попадался и я увѣренъ, что тамъ, гдѣ я былъ, травника дѣйствительно не было. Замѣчу здѣсь, что Рузскій (l. c.) не нашелъ этого кулика на сѣверѣ Казанской губ. Въ Костромской Киричниковымъ (l. c.) также не найденъ. Въ Симбирской губ. найденъ гнѣздящимся въ долину Суры (Бутурлиннымъ?). Гнѣздится, по Артоболевскому въ Пензенской губ.

38. *Totanus fusca* (L.).

Totanus fuscus, L. Мензбирь. (5), стр. 308.

Этотъ куликъ встрѣченъ только на пролетѣ, на Волгѣ весной.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 4.V.911 ♀ }
2) 4.V.911 ♀ } Р. Ватома, дѣв. притокъ Волги, Семеновскаго уѣзда.

39. *Phalaropus hyperboreus* (L.).

Phalaropus hyperboreus, L. Мензбирь. (5) стр. 313.

Этотъ куличекъ найденъ въ Нижегородской губерніи на осеннемъ пролетѣ. Я наблюдалъ его съ 10.VIII на Волгѣ. Къ концу этого мѣсяца онъ попадался значительно рѣже. Встрѣчались только молодыя птицы.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.VIII.911 ♂ juv. Собчинскій затонъ на Волгѣ, Семеновск. у.
- 2) 14.VIII.911 }
3) 14.VIII.911 } Волга близъ Кадницъ, Макарьевского уѣзда.

40. *Numenius arquata* (L.).

Numenius arquatus, L. Мензбирь. (5), стр. 324.

Мѣстное названіе: *боровоі куликъ*.

Большой кроншнепъ обыкновененъ на гнѣздовьяхъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ по лѣснымъ озерамъ. Несомнѣнно гнѣздится и въ Семеновскомъ. Мнѣ говорили, что „боровоі куликъ“ гнѣздится—въ Арзамасскомъ уѣздѣ въ болотахъ по Серезѣ. Это очень вѣроятно, потому что я самъ видѣлъ тамъ стайку кроншнеповъ въ 7 шт. 7.VII. Въ Макарьевскомъ уѣздѣ молодыхъ, еще не летавшихъ я видѣлъ 8.VI. На пролетѣ кроншнепъ обыкновененъ на Волгѣ и Олѣ.

41. *Numenius phaeopus* (L.).

Numenius phaeopus, L. Мензбирь. (5), стр. 327.

Кроншнепъ этого вида, ♀ ad., былъ добытъ Н. А. Покровскимъ 5.V.913 на правомъ берегу Волги противъ Собчинскаго затона (15 верстъ ниже Н.-Новгорода).

42. *Haematopus ostralegus* *subsp.*?

Haematopus ostralegus, Briss. Мензбирь (5), стр. 331.

Куликъ-сорока гнѣздится на Ветлугѣ и здѣсь обыкновененъ. На Волгѣ одиночные экземпляры встрѣчаются все лѣто, но я не знаю, гнѣздятся ли кулики-сороки здѣсь. На пролетѣ по большимъ рѣкамъ обыкновененъ. Я не добылъ гнѣздящихся птицъ, что же касается имѣющихся у меня одного весенняго и одного осенняго сорокаевъ, то они могутъ быть отнесены къ *H. ostr. longipes* Buturl. (Орнитол. Вѣстникъ № 1, 1910 г.)

Экземпляры коллекціи:

- 1) 22—23.IV.911, ♀ Волга у Бармина, Васильск. у.
 - 2) 11.VIII.911, ♂ juv. Волга противъ Безводнаго.
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Размѣры клюва 1-го 84 мм. | Размѣры плюсны 1-го 52 мм. |
| „ „ 2-го 70 мм. | „ „ 2-го 54,5 мм. |

43. *Vanellus vanellus* (L.).

Vanellus cristatus, Meyer. Меназбирь (5), стр. 365.

Мѣстное название: *пиголица*, *пиалка*.

Пиголица—обычная птица на всякой сколько-нибудь значительной мокрой луговинѣ. Въ сѣверныхъ уѣздахъ, занятыхъ лѣсомъ, она естественно рѣдка.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 27.V.909 ♀ Дер. Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 21.V.911 ♂ } Р. Калша, Лукояновскаго уѣзда.
- 3) 23.V.911 ♀ }

44. *Aegialitis dubius* (Scop.).

Charadrius minor, Meyer et Wolf. Меназбирь (5), стр. 378.

Малый зуекъ на гнѣздовѣ въ Нижегородской губерніи довольно обыкновененъ. Пролетъ на Волгѣ осенью кончается къ концу августа.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.IV.910 ♂ } Керженецъ, въ 8 верст. отъ устья.
- 2) 2.V.910 ♂ }
- 3) 2.V.910 ♂ }
- 4) 14.VI.910 ♂ Ветлуга близъ Анненки, Макарьевскаго у.
- 5) 1.V.911 ♀ Оз. Язы, Макарьевскаго у.
- 6) 28.VIII.911 ♀ juv. Жуковский затонъ на Волгѣ, Макарьевскаго у.

45. *Aegialitis hiaticula* (L.).

Charadrius hiaticula, L. Меназбирь (5), стр. 381.

Этотъ куличекъ наблюдался мной на пролетѣ на Волгѣ. Осенью въ концѣ августа ихъ уже не видно.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.VIII.911 ♂ ad. } Волга выше Кстова, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 10.VIII.911 ♀ ad. }
- 3) 14.VIII.911 ♂ ad. }
- 4) 17.VIII.911 ♂ juv. } Волга противъ Кадницъ, Макарьевскаго уѣзда.
- 5) 19.VIII.911 ♀ juv. }

46. *Charadrius pluvialis* (L.).

Charadrius pluvialis, L. Меназбирь (5), стр. 396.

М. А. Меназбирь (l. c.) вполне опредѣленно указываетъ, что *Charadrius pluvialis* пролетаетъ осенью по верхнему теченію Волги и по

Окѣ. Я не имѣю этой ржанки, но видѣлъ ее 10.VII.911 на Волгѣ близъ Собчинскаго затона. Птицъ было двѣ: старая и молодая. Кромѣ этого случая *Ch. pluvialis* мнѣ не попадался.

47. *Squatarola helvetica* (L.).

Charadrius helveticus, Briss. Меназбирь (5), стр. 390.

Морская сивка наблюдалась въ небольшомъ числѣ на осеннемъ пролетѣ на Волгѣ въ 1912 году. Н. А. Покровскимъ добыто 30.VIII и 1.IX.912 подъ Нижнимъ 5 экзempl. Я видѣлъ ихъ въ Нижегородскомъ Земскомъ Музеѣ. Это молодыя птицы.

Alectorides.

48. *Grus grus* subsp.?

Grus cinerea, Bechst. Меназбирь (5), стр. 416.

Журавли очень обыкновенны на гнѣздовѣ во всей Нижегородской губ., особенно же на сѣверѣ ея, гдѣ гнѣздятся по преимуществу на обширныхъ моховыхъ болотахъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 12.VI.911 pull. Дер. Анненка, на Ветлугѣ, Макарьевскаго у.
- 2) 24.V.911 ♂ ad. Лѣсъ по сѣверн. бер. Алатыря, Лукоянскаго у.
- 3) 8.VI.911 ♂ semiad. Р. Сережа, Арзамасскаго у.

49. *Tetrax tetrax* (L.).

Otis tetrax, L. Меназбирь (5), стр. 434.

" " Житковъ и Бутурлинъ (10), стр. 101.

Tetrax tetrax (Linn.). Артоболовскій (9), стр. 9.

М. А. Меназбирь сообщаетъ, что стрепетъ, какъ случайно залетная птица, былъ убиваемъ въ губ. Казанской, Нижегородской, Тульской, Московской, Ярославской, Тверской, Петроградской, въ Финляндіи и даже подъ Архангельскомъ. По Житкову и Бутурлину стрепетъ дважды наблюдался въ Курмышскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи. Не менѣе рѣдко бываетъ онъ и въ Пензенской губ. (по Артоболовскому). Что же касается Нижегородской, то мнѣ известны слѣдующіе случаи. Осенью 1905 г. близъ Никитина, Лукояновскаго уѣзда А. П. Бударинимъ былъ добытъ экземпляръ стрепета, который былъ очень худъ. Въ октябрѣ 1906 года экзempl. стрепета самки былъ убитъ

крестьяниномъ Наумовымъ въ окрестностяхъ с. Борь, Семеновскаго уѣзда (лѣвый берегъ Волги, въ этомъ мѣстѣ безлѣсный). Этотъ экземпляръ я видѣлъ въ Нижегородскомъ Музеѣ, гдѣ онъ сохраняется. Наконецъ, В. А. Горсткинъ сообщалъ мнѣ, что въ 1908 г. весной, когда летѣли *Syngnathes paradoxus* Pall., стрепета были убиваемы въ южной части Лукояновскаго уѣзда.

50. *Otis tarda* (L.).

Otis tarda, L. Мензбиръ (5), стр. 441.

„ „ „ Житковъ и Бутурлинъ (10), стр. 95.

Мѣстное названіе: *дудака*.

М. А. Мензбиръ (l. c.) сѣверную границу области распространенія дудака проводитъ черезъ Самарскую губ., южную часть Казанской, Симбирской и высказываетъ увѣренность въ гнѣздованіи дрофы въ южныхъ уѣздахъ Нижегородской губ. Такъ это действительно и было въ то время, когда писались «Птицы Россіи», но вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ дрофа стала рѣдкостью какъ въ Нижегородской губ., такъ и въ Симбирской, такъ что нельзя даже быть увѣреннымъ, что дрофа ежегодно залетаетъ въ эти губ. во время своихъ кочевекъ. Дудака, какъ зовутъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ дрофу, былъ обыкновенной птицей въ южныхъ уѣздахъ Нижегородской губерніи лѣтъ 10 назадъ. Объ этомъ единогласно свидѣтельствуютъ какъ литературныя данныя, такъ и показанія охотниковъ-любителей. Что касается первыхъ, то вотъ что пишутъ Житковъ и Бутурлинъ въ „Матеріалахъ для орнитофауны Симбирской губерніи“, написанныхъ, напомню, около 10 лѣтъ назадъ: кочующія лѣтнія и осеннія стайки дрофъ—обычное явленіе въ уѣздахъ: Курмышскомъ, Сергачскомъ, Княгининскомъ и Васильскомъ до Волги..... къ сѣверу отъ долины Алатыря въ Ардатовскомъ, Курмышскомъ (западной его части) и въ юго-восточныхъ уѣздахъ Нижегородской губерніи дрофы появляются также ежегодно, то въ большемъ, то въ меньшемъ количествѣ, чаще стайками отъ 4 до 12 штукъ, изрѣдка, какъ было, напр., въ Курмышскомъ уѣздѣ въ 1897 году, стаями до 50—80 штукъ“. Въ Нижегородскомъ Естественно-Историческомъ Музеѣ я видѣлъ рукописную замѣтку Ф. С. Ненюкова о нахожденіи дрофъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, подтверждающую въ общемъ то же самое. Въ настоящее время, какъ я уже сказалъ выше, дрофы не появляются сколько-нибудь правильно въ Нижегородской губерніи, въ чемъ я убѣдился, коллек-

тируя въ Лукояновскомъ уѣздѣ. Что касается Симбирской губ., то и здѣсь, какъ мнѣ говорилъ Б. М. Житковъ, дрофа за послѣдніе годы не встрѣчалась. Живущіе въ Лукояновскомъ уѣздѣ охотники обыкновенно увѣряли меня, что дрофа за послѣдніе годы совсѣмъ не появляется, но это не вѣрно, что ясно изъ той же замѣтки Ф. С. Ненюкова, который пишетъ слѣдующее: „Между 1900 и 1910 гг. (дрофы) какъ бы исчезли и о появленіи ихъ ничего не было слышно..... въ 1911 г. доставленъ 1 экз. въ г. Арзамасъ¹⁾ А. И. Бударинимъ“. О времени появленія кочующихъ стаяхъ дрофъ и ихъ отлета я имѣю очень скудныя свѣдѣнія. Вотъ выдержка изъ письма вышеупомянутаго А. И. Бударина: „Дрофы въ Нижегородской губерніи появляются около половины іюня и находятся до поздней осени. Держатся на пару и озимыхъ поляхъ“...

Интересный вопросъ о причинахъ исчезновенія рѣдкѣ обыкновенной здѣсь дрофы остается пока открытымъ.

51. *Fulica atra* (L.).

Fulica atra, L. Мензбиръ (5), стр. 449.

По Мензбиру (l. c.) лысуха должна гнѣздиться въ центральныхъ губерніяхъ Европейской Россіи. Однако въ Нижегородской губ. она на гнѣздовѣ пока не найдена. На пролетѣ добывается весной и осенью.

14.IV.910. Правый берегъ Волги въ предѣлахъ Балахнинск. у.

52. *Gallinula chloropus* (L.).

Gallinula chloropus, L. Мензбиръ (5), стр. 452.

Камышница, какъ гнѣздящаяся птица, обыкновенна по Серезѣ и лежащимъ по теченію этой рѣки озерамъ. Вѣроятно гнѣздится и сѣвернѣе, такъ какъ была добыта въ окр. с. Чмутава (около Горбатова) А. Б. Карцевымъ 5—10.V.912. Чучело этого экзempl. (♂) я видѣлъ въ Нижегородскомъ Земскомъ Музеѣ. Не рѣдка камышница въ поймѣ Алатыря въ Лукояновскомъ уѣздѣ. На оз. Широкомъ въ Арзамасскомъ уѣздѣ кладка яицъ (12 штукъ) была найдена 27 мая; 6 іюня всѣ птенцы уже выклюнулись за исключеніемъ одного, который былъ оставленъ недоразвитымъ. Гнѣздо помѣщалось въ развилкѣ тальниковаго куста на высотѣ одного аршина надъ уровнемъ

¹⁾ Вѣроятно изъ Лукояновскаго уѣзда.

воды. Оно было устроено из крупных сухих стеблей прошлогодней осоки. Рядомъ съ первымъ находилось другое на кочкѣ у самой воды. Повидимому выводокъ собирался ночевать въ него. Какъ-то я убилъ старую птицу и на другой день въ этомъ второмъ гнѣздѣ нашелъ двухъ мертвыхъ и двухъ умирающихъ пуховыхъ птенцовъ. Очевидно они погибли отъ холода (ночного), а также, вѣроятно, и отъ голода, потому что желудки всѣхъ четырехъ были совершенно пусты. Мнѣ приходилось наблюдать, что при выводкѣ находятся и самецъ, и самка. И въ данномъ случаѣ, кромѣ убитой мною старой птицы (поль не извѣстенъ), была другая—голосъ ея я слышалъ саженьяхъ въ 3-хъ отъ гнѣзда. То обстоятельство, что она *убыла* отъ меня, доказываетъ, что она вообще была въ состояніи подойти къ птенцамъ и согрѣть ихъ, а между тѣмъ умершіе были совершенно холодными, да и умирающіе очень замѣтно остыли. Можетъ быть, прикрыть собою птенцовъ составляетъ функцию- только котораго-нибудь одного изъ родителей (напр., самки), а другая птица могла со- отвѣтствующимъ инстинктомъ не обладать?

На весеннемъ пролетѣ камышница встрѣчается на Волгѣ: мнѣ извѣстенъ экземпляръ изъ-подъ Бармина.

Экземпляры коллекціи:

- 1, 2, 3 и 4) 6.VI.911 3 ♀♀ и ♂ pull. Озеро Широкое по теченію р. Сережи, Арзамасскаго уѣзда.
 - 5 и 6) 7.VII.911 ♂ ad. и ♂ pull. (убиты имѣствъ). Р. Сережа у оз. Широкаго, Арзамасскаго у.
 - 7) 8.VII.911 ♂ juv. Оз. Паровое по теч. р. Сережи, Арзамасск. у.
 - 8) 19.VII.911 ♂ juv. Оз. Широкое, Арзамасск. у.
- Примѣч.: у пуховыхъ половые органы совершенно ясно выражены.

53. *Crex crex* (L.).

Crex pratensis, Bechst. Мензбиръ (5), стр. 461.

Очень обыкновенная птица.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 24.V.909 ♂ Марына Роща близъ П.-Новгорода.
- 2) 16.V.911 ♂ Кемля, Лукояновскаво у.

54. *Porzana bailloni* (Vieill.).

Porzana bailloni, Vieill. Мензбиръ (5), стр. 469.

Добыта въ Нижегородской губ. Н. А. Покровскимъ.

55. *Porzana porzana* (L.).

Porzana maruetta, Leach. Мензбиръ (5), стр. 471.

Мѣстное названіе: *водяная курочка*.

Водяная курочка очень обыкновенна по болотистымъ лугамъ. Прилетаетъ въ концѣ апрѣля. Это далеко не пугливая птичка. Пробираясь въ тальникахъ, нерѣдко можно наблюдать, какъ она не спѣша уходитъ изъ-подъ ногъ. Если въ это время встать неподвижно, то курочка иногда спокойно бродитъ въ 2-3 шагахъ, поклеывая и издавая мелодичные звуки.

Экземпляръ коллекціи:

26.V.911 ♂ ad. Пойма Калми, Лукояновскаго уѣзда.

56. *Rallus aquaticus* (L.).

Rallus aquaticus, Briss. Мензбиръ (5), стр. 474.

Пастушокъ былъ добытъ въ моемъ присутствіи въ апрѣлѣ 1908 г. на р. Кудьмѣ въ Нижегородскомъ уѣздѣ.

Gallinae.

57. *Tetrastes bonasia septentrionalis* (Seebohm).

Bonasa canescens, Sparrm. Мензбиръ (5), стр. 480.

Рябчикъ гнѣздится во всей сѣверной половинѣ и въ большихъ лѣсахъ южной половины Нижегородск. губ. Кладки яицъ (8—10) бывали находимы до 21.V.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 12.VIII.910 ♀ ad. Хахалы, Семеновскаго у.
- 2) 18.VIII.910 ♂ ad. ibidem.
- 3) 20.VIII.910 ♂ ad. ibidem.
- 4) 29.VII.911 ♀ juv. Пойма Алатыря у границы съ Симбирск. губ.
- 5) 31.VII.911 ♂ juv. ibidem.

58. *Lyrurus tetrix viridanus* (Lorenz).

Тетерева гнѣздятся по всей губ., особенно же въ сѣверной части. Токованіе до 18.V. Кладки яицъ отъ 7 до 9 штукъ находятъ не позднеѣ 14.V. Молодыхъ летающихъ наблюдать въ концѣ мая.

Два экземпляра самцовъ изъ сѣверной части Нижегородск. губ. я сравнивалъ съ серіей тетеревовъ изъ разныхъ мѣствъ Россіи, принад-

лежащей проф. П. П. Сушкину. Тетерева Смоленской и Московской губ. хорошо отличаются от тетеревовъ изъ-подъ Минусинска между прочимъ сине-фиолетовымъ металлич. отливомъ шеи, спины и надхвостья, тогда какъ у послѣднихъ этотъ отливъ сине-зеленый. Уфимскіе и нижегородскіе тетерева, не отличимые между собою, по отливу занимаютъ промежуточное мѣсто между этими крайними формами. Нѣкоторыя обстоятельства заставляютъ считать возможнымъ, что цвѣтной отливъ оперенія тетеревей нѣсколько измѣняется на шкуркахъ съ теченіемъ времени. Уфимскіе и московскіе тетерева коллекціи П. П. Сушкина далеко не могутъ быть названы свѣжими. Поэтому я не могу настаивать на томъ, что результаты сравненія въ данномъ случаѣ безусловно соответствуютъ истинному положенію вещей. Что касается другого признака, отличающаго западныхъ тетеревей отъ восточныхъ— ширины бѣлой поперечной полосы на крылѣ, то по этому признаку нижегородскіе тетерева должны быть отнесены къ подвиду *viridanus*.

Экземпляры коллекціи.

- 1) 23.IV.911 ♂, Жуковский затонъ, Макарьевского у.
- 2) 1.V.911 ♂, Рѣчка Лукьяниха, Макарьевского у.

На Нижегородскій рынокъ совсѣмъ не рѣдко попадаютъ гибриды и различные выродки тетеревиныхъ. Безъ особаго труда я собралъ здѣсь за 4 святочныхъ капикулярныхъ промежутка до 10 гибридовъ и aberrаций, и, кромѣ того, видѣлъ еще экземпляровъ пять, не попавшихъ въ мою коллекцію. Изъ уродствъ чаще встрѣчаются альбинизмъ и пѣтухоперость. Большинство гибридовъ—межняки. Однажды попалась помѣсь тетерева съ рябчикомъ и однажды помѣсь тетерева съ бѣлой куропаткой.

59. *Tetrao urogallus volgensis* (Buturl).

Tetrao urogallus volgensis Buturl. Ornitholog. Monatsber. 1907.

Глухари гнѣздятся во всей сѣверной половинѣ губернии, въ южной же только въ большихъ и глухихъ лѣсахъ Арзамасскаго, Ардатоваго и Лукояновскаго уѣздовъ. Глухари средняго Поволжья описаны С. А. Бутурлинымъ (Ornitholog. Monatsber. 1907) подъ назв. *Tetrao urogallus volgensis* въ качествѣ особаго подвида. Въ этомъ описаніи, а также въ трудѣ *Материалы по птицамъ Енисейской губ. А. Я. Туруриновъ и С. А. Бутурлинъ. 1911*, авторъ указываетъ рядъ от-

личій этой формы отъ другихъ подвиговъ глухарей. Для ознакомленія съ этимъ вопросомъ проф. П. П. Сушкинымъ и мною была просмотрѣна серія глухарей коллекціи П. П. Сушкина; кромѣ нихъ, былъ экземп. *T. u. volgensis* изъ Симбирской губ., любезно присланный намъ С. А. Бутурлинымъ. Въ общемъ оказалось 15 экзempl. самцовъ изъ слѣдующихъ мѣстностей: изъ Смоленской губ., Симбирской, Нижегородской, Уфимской, Тобольской и Енисейской. Въ результатъ приходится констатировать слѣдующее: ни одинъ изъ указанныхъ С. А. Бутурлинымъ признаковъ, отличающихъ *T. u. volgensis* (Buturl.) отъ *T. u. taczanowskii* (Stejn.) не является постояннымъ. Если признать, что присланный С. А. Бутурлинымъ экземпляръ достаточно типиченъ, то общая окраска *T. u. volgensis* очень немного посвѣтлѣе, чѣмъ у большинства *T. u. taczanowskii*, тогда какъ въ „Материал. по птиц. Енис. губ.“ С. А. Бутурлинъ пишетъ, что сибирскія птицы „пожалуй, чуть посвѣтлѣе“. Окраска вишнихъ опахалъ первостепенныхъ маховыхъ настолько варьируетъ, что на этотъ признакъ нельзя положиться. Точно такъ же весьма сильно варьируетъ ширина рулевыхъ. Ноги у *T. u. taczanowskii* какъ будто сильнѣе оперены, но распространеніе корней перьевъ у всѣхъ глухарей одинаково. Различіе въ клювахъ, пожалуй, есть только между смоленскими и уфимскими, что же касается нижегородскихъ и сибирскихъ, то тутъ, если и есть какая-нибудь разница, то до такой степени ничтожная, что для того, чтобы что-нибудь говорить опредѣленно, нужно тщательно измѣрить много десятковъ клювовъ. Изъ Нижегородской губ. я имѣю трехъ самцовъ, кромѣ того мной просмотрѣно нѣсколько экземпляровъ изъ колл. Нижегородскаго Земскаго Музея и на Нижегородскомъ рынкѣ. Вообще нельзя сомнѣваться, что большинство нижегородскихъ глухарей весьма сходны, повидимому, даже не отличимы отъ *T. u. taczanowskii*. Просмотръ вышеупомянутой серіи не оставляетъ также сомнѣній (для меня по крайней мѣрѣ) въ томъ, что *T. u. volgensis* (Buturl.) есть лишь среднее звено постепенной цѣпи переходовъ отъ типичнаго глухаря къ уральскому. Однако переходная область настолько велика, что обозначить центрального глухаря особымъ наименованіемъ имѣетъ извѣстный практическій смысл¹⁾.

¹⁾ Заключение автора является довольно неожиданнымъ: цускай сибирскій глухарь является переходной формой отъ типичнаго къ уральскому, тѣмъ не менѣе, если онъ, говоря словами автора, весьма сходенъ и даже не отличимъ отъ сибирскаго *T. u. taczanowskii*, его и надо называть послѣднимъ именемъ. Редакт.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 2.V.911, ♂ ad. Оз. Язы, Макарьевского у.
- 2) 7.IX.911 ♀ (aberr.) Заволжье.
- 3 и 4) 2 самца. Перв. полов. апрѣля 1913 г. Заволжье.

60. *Lagopus lagopus* (L.).

Lagopus albus, Gm. Меназбирь (5), стр. 512.

Бѣлая куропатка гнѣздится въ сѣверной таежной половинѣ Нижегород. губ. и здѣсь вообще не рѣдка. Иногда залетаетъ на правый берегъ Волги, но здѣсь не гнѣздится. Повидимому не гнѣздится въ Арзамасскомъ уѣздѣ и безусловно въ Лукояновскомъ, но относительно Ардатовскаго и Горбатовскаго уѣздовъ я, къ сожалѣнію, ничего не могу сказать. Въ Темниковскомъ уѣздѣ, Тамбовской губ., граничащемъ съ Ардатовскимъ, бѣлыя куропатки, какъ говорятъ, въ незначительномъ количествѣ гнѣздятся. Излюбленнымъ мѣстопребываніемъ бѣлой куропатки являются моховыя болота, поросшія сѣверными ягодами. Пуховыхъ, плохо летающихъ мнѣ приходилось видѣть 25.V.

Экземпляръ коллекцій:

15—20.III.911 ♀. Дер. Анненка на Ветлугѣ.

61. *Perdix perdix* (L.).

Perdix cinerea, Briss. Меназбирь. (5), стр. 527.

Спорадично гнѣздящаяся птица Нижегородской губерніи. Зимуетъ.

62. *Coturnix coturnix* (L.).

Coturnix communis, Bonnat. Меназбирь. (5), стр. 522.

Очень обыкновенная птица. Въ сѣверномъ районѣ занятъ лѣсомъ перепелъ естественно рѣже, чѣмъ въ южной половинѣ губерніи.

Экземпляръ коллекцій:

24.V.911 ♂. Пойма Кални въ Лукояновскомъ уѣздѣ.

Pterocletes.

63. *Syrnhartes paradoxa* (Pall.).

Syrnhartes paradoxus, Pall. Меназбирь. (5), стр. 555.

Достоверно мнѣ извѣстенъ только одинъ послѣдній залетъ копытокъ въ предѣлы Нижегородской губ.—въ 1908 г. Время появленія

первыхъ стай относится вѣроятно къ серединѣ апрѣля: въ нижегородскомъ земскомъ музеѣ имѣется экземпляръ ♀, добытый подѣ Семеновомъ 17.IV. Держались саджи стайками по нѣскольку десятковъ штукъ. Летѣли повидимому очень быстро, потому что разбившихся о различныя препятствія, преимущественно о телеграфныя столбы и проволоки, находили совѣтъ нерѣдко. Мнѣ достоверно извѣстно, что копытки были добываемы въ Лукояновскомъ, Сергачскомъ, Арзамасскомъ, Семеновскомъ, Макарьевскомъ и Нижегородскомъ уѣздахъ. На Нижегородскій рынокъ въ эту весну поступило изъ разныхъ уѣздовъ нѣсколько сотъ саджей.

Нѣкто А. П. Бударинъ пишетъ изъ Лукояновскаго уѣзда, что онъ убилъ одну саджу въ 1910 г. изъ стайки въ 10 штукъ, которая держалась около недѣли, появившись между 20—25 апрѣля ¹⁾.

Экземпляръ коллекцій:

Весна 1908 г. ♂ Дер. Протопопова близъ Арзамаса.

Columbae.

64. *Turtur turtur* (L.).

Turtur auritus, Gray. Меназбирь. (5), стр. 562.

Горлица очень обыкновенна въ Нижегородской губ. Она избѣгаетъ очень большихъ боровъ сѣверныхъ уѣздовъ, въ центрѣ которыхъ ее можно встрѣтить только какъ рѣдкость. Прилетаетъ въ послѣднихъ числахъ апрѣля. Вѣроятно нѣкоторыя пары горлицъ успѣваютъ вывести два раза въ лѣто: мнѣ однажды пришлось убить молодую горлицу съ остатками гнѣздового пуха на перьяхъ 29.VIII.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 8.VI.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 8.VI.909 ♀ ad. Ibidem.
- 3) 17.V.911 ♂ Кемля, Лукояновскаго уѣзда.
- 4) 17.V.911 ♂ Ibidem.

65. *Columba livia domestica* (Bohd.).

Columba livia, Briss. Меназбирь. (5), стр. 577.

Гнѣздится во множествѣ. Часто находилъ я гнѣзда голубей довольно далеко—до 5 верстъ отъ жилья человѣка; въ лѣсу, или на

¹⁾ Въ № 1 „Орнитологическаго Вѣстника“, за 1911 г. Карамзинъ сообщаетъ о залетѣ саджей въ 1910 году въ Самарск. губ.

большой полянѣ, но гнѣзда всегда устраивались на постройкѣ, хотя бы то былъ полуразрушенный сарай или небольшой мостикъ черезъ ручей. Дикихъ сизяковъ не находилъ.

66. *Columba oenas* (L.).

Columba oenas, Briss. Менабирь. (5), стр. 582.

Клинтухъ встрѣчается здѣсь рѣже, чѣмъ горлица. Колонія клинтуховъ я находилъ по дубово-осокоревымъ лѣсамъ Волжской поймы, смѣшаннымъ лѣсамъ Макарьевского уѣзда и въ смѣшанныхъ же лѣсахъ по Серезѣ и Алатырю. Я употребилъ слово „колонія“ по той причинѣ, что клинтухи, какъ я наблюдаю, не гнѣздятся отдельными парами, какъ горлица и вахирь, но всегда по нѣскольку паръ вмѣстѣ.

Пролетныхъ клинтуховъ я наблюдаю еще 8.IV, а 21.IV эти птицы еще держались стайками.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 21.IV.911 ♂ Островъ противъ Безводнаго на Волгѣ.
- 2) 21.IV.911 ♀ ibidem.
- 3) 25.V.911 ♂ Лѣсъ по лѣв. бер. Алатыря, Лукояновск. у.

67. *Columba palumbus* (L.).

Columba palumbus, L. Менабирь. (5), стр. 587.

Гнѣздится по всей губ., но спорадично и въ небольшомъ количествѣ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) Конецъ VII.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородск. у.
- 2) 24.VII.911 ♂ juv. Алатырь въ Лукояновскомъ у.
- 3) 1.VII.911 ♂ ad. ibidem.
- 4) 17.VIII.911 ♂ juv. Жуковский заводъ на Волгѣ.

Lamellirostres.

68. *Mergus albellus* (L.).

Mergus albellus, L. Менабирь. (5), стр. 595.

Лутокъ бываетъ на пролетѣ и въ это время очень обыкновененъ.

Экземпляръ коллекціи:

- 14.IV. 910 ♂ Кантаурово, Семеновскаго уѣзда.

69. *Mergus serrator* (L.).

Mergus serrator L. Менабирь. (5), стр. 601.

Мѣстныя названія: *крѣкъ*, *стрележь*.

У меня имѣются только экземпляры добытыя весной на пролетѣ, но Н. А. Покровский убилъ этого крохала однажды осенью. На Волгѣ весной не рѣдокъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 15.IV.910 ♀ Городецъ, на Волгѣ, Балахнинскаго у.
- 2) 20.IV.910 ♂ Красная Рамень, Семеновскаго у.

70. *Mergus merganser* (L.).

Mergus merganser, L. Менабирь. (5), стр. 604.

Этотъ крохаль бываетъ на пролетѣ на Волгѣ. Не знаю, насколько регулярно. Рѣже, чѣмъ 2 предыдущіе вида крохалей. На рынкѣ въ Н.-Новгородѣ я видѣлъ въ 1910 г. одинъ экземп. самки этого вида. Кромѣ того, лѣсничій В. А. Селивановъ любезно сообщилъ мнѣ, что ♂ *M. merganser* былъ убитъ на Керженцѣ недалеко отъ устья.

71. *Oidemia nigra* (L.).

Fuligula nigra, Briss. Менабирь. (5), стр. 625.

Въ естественно-историч. музеѣ нижегородскаго земства имѣется экземпляръ *O. nigra*, о которомъ достоверно извѣстно, что онъ добытъ въ 1902 г. въ окрестн. г. Горбатова на Окѣ.

72. *Oidemia fusca* (L.).

Fuligula fusca, L. Менабирь. (5), стр. 628.

Турпанъ наблюдался мной на Волгѣ въ концѣ апрѣля 1911 г. около с. Юркина, Макарьевского уѣзда. 16.VII.911 на Сурѣ въ Васильскомъ уѣздѣ Н. А. Покровскимъ былъ убитъ большой нырокъ этого вида. Этотъ экз.—старый ♂.

73. *Harelda glacialis* (L.).

Fuligula glacialis, L. Менабирь. (5), стр. 633.

Морянка бываетъ у насъ на пролетѣ весной и осенью, но судя по незначительному количеству ея на рынкахъ, очевидно въ небольшомъ числѣ. Осенью въ центральныхъ губерніяхъ она бываетъ ежегодно.

Появляется поздно. Весной же морянка попадает очень рѣдко. Я имѣю экземпляръ добытый на Волгѣ 12.V.911. Эта птица была несомнѣнно больна.

Экземпляръ коллекціи:

12.V.911 ♂ Лѣвый берегъ Волги у с. Толоконцева, Балахнинскаго у.

74. *Clangula clangula* (L.).

Fuligula clangula, L. Мензбирь. (5), стр. 641.

Гоголь—одинъ изъ самыхъ многочисленныхъ пролетныхъ нырковъ, какъ весной, такъ и осенью. Гнѣздится на лѣсныхъ озерахъ по Керженцу и Ветлугѣ и здѣсь довольно обыкновененъ. Вѣроятно гнѣздится и въ другихъ мѣстахъ сѣверной части Нижегородской губ., но объ этомъ мнѣ не удалось получить достовѣрныхъ свѣдѣній; на упомянутыхъ же рѣкахъ я самъ видѣлъ довольно часто гоголей въ маѣ и юніѣ 1910 г. Гнѣздится ли гоголь къ югу отъ Волги, я не знаю. Повидимому, не гнѣздится.

75. *Fuligula nyroca* (Güld.).

Fuligula nyroca, Güld. Мензбирь. (5), стр. 646.

Бѣлоглазый нырокъ былъ убитъ 21.IV.911 на рѣкѣ Ватомѣ на лѣвомъ берегу Волги въ Семеновскомъ уѣздѣ. На рѣкѣ въ Н.-Новгородѣ обыкновенно не попадается.

Экземпляръ коллекціи:

21.IV.911 ♂ Р. Ватома, Семеновскаго уѣзда.

76. *Netta rufina* (Pall.).

Fuligula rufina, Pall. Мензбирь. (5), стр. 649.

Netta rufina, Pall. Поляковъ. (12), стр. 171.

Г. И. Поляковъ (l. c.) сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующее: „Ф. К. Лоренцъ говорилъ мнѣ о поступленіи 6 экзempl. *Netta rufina* въ концѣ октября или началѣ ноября 1887 г. на московскій рынокъ (Охотный рядъ) изъ-подъ Н.-Новгорода“.

На основаніи этого сообщенія причисляю *F. rufina*, Pall. къ случайно залетнымъ птицамъ Нижегородской губерніи.

77. *Fuligula fuligula* (L.).

Fuligula cristata, Leach. Мензбирь. (5), стр. 652.

F. fuligula гнѣздится въ сѣверныхъ уѣздахъ Нижегородской губерніи, о чемъ я знаю не только по рассказамъ охотниковъ, но и

по собственнымъ наблюденіямъ. Что касается южныхъ уѣздовъ, то достовѣрныхъ свѣдѣній о гнѣздованіи здѣсь хохлатой чернети не имѣется. На пролетѣ это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и многочисленныхъ нырковыхъ утокъ.

Экземпляръ коллекціи:

15.IV.911 ♀ Р. Ватома въ Семеновскомъ уѣздѣ.

78. *Marila marila* (L.).

Fuligula marila, L. Мензбирь. (5), стр. 657.

Этотъ нырокъ бываетъ въ Нижегородской губ. на пролетѣ. Осенью морская чернеть была убиваема очень поздно, когда озера уже почти нацѣло покрылись льдомъ, оставались только небольшія полыньи. Весной морская чернеть была убиваема сравнительно поздно. У меня имѣется экземпляръ, добытый 5.V. Я препарировалъ его самъ и думаю, что онъ былъ совершенно здоровъ.

Экземпляръ коллекціи:

5.V.911 ♂ Р. Ватома, Семеновскаго уѣзда.

79. *Aythya ferina* (L.).

Fuligula ferina, L. Мензбирь (5), стр. 660.

Мензбирь (l. c.) считаетъ красноглазого нырка распространеннымъ въ южной и средней Россіи и проводитъ сѣверную границу области его распространенія въ Петроградской губ. черезъ южную оконечность Ладожскаго озера, далѣе на востокъ черезъ Вологодскую и Пермскую на сѣвернѣе Тагила. Обращаясь къ другимъ авторамъ, мы видимъ слѣдующее. Рузскій (4) нашелъ красноглазого нырка обыкновеннымъ въ долинахъ Волги, Камы, Вятки, Суры и Ветлуги. Житковъ и Бутурлинъ (10) также нашли его очень обыкновеннымъ гнѣздящимся ныркомъ въ долинахъ Волги, Свѣяги, Суры и Барыша и рѣдкимъ гнѣздящимся на Алатырѣ. Поляковымъ (11) найденъ обыкновеннымъ гнѣздящимся видомъ въ предѣлахъ Московской губерніи. Такимъ образомъ можно ожидать, что красноглазый нырокъ гнѣздится и въ Нижегородской губерніи, по крайней мѣрѣ въ долинахъ главнѣйшихъ рѣкъ. Мною онъ найденъ только на пролетѣ на Волгѣ весной. Въ это время онъ здѣсь довольно обыкновененъ, но встрѣчается все-таки значительно рѣже, чѣмъ *F. fuligula* и *Clangula clangula*.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 15.IV.911 ♂ } Р. Ватома на лѣв. бер. Волги, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 15.IV.911 ♂ }

80. *Anas boschas* (L.).

Anas boschas, L. Меназбиръ (5), стр. 681.

Самая обыкновенная утка, въ численности уступающая только *N. crecca*. Молодыхъ утятъ, довольно крупныхъ, но еще не летныхъ мнѣ случилось находить съ 11. VI до первыхъ чиселъ августа.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 15.V.910 ♀ Оз. Черное на гран. Семеновск. и Макара. у.
- 2) 19.V.911 ♀ Пойма Калши, Лукояновскаго у.
- 3) 4.VII.911 ♀ Старая Пустынь, Арзамаскаго у.
- 4) 5.VII.911 ♀ *ibidem*.

81. *Spatula clypeata* (L.).

Anas clypeata, Briss. Меназбиръ (5), стр. 665.

Мѣстное названіе: *плутень*.

Широконоска на гнѣздовьяхъ мной не найдена, но она, вѣроятно, гнѣздится у насъ изрѣдка, судя по рассказамъ охотниковъ. Во всякомъ случаѣ достоверно это не извѣстно. На пролетѣ бываетъ рѣже другихъ утокъ (не нырковъ).

Экземпляръ коллекцій:

- 15.IV.911 ♂ Ватома на лѣв. бер. Волги, Семеновскаго у.

82. *Querquedula circia* (L.).

Anas circia, L. Меназбиръ (5), стр. 668.

Эта утка очень обыкновенна на гнѣздовьяхъ, но въ сѣверной половинѣ губерніи встрѣчается значительно рѣже, чѣмъ *A. crecca*.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 23.VI.909 ♀ Кудьма въ Нижегородскомъ у.
- 2) 4.VI.911 ♀ Р. Сережа, Арзамаскаго у.
- 3) 16.VII.911 ♀ Оз. Широкое въ Арзамаскомъ у.

83. *Nettion crecca* (L.).

Anas crecca, L. Меназбиръ (5), стр. 671.

Самая многочисленная утка въ Нижегородской губерніи, особенно въ сѣверной ея части.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 3.VI.910 ♀ Нестіаръ, Макарьевскаго уѣзда.
- 2) 5.VII.911 ♂ juv. Оз. Паровое на Сережѣ, Арзамаск. у.
- 3) 8.VII.911 ♂ juv. Р. Сережа, Арзамаскаго уѣзда.
- 4) 10.VII.911 ♀ Оз. Широкое на Сережѣ въ Арзамаск. у.

84. *Chaulelasmus strepera* (Linn.).

Anas strepera, L. Меназбиръ (5), стр. 677.

О гнѣздованіи этой утки въ Нижегородской губ. я ничего не знаю. Весной на пролетѣ очень рѣдка. Въ Симбирской губ. найдена не рѣдкою на гнѣздовьяхъ въ долинахъ Суры и Варыши¹⁾.

Экземпляръ коллекцій:

- 20.V.911 ♂ Лѣв. берегъ Волги противъ Сормова.

85. *Dafila acuta* (L.).

Anas acuta, L. Меназбиръ (5), стр. 690.

Мѣстн. назв.: *шильневал*, *шильневка*.

Шилохвость гнѣздится и не рѣдка у насъ. Я находилъ ее на гнѣздовьяхъ въ Макарьевскомъ, Нижегородскомъ, Арзамаскомъ и Лукояновскомъ уѣздахъ. Полагаю поэтому, что она гнѣздится по всей губерніи довольно равномерно. Рѣже криквы и чирковъ. Прилетаетъ подобно чиркамъ и криковымъ въ концѣ марта.

86. *Marca penelope* (L.).

Anas penelope, L. Меназбиръ (5), стр. 693.

Едва ли „свѣяга“, какъ зовется въ Нижегородской губ. эта утка, гнѣздится здѣсь сколько-нибудь правильно. По крайней мѣрѣ мнѣ не удалось собрать о ея гнѣздованіи достоверныхъ свѣдѣній. На пролетѣ весной бываетъ, но рѣже широконоски и шильневки. Осенью свѣяга появляется на Волгѣ со второй половины августа, иногда значительными стайками.

¹⁾ Житковъ и Бутурлинъ (10).

главѣ съ Алфераки, опираясь отчасти на теперь уже опровергнутое сообщеніе Пирсона о гнѣздовѣ этой казарки въ Лапландіи, склонны думать, что появленіе ея по крайней мѣрѣ въ южной Россіи имѣетъ даже нормальный характеръ. Г. И. Поляковъ, разсматривая случаи залетовъ *R. ruficollis*, пробуетъ даже намѣтить пролетный путь этой птицы: „долиною средней Волги (г. Н.-Новгородъ, губ. Казанская, Сарепта), а затѣмъ—долиною Дона (окрестности г. Новочеркаска, Ростова н./Д., Таганрога) къ Черному морю“. Если залеты *R. ruficollis* дѣйствительно не случайны, то Нижегородская губернія, гдѣ перекрещиваются нѣсколько пролетныхъ путей, должна бы особенно часто посѣщаться этой казаркой, однако до сихъ поръ извѣстны только слѣдующіе случаи. Г. И. Поляковъ (l. c.) сообщаетъ: „мнѣ извѣстно отъ Ф. К. Лоренца о двухъ случаяхъ полученія краснозобой казарки изъ-подъ Н.-Новгорода: 10 экземпляровъ—въ ноябрѣ 1878 года и одного экземпляра—въ 1898 году, тоже позднюю осенью“. Мнѣ и Н. А. Покровскому до самаго послѣдняго времени не удавалось собрать какихъ бы то ни было свѣдѣній о краснозобой казаркѣ. Всѣ опрошенные нами охотники, какъ любители, такъ и профессионалы, торговцы дичью и коллекторы ничего не могли сообщить намъ объ этой выдающейся по красотѣ, завидной птицѣ. Наконецъ, недавно узналъ я, что у лѣсничаго Каменскаго лѣсничества г. Томановскаго имѣется экземпляръ краснозобой казарки, добытый на Волгѣ близъ с. Каменки, Макарьевского у. Изъ письма, любезно присланнаго мнѣ г. Томановскимъ (къ сожалѣнію, я не имѣю сейчасъ передъ глазами этого письма), выясняются слѣдующія подробности: данная птица, принадлежащая дѣйствительно къ виду *R. ruficollis*, убита нѣсколько лѣтъ назадъ (помнится, въ 1908 г.) въ серединѣ осени; это была одиночка, подлетѣвшая къ домашнимъ гусямъ. На основаніи всѣхъ изложенныхъ выше соображеній я не могу считать краснозобую казарку сколько-нибудь правильно пролетающей черезъ Нижегородскую губернію.

89. *Anser albifrons* (Scop.).

Anser albifrons, Scop. Мензбиръ (5), стр. 744.

Этотъ видъ казарки встрѣчается въ Нижегородской губ. только на пролетѣ. Попадаетъ на рынокъ, но рѣже, чѣмъ гуменники. Начало пролета совпадаетъ со вскрытіемъ рѣкъ, конецъ же—въ первыхъ числахъ мая: 4.V.911 г. я видѣлъ одиночку на Волгѣ на разстояніи

ружейнаго выстрѣла отъ себя; судя по бѣлому пятну у основанія клюва, не заходящему далеко на лобъ, это была именно *A. albifrons* Scop.

90. *Melanonyx segetum segetum* (Gm.).

Anser segetum, Gm. Мензбиръ (5), стр. 741.

Melanonyx segetum, Gmell. Алфераки 8, стр. 104.

Гуменникъ довольно обыкновененъ на пролетѣ весной. Время пролета весной совпадаетъ съ указаннымъ выше для *A. albifrons*.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 21.IV.911 ♂ Р. Ватома при впаденіи въ Волгу.
- 2) 1.V.911 ♂ } Лѣвый берегъ Волги противъ с. Великій Врагъ,
- 3) 1.V.911 ♂ } Нижегород. у.

Anser anser (L.).

Anser cinereus, Meyer. Мензбиръ (5), стр. 748.

Anser anser, L. Поляковъ (12), стр. 100.

Anser anser, Lin. Алфераки (8), стр. 23.

Не только о гнѣздованіи, но и о пролетѣ этого гуся въ предѣлахъ Нижегородской губ. мнѣ не извѣстно пока. Не попался онъ мнѣ на рынокъ и въ Москвѣ, гдѣ другіе дикіе гуси рѣшительно не составляютъ рѣдкости. Такъ какъ разработка лѣсовъ и болотъ не можетъ не вліять на измѣненіе границъ гнѣздовой области сѣраго гуся, то на показанія прежнихъ авторовъ, писавшихъ о характерѣ распространенія его въ центральныхъ губ. Евр. Россіи, не приходится опираться. Въ позднѣйшей же литературѣ наибольшаго вниманія заслуживаютъ лишь наблюденія Б. М. Житкова и С. А. Бутурлина (10) надъ гнѣздованіемъ сѣраго гуся при устьѣ Барыша въ Симбирской губ. Г. И. Поляковъ (l. c.) считаетъ *A. anser* довольно обыкновеннымъ, періодически дважды пролетнымъ и, вѣроятно, не ежегодно въ небольшомъ числѣ гнѣздящимся въ Московск. губ. видомъ, но непосредственныхъ наблюденій уважаемый авторъ не имѣетъ, приводя въ доказательство гнѣздованія этого гуся сообщеніе о появленіи 26.VII.090 г. близъ с. Милеть, Богородскаго у., пяти гусей, которые „далеко не допустили къ себѣ охотника“. Отсутствіе наблюденій надъ пролетомъ сѣраго гуся въ Московской губ., по мнѣнію С. Н. Алфераки (l. c.), вѣроятно, объясняется тѣмъ, что этотъ гусь не присаживается тамъ на отдыхъ. Это предположеніе (замѣчу: мало вѣ-

ропное — вѣдь присаживаются же тамъ другіе гуси) отпадаетъ по отношенію къ Нижегородской губ., гдѣ, какъ мнѣ извѣстно, гуси не только присаживаются, но, какъ это бываетъ на Волгѣ, задерживаются повидному, на несколько дней. Въ Костромской губ. В. Д. Кирпичниковъ А. ансет не нашелъ. На основаніи сказаннаго нека воздерживалось отъ внесенія этого гуса въ списокъ Нижегородскихъ птицъ, хотя бы и въ качестве пролетнаго.

Herodiones.

91. *Cieonia nigra* (L.).

Cieonia nigra, L. Менабиръ (5), стр. 777.

Черный ансетъ принадлежитъ къ числу очень рѣдкихъ, повидному, гнѣздящихся птицъ описываемой губерніи. Въ 1911 г. я неоднократно наблюдалъ эту птицу въ половинѣ мая и въ юнѣ въ поймахъ Алатыря и Кашпи въ районѣ: Кемля—Н. Мичалки—Козулескій казен. боронь. Меня убѣдили тамъ, что однажды въ гнѣзняхъ бологахъ по берегу Алатыря было найдено гнѣздо этого анста съ птенцомъ. Въ Магарьевскомъ уѣздѣ на Березницѣ близъ дер. Красный Дришка молодой черный ансетъ былъ убитъ Ф. Ф. Еше въ концѣ дѣтя (не позднѣе половинны августъ). Въ первой половинѣ августа 1910 г. я выдѣлъ эту птицу близъ Хахалъ, Семеновскаго уѣзда. На весеннемъ пролетѣ чернато анста убитъ однажды Н. А. Новиковскій подл. Н.-Новгородомъ (чучело сохранился).

92. *Botaurus stellaris* (L.).

Botaurus stellaris, L. Менабиръ. (5), стр. 781.

Мѣстная названіи: *эмля*, *букамо*.

Выпь очень обыкновенная птица въ долинахъ Волги и южнѣе по вѣсьмъ сколько-нибудь значительнымъ поймамъ и болотамъ: по Серекѣ, Кудамѣ, Имзѣ, Алатырю и т. д. Сѣвернѣе дѣлаго берега Волги, по имѣющимся у меня даннымъ, не идетъ. На Ветлугѣ (выше устья) вырочемъ бываетъ случайно, обыкновенно же здѣсь не гнѣздится. Брачный крикъ слышенъ уже въ первыхъ числахъ апрѣля.

93. *Ardeia minuta* (L.).

Ardeia minuta, L. Менабиръ. (5), стр. 786.

Малая выпь очень обыкновенна въ поймахъ Волги и на рѣдкахъ южнѣе, но сѣвернѣе, какъ кажется, совсѣмъ не бываетъ.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 19.VIII.911 ♀ ад. Жуковскій заголъ, Магарьевск. у.
- 2) 27.VIII.911 ♂ juv. ibidem.

94. *Ardea cinerea* (Briss.).

Ardea cinerea, Briss. Менабиръ. (5), стр. 811.

Сѣрая цапля гнѣздится и очень обыкновенна по Волгѣ и Ока. Рѣдко, но также гнѣздится по Березицу. На Ветлугѣ обыкновенна. Но на озерахъ, лежащихъ между Керженемъ и Ветлугой я ее не нашелъ. На Серекѣ обыкновенна. По Алатырю гнѣздится, но рѣдка. Весенній пролетъ длится весь апрѣль.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 25.VIII.910 ♀ juv. Окрест. о. Боръ, Соколовск. у.
- 2) 8.VIII.911 juv. Собинскій заводъ на Волгѣ.
- 3) Весна 1912 г., ad, музеевъ на Нижегородск. рынкѣ.

Raptors.

95. *Randion haliaëtus* (L.).

Randion haliaëtus, L. Менабиръ. (5), стр. 5.

Скопа принадлежитъ къ числу рѣдкихъ, правильно гнѣздящихся птицъ Нижегородской губерніи. Она гнѣздится въ долинахъ Волги и (юг. Сѣвернѣе Волги несомнѣнно гнѣздится по Керженцу и Ветлугѣ и на этихъ рѣкахъ, особенно на послѣдней, она можетъ быть названа обыкновенной. Рѣже гнѣздится по болышимъ глухимъ озерамъ Магарьевскаго уѣзда. Въ южной половинѣ Нижегородской губерніи ея гнѣздовые констатировано для озера по Серекѣ. Здѣсь я встрѣчалъ скопы въ юнѣ и июль очень часто. Что касается Аруатовскаго уѣзда, то гнѣздование здѣсь скопы представляется очень вѣроятнымъ для Ветлужинскаго и Выксунскаго прумовъ. На Алатырѣ скопа была мною наблюдаема начиная съ 22.VII, иногда парами. Возможно, что она здѣсь гнѣздится. По даннымъ литературы скопа гнѣздится во вѣсьмъ смежныхъ губерніяхъ, но всюду она рѣдка и только въ Костромской губ. встрѣчаются мѣста, изобилующія этими птицами. На пролетѣ очень обыкновенна на Ока и Волгѣ. Весенній пролетъ продолжается до половинны апрѣля. Такъ 18.IV.911 на Волгѣ противъ Косова можно было видѣть пару скопы высоко летѣвшихъ на NNW.

Экземпляръ коллекціи:

22.VIII.911 ♀ juv. Жуковский затонъ на Волгѣ.

96. *Tinnunculus tinnunculus* (L.).

Tinnunculus alaudaris, Briss. Мензбиръ. (5), стр. 11.

Пустельга—самый обыкновенный соколъ на всемъ протяженіи Нижегородской губерніи. Біологія этой птицы хорошо известна, но не могу не отмѣтить здѣсь одного случая, характеризующаго глупость этой птицы. Мы съ препараторомъ подѣхали однажды на лодкѣ шаговъ на 30 къ двумъ соколамъ, ♂ и ♀, сидящимъ на деревѣ сажень на 5 другъ отъ друга. Я выстрѣломъ изъ ружья убилъ самца, но самка не обратила на это никакого вниманія: продолжала поклевать какую-то добычу, отряхивала перья и т. п. Когда мы сошли на берегъ и искали убитую птицу шагахъ въ 20 отъ сидящей на деревѣ, эта послѣдняя только перестала клевать, но улетать не собралась.

Экземпляръ коллекціи:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1) 27. VI. 909 ♀ ad. | Фроловское, Нижегородскаго уѣзда. |
| 2) 27. VII. 909 ♀ juv. | ibidem. |
| 3) 4. VIII. 909 ♂ juv. | Дер. Новосвятителяво, Нижегородск. у. |
| 4) 5. VI. 910 ♂ ad. | Дер. Рогово, Макарьевского у. |
| 5) 15. VII. 910 ♀ ad. | Моховыя Горы въ окр. Н.-Новгорода. |
| 6) 17. VIII. 910 ♀ | Хахалы, Семеновскаго уѣзда. |
| 7) 19. VIII. 910 ♂ juv. | |
| 8) 22. VIII. 910 ♂ juv. | |
| 9) 24. VIII. 910 ♀ | |
| 10) 21. IV. 911 ♀ | Островъ на Волгѣ противъ Безводнаго. |
| 11) " " ♀ | |
| 12) " " ♀ | |
| 13) " " ♂ | |
| 14) " " ♂ | |

97. *Hypotriorchis subbuteo* (L.).

Faco subbuteo, L. Мензбиръ. (5), стр. 39.

Чеглокъ—обыкновенная птица описываемой мѣстности. Въ численности уступаетъ пустельгѣ. Первыхъ чеглоковъ здѣсь наблюдали 7. IV. Питается въ большинствѣ случаевъ птичками, но беретъ также мышей и кузнечиковъ. За мышами охотится такъ же, какъ напр., пустельга, т.-е. махая быстро крыльями, удерживается на одномъ мѣ-

стѣ, чтобы получше всмотрѣться. Охотясь за птичками чеглокъ проявляетъ чисто ястребиныя хватки: быстро летитъ онъ невысоко надъ кустами подобно перепелятнику, чтобы напасть на птичекъ врасплохъ. Никогда не упуститъ также случая схватить подраненую птицу. Я наблюдалъ это при такихъ обстоятельствахъ: на обширной площади топкой грязи держалось много куличковъ рода *Tingia*; по нимъ стрѣляли ежедневно, но топкая грязь не позволяла всѣхъ подраненныхъ собирать и поэтому не летающихъ или плохо летающихъ куличковъ здѣсь держалось всегда много. Въ этомъ же мѣстѣ всегда держались чеглоки и на моихъ глазахъ охотились за подстрѣленными куличками, а однажды чеглокъ бросился на раненаго *Tr. alpina* тотчасъ же послѣ моего выстрѣла по этому кулику.

Экземпляръ коллекціи:

- 1) 2. VII. 909 ♀ ad. Дер. Фроловская, Нижегородскаго у.
- 2) " " ♀ juv. ibidem.
- 3) 9. V. 910 ♂ Село Лыково-Никольское, Семеновск. у.
- 4) 20. V. 911 ♂ Р. Калша, Лукояновскаго уѣзда.
- 5) 4. VI. 911 ♀ ad. Старая Пустынь, Арзамаск. уѣзда.
- 6) 4. VII. 911 ♀ ad. ibidem.
- 7) 5. VII. 911 ♂ ad. ibidem.
- 8) 15. VII. 911 ♂ (?) ibidem.
- 9) 18. VIII. 911 ♂ Жуковский затонъ на Волгѣ.

98. *Falco peregrinus* (Tunst.).

Falco peregrinus, Briss. Мензбиръ. (5), стр. 44.

Сапсанъ на гнѣздовьяхъ въ Нижегородской губ. пока не найденъ. Я всего одинъ разъ видѣлъ несомнѣнно эту птицу, а именно: 22. VIII. 910 въ окр. Хахалы, Семеновскаго уѣзда. То была старая птица. Почти полное отсутствіе наблюдений надъ этимъ соколомъ въ Нижегородской губ. не является случайностью, потому что сапсанъ рѣдокъ и въ смежныхъ губерніяхъ.

Hierofalco cherrug (Gray).

Hierofalco saker, Gmel. Мензбиръ. (5), стр. 53.

Hierofalco sacer, Gmel. Житковъ и Бутурлинь. (10), стр. 234.

Hierofalco cherrug (Gray.) Артоболовскій. (9), стр. 13.

Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что балобанъ бываетъ въ южныхъ уѣздахъ Нижегородской губ., ни чѣмъ по внѣшнему виду не отличающихся

и не отдѣленныхъ естественно границей отъ Симбирской и Пензенской губ., гдѣ балобанъ найденъ. Въ Симбирской, по Житкову и Бутурлину (l. c.), гнѣздованіе балобана констатировано для поймы Алатыря, верстахъ въ 20 отъ границы съ Нижегородской губ., а въ Пензенской губ. по Артоблевскому (l. c.) „балобанъ не рѣдокъ на гнѣздовьяхъ“. Мнѣ эта птица не встрѣчалась.

99. *Erythropus vespertinus* (L.).

Erythropus vespertinus, L. Мензбирь. (5), стр. 22.

Кобчикъ сравнительно рѣдокъ въ Нижегородской губ. Я его встрѣчалъ на гнѣздовьяхъ по одному разу въ Семеновскомъ, Макарьевскомъ и Лукояновскомъ уѣздахъ. Весной—22.IV.910—былъ убитъ въ Балахнинскомъ уѣздѣ близъ ст. „Орловка“ М.-Н. ж. д. Н. А. Покровский встрѣчалъ кобчика осенью въ Васильскомъ уѣздѣ. Осенью попадаетъ чаще, чѣмъ лѣтомъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 21.V.910 ♂ С. Пестяръ, Макарьевского уѣзда.
- 2) 17.VIII.910 ♀ juv. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.

100. *Aesalon aesalon* (Tunstall).

Lithofalco aesalon, Briss. Мензбирь. (5), стр. 30.

Дербникъ встрѣчается еще рѣже, чѣмъ кобчикъ. На гнѣздовьяхъ найденъ мною только въ Семеновскомъ уѣздѣ. Здѣсь я наблюдалъ 9.V.910 парочку этихъ соколовъ подъ Лыковымъ. Въ концѣ августа 23.VIII.910—былъ замѣченъ выводокъ въ количествѣ 4 шт. близъ дер. Арестово, Семеновск. у. Осенью на пролетѣ наблюдался въ Семеновскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ. Н. А. Покровскій наблюдалъ въ 1912 году осенью нѣчто подобное пролету этихъ соколовъ въ долину Волги. Имъ и Ф. Ф. Шиллингеромъ между 29.VIII и 8.IX.912 добыто два экземпляра дербниковъ въ этомъ мѣстѣ. Зимой дербника убивалъ (15.XI.905) Н. А. Покровскій подъ Н.-Новгородомъ. Въ смежныхъ губерніяхъ найденъ пока только въ Казанской Русскимъ (4).

Экземпляры коллекціи:

- 1) 22.VIII.910 juv. Окр. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 18.VIII.911—♂ ad. Жуковский затонъ на Волгѣ, Макар. у.

101. *Pernis apivorus* (L.).

Pernis apivorus, L. Мензбирь. (5), стр. 74.

Особѣ гнѣздится въ Нижегородской губерніи. У меня имѣются экземпляры изъ Семеновскаго, Нижегородскаго и Лукояновскаго уѣздовъ. Кроме того, наблюдалъ въ Макарьевскомъ и Арзамасскомъ. Гнѣздо было найдено мной только однажды—17.V.910 въ Семеновскомъ уѣздѣ. Гнѣздо помѣщалось на высокой елкѣ среди смѣшаннаго съ преобладаніемъ сосны лѣса, саженьяхъ въ 5 отъ земли и содержало 3 почти не насиженныхъ яйца. У гнѣзда убитъ ♂.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 3.VIII.908 ♀ juv. Фроловское, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 17.V.910 ♂ ad. Окр. оз. Чернаго на гран. Семеновск. и Макарьевскаго у.у.
- 3) 31.V.1911 ♀ juv. Пойма Алатыря, Лукояновск. у.
- 4) 4.VIII.911 ♀ juv. Пойма р. Казань, Лукояновск. у.

102. *Milvus ater* (Gm.).

Milvus ater, Gm. Мензбирь. (5), стр. 80.

Очень обыкновенная птица Нижегородской губ. Гнѣздится всюду, но излюбленное мѣсто ея гнѣздованія—поймы рѣкъ, особенно Волги и Оки. Образъ жизни этого хищника по моимъ наблюденіямъ въ общемъ совершенно таковъ, какъ его описываетъ М. А. Мензбирь (l. c.). Весною послѣднюю пролетную стайку, состоящую изъ 3 птицъ, я видѣлъ 13.IV.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 7.V.910 ♀ Лыково-Никольское, Семеновскаго у.
- 2) 21.V.911 ♂ Островъ на Волгѣ противъ Безводнаго.
- 3) 28.V.911 ♀ Р. Алатырь близъ Кемли, Лукояновскаго у.
- 4) 5.VI.911 ♂ Оз. Широкое на р. Серезѣ, Арзамасск. у.

103. *Haliaeetus albicilla* (L.).

Haliaeetus albicilla, Briss. Мензбирь. (5), стр. 96.

- Haliaeetus albicilla* (Savigny) Briss. Богдановъ. (1), стр. 32.
- Haliaeetus albicilla* (Linn.). Русскій. (4), стр. 140.
- Haliaeetus albicilla* L. Житковъ и Бутуранинъ. (10), стр. 241.
- Haliaeetus albicilla* (Linn.). Артоблевскій. (9), стр. 14.
- Haliaeetus albicilla* Briss. Кирпичниковъ, (14), стр. 397.

Согласно указаніямъ Мензбира (l. c.) бѣлохвость долженъ встрѣчаться въ центральныхъ губ., а слѣдовательно и въ Нижегородской.

Что касается въ частности Волги, то весьма опредѣленные указанія на гнѣздованіе здѣсь орлана мы находимъ у Эверсмана, Богданова (l. c.) и Рузскаго (l. c.) Последний изъ этихъ авторовъ прослѣдилъ его вверхъ до Суры включительно. Обращаясь къ болѣе позднимъ изслѣдованіямъ фауны центральной Россіи видимъ слѣдующее: Житковъ и Бутурлинъ (l. c.) нашли бѣлохвоста въ Симбирской губ. на пролетѣ. По Артоблевскому (l. c.) въ Пензенской губ. гнѣздится. Въ Костромской былъ наблюдаемъ Кирпичниковымъ. Что же касается Нижегородской губ., то о гнѣздованіи здѣсь орлана мнѣ удалось собрать лишь весьма скудные свѣдѣнія. По рассказамъ орланъ гнѣздился въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ старомъ дубовомъ лѣсу противъ Безводнаго на Волгѣ. Въ серединѣ лѣта 15.VII.911 Н. А. Покровскій наблюдалъ орлана подъ Василь-Сурскомъ. Весной и осенью нѣсколько разъ наблюдался на Волгѣ. Н. А. Покровскому онъ встрѣчался тамъ даже не особенно рѣдко.

104. *Aquila chrysaëtus chrysaëtus* (L.).

Aquila chrysaetos, L. Мензбиръ (5), стр. 113.

Aquila nobilis, Pall. Мензбиръ *ibid.*, стр. 116.

Aquila chrysaetus L. Житковъ и Бутурлинъ (10), стр. 242.

Беркутъ гнѣздится въ Макарьевскомъ, Семеновскомъ и Балахнинскомъ уѣздахъ. Въ Арзамасскомъ я его встрѣтилъ въ гнѣздовую пору однажды, но то была вѣроятно бродячая птица. Въ Лукояновскомъ уѣздѣ беркута можно было ожидать въ поймѣ Алатыря, потому что въ поймѣ этой рѣки въ Ардатовскомъ уѣздѣ, Симбирской губ., недалеко отъ границы съ Нижегородской губ. по свидѣтельству Житкова и Бутурлина (l. c.) беркутъ на гнѣздовѣ обыкновененъ. Однако въ Лукояновскомъ уѣздѣ въ 1911 году я этой птицы не видалъ и пойма Алатыря была занята другими орлами: *Aquila clanga* и *Aquila heliaca*. Такимъ образомъ на гнѣздовѣ беркутъ найденъ пока только въ сѣверной половинѣ Нижегородской губерніи. Въ этомъ районѣ онъ вообще рѣдокъ. Позднѣю осенью и зимой охотники сѣверныхъ уѣздовъ ловятъ орловъ въ капканы. Отсюда они поступаютъ на нижегородскій и московскій рынки и судя по этимъ рынкамъ беркуты живутъ въ Нижег. губ. круглый годъ. Мнѣ приходилось чаще наблюдать птицъ типа „*A. nobilis* Pall.“ т.-е. молодыхъ и однажды мнѣ былъ присланъ пойманный въ февралѣ 1911 года въ Семеновскомъ уѣздѣ старый *A. chrysaëtus*, L.

Экземпляры коллекціи:

1) 14.XII.910 ♀ ad. Р. Люнда, Макарьевскаго уѣзда.

2) 10—20. II.911 ♀ ad. С. Красная Рамень, Семеновск. у.

105. *Aquila heliaca* (Sav.).

Aquila heliaca, Sav. Мензбиръ (5), стр. 127.

Могильникъ найденъ гнѣздящимся въ Лукояновскомъ у. 22.VII.911 въ поймѣ Алатыря близъ с. Ичалокъ былъ пойманъ молодой, плохо летающей орленокъ этого вида. 26.VII.911 неподалеку отъ этого мѣста на р. Крутець былъ вынутъ для меня еще одинъ орленокъ. Какъ мнѣ удалось выяснитъ, эти орлята изъ разныхъ гнѣздъ. Лѣсникъ, доставившій мнѣ орленка съ Крутца, рассказывалъ, что орлы гнѣздятся въ этомъ мѣстѣ ежегодно, занимая одно и то же гнѣздо.

Немного позднѣе—а именно 31.VII.911 въ деревнѣ Нов.-Ичалки моимъ препараторомъ былъ убитъ старый самецъ *A. heliaca* изъ пары. 5.VIII.911 я наблюдалъ пару старыхъ темно-бурыхъ могильниковъ въ окр. той же дер. Въ тотъ день былъ очень сильный дождь и орлы мокрые не охотно взлетали; къ одному я подѣхалъ шаговъ на 15! Въ Симбирской губ. *Aquila heliaca* Sav. былъ найденъ Рузскимъ въ 1893 году и отнесенъ къ числу случайно залетныхъ (Орнитологическія наблюденія въ Симбирской губерніи М. Рузскаго. Стр. 15). Нѣтъ ничего вѣроятнаго, что въ то время этотъ орелъ былъ въ Симбирской и сопредѣльной части Нижегородской губ. рѣдкимъ, но въ настоящее время достоверно известно, что онъ гнѣздится въ Симбирской и Пензенской губерніяхъ, такъ что нахожденіе его въ Нижегородской губ. не является неожиданнымъ.

Экземпляры коллекціи:

1) 22.VII.911 ♂ juv. Лѣв. берегъ р. Алатыря противъ с. Ичалокъ, Лукояновск. у.

2) 26.VII.911 ♂ juv. Рѣчка Крутець, *ibidem*.

3) 31.VII.911 ♂ ad. Дер. Нов.-Ичалки, Лукояновск. у.

106. *Aquila maculata* (Gm.).

Aquila clanga, Pall. Мензбиръ (5), стр. 145.

Большой подорликъ правильно гнѣздится на протяженіи всей губерніи, выбирая мѣстомъ своего жительства поймы богатыхъ дичью рѣкъ. Въ числу такихъ рѣкъ относятся: Волга, Ока, Ветлуга, Сура, Алатырь и Сережа. На Керженцѣ я его не наблюдалъ совсѣмъ. Не

гнѣздится, повидимому, этотъ орелъ въ сплошныхъ борахъ сѣверныхъ уѣздовъ и въ бѣдныхъ болотами центральныхъ. Къ имѣющимъ даннымъ объ образѣ жизни этой птицы сообщу лишь, что подорликъ, по крайней мѣрѣ въ Нижегородск. губ., насколько мнѣ пришлось наблюдать, кладетъ чаще одно яйцо. Родители не привязаны къ дѣтямъ, и когда подходишь къ гнѣзду, они поспѣшно улетаютъ, а орленокъ прижимается къ гнѣзду, молчитъ и вообще старается остаться незамѣченнымъ. У гнѣздъ подорликовъ я находилъ кости утокъ, куръ, карасей и т. п. Во рту одного стараго подорлика, убитаго въ то время, какъ онъ подлеталъ къ своему орленку, я нашелъ около десятка маленькихъ налимовъ, величиною не болѣе огольца. Рыбу подорликъ или ловитъ самъ, или подбираетъ за рыбаками, въ послѣднемъ случаѣ онъ противъ обыкновенія подлетаетъ къ людямъ на очень близкое разстояніе. Отмѣчу поразившее меня умѣнье орлятъ летать. Однажды я у гнѣзда подорликовъ поджидалъ, когда прилетятъ старыя птицы. Находящемуся въ гнѣздѣ, почти совершенно выросшему орленку, надоело лежать прижавшись къ гнѣзду и онъ понемногу сталъ подниматься. Убѣдившись, что я не предпринимаю противъ него враждебныхъ дѣйствій, онъ сталъ выходить на край гнѣзда, вылѣзать на ближайшіе сучья дерева и т. п. Въ это время мнѣ пришлось выстрѣлить по какой-то птичкѣ. Орленокъ нѣкоторое время сидѣлъ покойно, но вдругъ, расправивъ крылья, соскочилъ съ гнѣзда и полетѣлъ, такъ ловко и быстро лавируя между частыми деревьями, какъ это дѣлаетъ, напр., въ сравненіи съ нимъ маленькая птица—вальдшнепъ.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1) 20.VII.911 ♀ ad. | } Пойма Калши, лѣвый притокъ Алатыря. |
| 2) 20.VII.911 ♂ juv. | |
| 3) 26.VII.911 ♀ ad. | |
| 4) 26.VII.911 ♀ juv. | |
| 5) 27—28.VII.911 ♀ juv. | Окр. с. Оброчнаго, Лукояновск. у. |
| 6) 30.VII.911 ♀ ad. | } Пойма Алатыря, Лукояновск. уѣзда. |
| 7) 31.VII.911 ♂ ad. | |
| 8) 31.VII.911 juv. | |

107. *Circaëtus gallicus* (Gm.).

Circaetus gallicus, Gm. Мензбиръ (5), стр. 169.

„ „ Мензбиръ (2), стр. 333.

М. А. Мензбиръ въ „Орнитологической географіи“ сообщаетъ: „въ октябрѣ 1880 г. *Circ. gallicus*, пойманный живьемъ въ Нижегород-

ской губерніи, доставленъ въ Москву“. Тѣмъ же авторомъ въ „Птицахъ Россіи“ (I. с.) сѣверная граница распространенія змбейда была проведена черезъ Нижегородскую губернію. По моимъ наблюденіямъ змбейда—рѣдная гнѣздящаяся птица Нижегородской губ. Вотъ всѣ наблюденія надъ этой птицей: лѣтомъ 1910 г. я видѣлъ змбейда въ Макарьевскомъ уѣздѣ не далеко отъ р. Ари, притока Керженца. Одновременно и почти тамъ же мнѣ показывали крыло только что убитаго змбейда. На основаніи рассказовъ можно предполагать, что *Circ. gallicus* гнѣздится въ Семеновскомъ уѣздѣ. 13.VI.910 г. въ лѣсу по Ветлугѣ въ окр. дер. Анненки я видѣлъ змбейда, вылетѣвшаго отъ меня на разстояніи ружейнаго выстрѣла изъ заросшей кустами сырой луговины.

Въ Балахинскомъ уѣздѣ на лѣв. бер. Волги противъ г. Балахны былъ добытъ ♂ змбейда и доставленъ мнѣ. Такимъ образомъ я считаю вполне доказаннымъ, что *Circ. gallicus* гнѣздится въ сѣверной половинѣ Нижегородской губ., что же касается южной, то и здѣсь змбейда наблюдался. Лѣтомъ 1908 г. въ Нижегородск. уѣздѣ въ окр. дер. Фроловской мною были найдены три маховыхъ пера этой птицы, а въ 909 г., 20.VIII неподалеку отъ этого мѣста на Кудымѣ змбейда былъ добытъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 20.VIII.909 ♂ (?) ad. Р. Кудыма близъ дер. Новой, Нижес. у.
- 2) 24.IV.910 ♂ Мѣстность „Жары“ противъ Балахны.

108. *Archibuteo lagopus* (Brünn.).

Archibuteo lagopus, Brünn. Мензбиръ (5), стр. 175.

Мохноногий канюкъ бываетъ въ Нижегородской губ. пролетомъ. Возможно, что въ сѣверныхъ уѣздахъ гнѣздится, потому что найденъ на гнѣздовѣ близъ плеса, Костромской губ. Волнухинымъ (экземп. я видѣлъ) и былъ убиваемъ лѣтомъ во Владимирской губ. (Мензбиръ (I. с.).

109. *Archibuteo pallidus* (Menzb.).

Archibuteo pallidus, Menzb. Мензбиръ (5), стр. 180.

Сибирскій зимнякъ также бываетъ въ описываемой мѣстности на пролетѣ и, можетъ быть, зимуетъ. Появляется онъ въ центр. губ. сравнительно рано. Напр., въ Симбирской губ. въ началѣ сентября, въ Нижегородск. губ. въ концѣ этого мѣсяца. Такъ 24.IX.898 Archi-

Buteo pallidus былъ убитъ подъ Н.-Новгородомъ. У меня имѣется экземпляръ, добытый въ концѣ ноября. На рынкѣ въ Н.-Новгородѣ мнѣ приходилось видѣть ихъ и позднѣе, въ первыхъ числахъ января.

Экземпляръ коллекціи:

25.XI.909 ♂ С. Боръ, Семеновскаго уѣзда.

110. *Buteo vulpinus* (Licht.).

Buteo vulpinus Licht. Меззбаръ (5), стр. 189.

Сарычи—очень обыкновенны въ Нижег. губ. Ихъ можно наблюдать какъ въ островныхъ лѣсахъ южныхъ уѣздовъ, такъ и въ глухой тайгѣ сѣверныхъ. Въ сѣверныхъ лѣсахъ онъ даже обыкновеннѣе. Тамъ его почти не преслѣдуютъ, а пища изъ ящерицъ, змѣй, мышей, жуковъ, улитокъ всегда въ изобиліи. Прилетаетъ канюкъ въ первыхъ числахъ апрѣля. Въ сѣверныхъ уѣздахъ онъ помѣщаетъ свое гнѣздо на елкѣ или соснѣ всегда невысоко. Яйца, въ количествѣ 2, 3 и не особенно рѣдко 4-хъ можно находить въ двадцатыхъ числахъ мая.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 4.VIII.909 juv. Дер. Новосвятителево, Нижегородск. у.
- 2) 28.IV.910 ♂ Дер. Красный Яршма, Макарьевскаго у.
- 3) 6.V.910 ♂ Рѣчка Арія, притокъ Керженца, Макар. у.
- 4) 8.V.910 ♀ Керженецъ у Лыкова, Семеновск. у.
- 5) 21.V.910 ♀ С. Нестіаръ, Макарьевскаго у.
- 6) 14.VIII.910 ♀ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 7) 19.V.911 ♀ } Калша, притокъ Алатыря, Лукоян. у.
- 8) 19.V.911 ♀ }
- 9) 6.VI.911 ♂ }
- 10) 8.V.1911 ♀ }
- 11) 11.VII.911 ♂ } Старая Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 12) 11.VII.911 ♀ }
- 13) 20.VII.911 ♀ juv. }
- 14) 22.VII.911 ♀ juv. } Пойма р. Калши, притока Алатыря, Лукояновскаго уѣзда.
- 15) 23.VII.911 ♀ }
- 16) 4.VIII.911 ♂ ad. }

111. *Accipiter nisus* (L.).

Accipiter nisus, L. Меззбаръ (5), стр. 198.

Мѣстное названіе: *воробьятникъ*.

Перепелятникъ гнѣздится и не рѣдокъ. Зимой я его не видѣлъ никогда и думаю, что огромное большинство перепелятниковъ откоче-

вывааетъ на зиму южнѣе. Гнѣзда перепелятниковъ я находилъ нѣсколько разъ и всегда находилъ въ нихъ 4 яйца или столько же птенцовъ. Гнѣзда располагались не высоко на деревѣ у ствола, а однажды я нашелъ гнѣздо, устроенное на полнвицѣ дровъ среди небольшой лѣсной поляны. Сидѣвшая на гнѣздѣ самка подпускала человѣка шаговъ на 15. Перепелятники охотно держатся въ городахъ, охотятся за воробьями и голубами. Однажды, очевидно, гонясь за воробьями, молодой перепелятникъ влетѣлъ ко мнѣ въ окно.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 28.V.910 ♀ Нестіаръ, Макарьевскаго уѣзда.
 - 2) 18.VI.910 ♀ Дер. Анненка на Ветлугѣ въ Макар. у.
 - 3) 22.VIII.910 ♀ juv. С. Сушкины, Семеновскаго у.
 - 4) 11.IV.911 ♀ Марьяна Роща въ окр. Н.-Новгорода.
 - 5) 14.IV.911 ♀ Моховыя Горы въ окр. Н.-Новгорода.
 - 6) 15.VII.911 ♀ juv. }
 - 7) " " " ♂ juv. } Старая Пустынь, Арзамасск. уѣзда.
 - 8) 25.VII.911 ♀ juv. }
 - 9) " " " ♀ juv. } Пойма Калши, Лукояновскаго у.
 - 10) " " " ♂ juv. }
 - 11) 31.VII.911 ♀ juv. Пойма Алатыря, Лукояновск. у.
 - 12) 28.VIII.911 ♂ juv. Жуковскій ватонъ, Макарьевск. у.
- Самки отлѣт. цифр. 6, 8, 9 и 11 имѣли парный личинки.

112. *Astur palumbarius* (L.).

Astur palumbarius, L. Меззбаръ (5), стр. 205.

Ястребъ тетереватникъ гнѣздится въ значительно меньшемъ количествѣ, нежели предыдущій видъ. Подъ осень становится болѣе многочисленнымъ. Зимуетъ. Чаще всего охотниками убивается именно тетереватникъ, потому что онъ хватается чучела тетеревей, съ которыми здѣсь охотятся.

Экземпляры коллекціи:

- 1) XI.910 ♀ ad. Дер. Анненка на Ветлугѣ, Макар. у.
- 2) Конецъ XI.910 ♀ juv. Нестіаръ, Макарьевскаго уѣзда.
- 3) " " " ♀ juv. ibidem.
- 4) 1—5.II.911 ♀ Красная Рамень, Семеновскаго уѣзда.
- 5) 24.V.911 ♂ ad. Лѣса по лѣв. бер. Алатыря, Лукоян. у.

113. *Circus cineraceus* (Mont.).

Circus cineraceus, Mont. Меззбаръ (5), стр. 217.

Луговой лунь очень обыкновененъ въ долинѣ Волги. Къ сѣверу отсюда, повидимому, рѣдокъ, къ югу — обыкновененъ. Прилетаютъ

луни всѣхъ видовъ въ первой половинѣ апрѣля. Въ это время ихъ особенно много по Волгѣ на поемныхъ лугахъ. Вода, постепенно затопляя луга, вынуждаетъ мышей и полевыхъ собираться на островахъ въ большомъ количествѣ. Здѣсь луны находятъ обильную пищу. Ночью на ихъ мѣсто вылетаютъ совы. Осенью луны посѣщаютъ усадьбы и огороды, охотясь за мелкими птичками.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) 23.VII.908 ♂ juv. | } Окр. Ст.-Пустыни, Арзамаск. у. |
| 2) 11.VII.911 ♂ juv. | |
| 3) 11.VII.911 ♀ juv. | |
| 4) 18.VII.911 ♂ juv. | |
| 5) 25.VII.911 ♀ juv. | |

114. *Circus macrurus* (Gm.).

Circus macrurus, Gm. Мензбиръ (5), стр. 224.

Среди луней, добытыхъ въ поймѣ Алатыря въ Лукояновскомъ уѣздѣ, оказались два *Circus macrurus* Gm. Оба — молодые самцы. Окраска того и другого замѣтно блѣднѣе окраски *Circus cinerascens* въ соответствующемъ перѣ. Оба имѣютъ типичное для этого вида крыло и болѣе длинную, нежели у *C. cinerascens*, плюсну. Поперечная полосатость надхвостья отсутствуетъ¹⁾. Наиболее надежнымъ признакомъ этого вида является, какъ мнѣ говорилъ проф. П. П. Сушкинъ, размѣръ плюсны. У самцовъ плюсна приблизительно на 8 мм. длиннѣе плюсны ♂ *Circus cinerascens*. Я не знаю, какъ далеко идетъ къ сѣверу *Circus macrurus*, но, вѣроятно, до Волги, за которой начинается уже тайга.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) 25.VII.911 ♂ juv. | } Пойма Алатыря, Лукояновск. у. |
| 2) 28.VII.911 ♂ juv. | |

115. *Circus cyaneus* (L.).

Circus cyaneus, L. Мензбиръ (5), стр. 229.

Это едва ли не самый многочисленный изъ гнѣздящихся у насъ луней. Прилетаютъ въ первыхъ числахъ апрѣля.

¹⁾ Не поперечная полосатость, а пестрина надхвостья — признакъ чрезвычайно измѣчивый индивидуально. Поперечная полосатость же очень характерна для взрослыхъ *C. macrurus*. Редакт.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 27.VII.909 ♂ juv. Дер. Новосвятителево, Нижегородск. у.
- 2) 14.VI.910 ♀ ad. Дер. Анненка, Макарьевского уѣзда.
- 3) 24.VIII.910 ♀ juv. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 4) 25.VII.911 ♀ ad. Дер. Новая Ичалка, Лукояновск. у.

116. *Circus aeruginosus* (L.).

Circus aeruginosus L. Мензбиръ (5), стр. 235.

Болотный лунь распространенъ не вездѣ равномерно. Въ тѣхъ мѣстахъ сѣверной половины Нижегородск. губ., гдѣ мнѣ приходилось коллектировать, я встрѣчалъ его очень рѣдко, тогда какъ по Волгѣ и южнѣ онъ обыкновененъ. Этотъ лунь самый хищный изъ своихъ сородичей. Часто приходилось мнѣ вырѣзывать изъ него сравнительно крупныхъ птицъ, напр., *Vanellus cristatus*. Онъ беретъ и мертвыхъ птицъ. Я знаю случай, когда болотный лунь вытащилъ изъ воды подстрѣленного за день до этого молодого полевого луни (см. № 1 списка полевыхъ луней коллекціи), а однажды я былъ свидѣлемъ факта, доказывающаго большую смѣлость этого хищника. Я подстрѣлил бекаса и тотъ, отлетѣвъ порядочное разстояніе, упалъ комомъ. Быстро подойти и подобрать бекаса я не могъ, потому что тотъ упалъ среди непролазной топи. Вдругъ, вижу, является болотный лунь и бросается въ траву, куда упалъ бекасъ. Одна минута, и лунь поспѣшно улеталъ съ бекасомъ въ лапахъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.VI.909 ♀ ad. Луга на Кудьмѣ близъ дер. Новой, Нижегородск. у.
- 2) 19.IV.911 ♀ Берегъ Волги у Кетова.

Striges.

117. *Athene noctua* subsp.?

Athene noctua, Scop. Мензбиръ (5), стр. 262.

По литературнымъ даннымъ домовый сыч гнѣздится въ губ. Симбирской, Пензенской и Тамбовской. Несомнѣнно гнѣздится онъ также въ Лукояновскомъ уѣздѣ, Нижегородской губ., гдѣ я не разъ его видѣлъ и слышалъ. Здѣсь онъ довольно обыкновененъ.

118. *Glaucidium passerinum* (L.).

Glaucidium passerinum. L. Мензбиръ. (5), стр. 266.

Добыть лѣтомъ эту птичку мнѣ не удавалось. Весьма возможно, что она здѣсь гнѣздится, такъ какъ была убиваема лѣтомъ подъ Н.-Новгородомъ; къ сожалѣнію, не сохранилась точная дата. За время отъ 1908 до 1911 г.г. не разъ приходилось мнѣ самому видѣть въ селахъ по вечерамъ сычиновъ и однажды мнѣ казалось, что я наблюдаю именно этотъ видъ (въ с. Пустыни, Арзамасскаго уѣзда). На пролетѣ бываетъ осенью въ Нижегород. губ., но не знаю насколько правильно. Птицеловы утверждаютъ вполне опредѣленно, что не каждый годъ. Нападаетъ на мелкихъ птичекъ и поэтому при попыткахъ напасть на „кличныхъ“ птицъ птицелововъ часто попадается самъ подъ сѣти. Въ 1911 г. въ сентябрѣ на Нижегородскомъ рынкѣ было 4 сыча такимъ образомъ пойманныхъ въ окр. города. Насколько мнѣ извѣстно и въ Москвѣ на Трубнои площади въ эту осень сычи были нерѣдки.

Экземпляры коллекціи:

- 1) IX.911. Окр. Н.-Новгорода.
- 2) IX.911. *ibidem*.

119. *Bubo bubo* (L.) *typic.* n120. *B. b. ruthenus* (Buturl. et Zhitk.).

Bubo maximus, Ser. Мензбиръ. (5), стр. 269.

Для Семеновскаго, Балахнинскаго и Макарьевскаго уѣздовъ эта птица, гнѣздящаяся, и особенно зимующая, рѣдкости не представляетъ. Что касается центральныхъ уѣздовъ, то здѣсь филинъ, какъ кажется, не гнѣздится: нѣтъ большихъ лѣсовъ; но бываетъ здѣсь весной, осенью и зимой. Я не имѣю свѣдѣній изъ Арзамасскаго и Ардатовскаго уѣздовъ. Въ Лукояновскомъ же несомнѣнно гнѣздится. Молодые филинята были пойманы въ лѣсахъ по Алатырю во второй половинѣ іюля 1911 г. Я просмотрѣлъ болѣе десяти зимнихъ (лѣтнихъ не имѣю) филиновъ изъ Нижегород. губ. Типичный (темный) *B. bubo* попался лишь одинъ (№ 1 колл.), остальные въ большей или меньшей степени свѣтлѣе; часто, но не всегда, къ тому же рыжѣе. Эта болѣе свѣтлая, рыжеватая форма описана С. А. Бутурлинымъ и Б. М. Житковымъ въ качествѣ подвида подъ наз. *B. bubo ruthenus*. Значительная часть филиновъ вполне подходятъ подъ это описаніе, — но много также экземпляровъ переходныхъ къ *B. bubo bubo*.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 1—15.XII.910 ♂ Окр. с. Воскресенскаго на Ветлугѣ.
- 2) 20—27.III.911 ♂ Окр. Семенова.
- 3) 19.XII.912 ♀ Семеновскій уѣздъ.
- 4) 16.XII.912 ♀ Лѣв. берегъ Волги.
- 5) 3.I.913 ♂ Окр. Н.-Новгорода.

121. *Scops scops pulchella* (Pallas).

Scops giu, Scop. Мензбиръ. (5), стр. 280.

” ” ” Рузскій. (4), стр. 156.

Scops scops (Linn.) Артоболовскій. (9), стр. 75.

13.V.910 въ окр. с. Лыкова-Никольскаго, Семеновскаго уѣзда я слышалъ крикъ зорьки, а 15.V эта птичка была для меня убита. Въ концѣ мая этого же года зорька была наблюдаема въ одномъ изъ садовъ Н.-Новгорода. Въ маѣ 1911 года крикъ ея былъ слышенъ на лѣв. берегу Волги близъ Жуковского затона, Макарьевскаго уѣзда. Очень вѣроятно, что зорька гнѣздится въ Нижегородской губернии нормально. Что касается соседнихъ губ., то во Владимирской губ. въ окрестн. Орѣхова-Зуева совка не составляетъ рѣдкости. Въ Казанской и Симбирской губ. она найдена Рузскимъ (l. c.) и по Артоболовскому (l. c.) гнѣздится въ Пензенской губернии.

Экземпляръ коллекціи:

- 15.V.910 ♂ ad. Рѣчка Черная, лѣв. притокъ Керженца.

122. *Surnia ulula* (L.).

Surnia ulula, L. Мензбиръ. (5), стр. 284.

26.V.910 близъ озера Камскаго, Макарьевск. уѣзда, мнѣ удалось близко подойти и рассмотреть эту птицу. Это—единственный случай, когда я наблюдаю ястребиную сову въ гнѣздовый періодъ. Я причисляю эту птицу къ гнѣздящимся въ сѣверной половинѣ Нижегородской губернии. За это говоритъ, кромѣ моего наблюденія, также и то, что въ Костромской губ. эта сова была добыта Б. Д. Кирничниковымъ несомнѣнно на гнѣздовѣ. Осенью и зимой *Surnia ulula* появляется въ Нижегород. губ. въ неодинаковомъ количествѣ. На шестомъ рынкѣ въ зиму 909—910 и 910—911 гг. она предлагалась въ большемъ количествѣ, тогда какъ въ 1912—13 г. ея почти не было.

Экземпляръ коллекціи:

- 25.XI.909 ♂ (?) Окр. с. Боръ, Семеновскаго уѣзда.

123. *Nyctala tengmalmi* (Gm.).

Nyctala tengmalmi, Gm. Меззбиръ. (5), стр. 290.

Мохноногий сыч гнѣздится въ Нижегородской губерніи; насколько правильно—судить пока не берусь, потому что выводокъ этого сыча я нашелъ лишь однажды 3.VII.911 въ Арзамасскомъ уѣздѣ близъ с. Старая Пустынь. Изъ выводка добылъ пару молодыхъ. Въ августѣ 1910 г. по селу Хахаламъ, Семеновскаго уѣзда нѣсколько вечеровъ подрядъ леталъ сычъ, по всей вѣроятности *Nyct. tengmalmi*, потому что *Athene noctua* здѣсь невѣроятенъ. Н. А. Покровскій добывалъ мохноногого сыча подъ Н.-Новгородомъ въ февралѣ 1905 г.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 3.VII.911 ♀ juv. } Стар. Пустынь, Арзамасскаго у.
- 2) 3.VII.911 ♂ juv. }

124. *Scotiaptex cinerea lapponica* (Thunb.).

Syrnium lapponicum, Retz. Меззбиръ. (5), стр. 294.

Гнѣздованія *S. c. lapponica* въ Нижегородской губ. мнѣ не удалось установить. У меня даже нѣтъ свѣдѣній о нахожденіи этой совы въ первую половину осени. Зимой же каменную неясыть добываютъ здѣсь довольно часто. Въ коллекціи нижегородскаго земскаго музея имѣются чучела этой совы; кромѣ того, у любителей и на рынкѣ я видѣлъ каменную неясыть много разъ.

125. *Syrnium uralense* (Pall.).

Syrnium uralense, Pall. Меззбиръ. (5), стр. 297.

Я убилъ эту сову лѣтомъ 1910 г. въ Семеновскомъ уѣздѣ и имѣю основанія думать, что этотъ экземпляръ принадлежалъ къ числу гнѣздящихся въ этой мѣстности. Гнѣздится ли уральская неясыть южнѣ—не знаю, но это болѣе, чѣмъ вѣроятно, потому что эта птица отмѣчается гнѣздящейся въ Пензенской губ. (9). Осенью и зимой длиннохвостая сова одна изъ обыкновенныхъ здѣсь птицъ. Я смотрѣлъ уральскихъ совъ коллекціи проф. П. П. Сушкина изъ Смоленской и изъ Уфимской губ. Птицы Смоленской губ. обычно темнѣе и бурѣе экзempla. изъ Уфимской, но въ той и другой губ. имѣются совы промежуточнаго типа. Нижегородскія (2 экз. моей колл.) сходны съ этими послѣдними.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 19.V.910 ♀ Оз. Черное, Семеновскій уѣздъ.
- 2) 21.XII.909 ♀ Семеновскій уѣздъ.

126. *Syrnium aluco* (L.).

Syrnium aluco, L. Меззбиръ. (5), стр. 301.

Syrnium aluco—обыкновенная гнѣздящаяся сова въ предѣлахъ всей губерніи. Ея брачный крикъ можно слышать до половины мая и даже позднѣе. Встрѣчается круглый годъ. Однажды я нашелъ выводокъ этихъ птицъ сравнительно поздно: 7-го іюля. Выводокъ состоялъ изъ 4 уже летающихъ совятъ. Всѣ птицы коллекціи сѣраго типа.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.XI.909 ♂ Окр. с. Боръ, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 25.XI.909 ibidem.
- 3) 7.VII.911 } Стар. Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 4) 7.VII.911 }
- 5) 13.V.911 ♀ Марьина Роща въ окр. Н.-Новгорода.

127. *Nyctea nyctea* (L.).

Nyctea nyctea, L. Меззбиръ. (5), стр. 307.

Полярная сова бываетъ по зимамъ въ Нижегородской губ., но не всегда въ одинаковомъ количествѣ и, можетъ быть, даже не каждый годъ.

Экземпляръ коллекціи:

- 1) 19.XII.909 ♀ Село Борисовское, Нижегородскаго уѣзда.

128. *Asio accipitrinus* (Pall.).

Asio accipitrinus, Pall. Меззбиръ. (5), стр. 313.

Болотная сова попадалась мнѣ въ описываемомъ районѣ всюду. Несомнѣнно она здѣсь правильно гнѣздится. Питается почти исключительно мышами. Въ желудкѣ одной я нашелъ остатки трехъ большихъ мышей и 5 болѣе мелкихъ и одного жука.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.VII.908 ♂ (?) Зеленино, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 10.VIII.908 juv. Мокрое, Нижегородск. у.
- 3) 29.VII.909 juv. Лѣв. бер. Волги противъ Кетова.
- 4) 17.VIII.910 ♂ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 5) 4.VIII.911 ♂ Рѣчка Калша въ Лукояновск. у.

129. *Asio otus* (L.).

Asio otus, L. Мензбирь. (5), стр. 318.

Я встрѣчалъ эту сову почти всюду. Несомнѣнно она очень обыкновенна въ Нижегородской губ. Сплошныхъ боровъ Семеновскаго и Макарьевскаго уѣздовъ она избѣгаетъ и придерживается перелѣсковъ. Близость полей для нея необходима. Относительно времени гнѣздованія и вылета птенцовъ этой совы, такъ же какъ и предыдущей, мои наблюденія совершенно совпадаютъ съ изложенными въ „Птицахъ Россіи“ Мензбира.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.V.909 ♀ ad. Фроловское, Нижегородск. уѣзда.
- 2) 31.V.909 ♂ juv. ibidem.
- 3) 18.VI.910 ♂ ad. Дер. Анненка на Ветлугѣ въ Макарьев. у.

Picariae.

130. *Coracias garrulus* (L.).

Coracias garrula, L. Мензбирь. (5), стр. 391.

По имѣющимъ въ литературѣ даннымъ сизоворонка гнѣздится въ г.г. Казанской, Симбирской, Тамбовской и Владимирской. Въ Нижегородской губ. она была убиваема въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Макарьевскомъ (окр. Покровскаго, Макарьева и Жуковскій затонъ), Семеновскомъ (Лыково-Никольское, Боръ), Васильскомъ (Бармино), Княгининскомъ (Мурашкино), Нижегородскомъ (Фроловская) и Ардатовскомъ (Кулибаки). При этомъ въ пяти изъ указанныхъ пунктовъ (въ Макарьевѣ, Жуковскомъ затонѣ, Барминѣ, Мурашкинѣ и Фроловской) сизоворонка была добыта весною. Лѣтомъ, въ гнѣздовую пору—22.V я наблюдалъ ее однажды въ Лукояновскомъ уѣздѣ (верстахъ въ 18 къ сѣверу отъ селъ: Кемля, Оброчное). Очень цѣнныя наблюденія сдѣлалъ Н. А. Покровскій въ 1899 г. 30.VI въ окрестн. Кулебакъ, Ардатовскаго уѣзда онъ убилъ старую сизоворонку, а въ 1903 г. 16.VII тамъ же наблюдалъ выводокъ этихъ птицъ. Что касается осенняго пролета, то повидимому онъ очень слабъ. Я осенью видѣлъ сизоворонку только однажды: въ началѣ августа въ Нижегородскомъ уѣздѣ (у дер. Зеленына).

Экземпляры коллекціи:

- 1) 16.V.908 Дер. Фроловское, Нижегородскаго у.
- 2) 26.IV.911 ♀ Жуковскій затонъ на лѣв. бер. Волги.

131. *Merops apiaster* (L.).

Merops apiaster, L. Мензбирь. (5), стр. 396.

М. А. Мензбирь сообщаетъ (l. c.), что щурка была найдена Л. П. Сабашевымъ подъ Васильсурскомъ, Нижегородск. губ. Кромѣ этого сообщенія почти ничего достовѣрнаго о нахожденіи этой птицы въ Нижегородской губ. мнѣ не извѣстно. Н. А. Покровскій слышалъ отъ мѣстнаго препаратора Ф. Ф. Шиллингера, что щурка была однажды принесена послѣднему въ мастерскую, но сохранена не была. Откуда она и когда добыта—осталось забытымъ.

132. *Caprimulgus europaeus* (L.).

Caprimulgus europaeus, L. Мензбирь (5), стр. 404.

Мѣстныя назв.: *полуночникъ, лелекъ.*

Полуночникъ гнѣздится во множествѣ. Первыхъ козодоевъ видѣлъ 22.IV. Почти не насиженные яйца я однажды нашелъ въ началѣ іюля, обыкновенно же въ іюлѣ у козодоевъ уже птенцы.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1) 6.VII.911 ♀ | } Стар. Пустынь, Арамасскаго уѣзда. |
| 2) 6.VII.911 ♀ | |

133. *Cypselus apus* (L.).

Cypselus apus, L. Мензбирь (5), стр. 410.

Стрижъ гнѣздится какъ въ селеніяхъ, такъ и въ лѣсахъ, безразлично будетъ ли то небольшой островъ, или дремучій безпредѣльный сѣверный лѣсъ. Въ Семеновскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, гдѣ сухой часто совѣтъ не вырубается и, слѣдовательно, душистыхъ деревьевъ очень много, стрижи живутъ въ очень большомъ количествѣ.

Экземпляръ коллекціи:

24.VI.911 ♀ Н.Новгородъ.

134. *Urupa erops* (L.).

Urupa erops, L. Мензбирь (5), стр. 146.

М. А. Мензбирь (l. c.), опредѣляя сѣверную границу области распространенія удода, между прочимъ пишетъ: „въ Московской (губ.) удода чрезвычайно рѣдка и скорѣе случайно, чѣмъ регулярно гнѣздящаяся птица. Обыкновеннѣе удода становится только въ губ. Ка-

лужской, Тульской и Рязанской. Далѣ на востокъ сѣверная граница области гнѣздоваго удода проходитъ, вѣроятно, черезъ Пензенскую и Симбирскую губ. въ губ. Самарскую и Уфимскую, хотя какъ залетная птица удода извѣстенъ и для Казанской¹⁾. И далѣ: „Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что удода гнѣздится непостоянно и въ очень ограниченномъ количествѣ у сѣвернаго предѣла своей области гнѣздоваго и гораздо чаще встрѣчается здѣсь только холостыми особями. Весьма вѣроятно, что лѣсистость сѣверной полосы средней Россіи служить для удода главнымъ препятствіемъ распространенія далѣ на сѣверъ“. Позднѣйшія наблюденія надъ этой птицей позволяютъ нѣсколько отодвинуть къ сѣверу только что приведенную границу. По имѣющимся у Г. П. Полякова свѣдѣніямъ (№ 3—4 „Орнитологическаго Вѣстника“ за 1911 г.) удода гнѣздится въ Покровскомъ уѣздѣ, Владимирской губерніи и здѣсь даже не рѣдко. Въ Нижегородской губ. удода встрѣчаются лѣтомъ, хотя и рѣдко, въ предѣлахъ, какъ кажется, всей губерніи. Гнѣздованіе удода отмѣчено для Семеновскаго уѣзда и является очень вѣроятнымъ для Макарьевскаго. Остановлюсь болѣе подробно на имѣющемся въ моемъ распоряженіи матеріалѣ. Въ тѣхъ мѣстахъ южной половины Нижегородской губ., гдѣ мнѣ приходилось бывать (уѣзды: Нижегородскій, Арзамасскій, Лукояновскій, отчасти также Княгининскій и Васильскій) удода мнѣ встрѣчался въ теченіе гнѣздоваго періода только въ Нижегородскомъ и Лукояновскомъ. Въ первомъ наблюдались особи, по всей вѣроятности, холостыя, кочующія. Въ Лукояновскомъ уѣздѣ удода я опредѣлялъ по крику. Это было въ концѣ мая 1911 г. въ поимѣ Алатыря близъ с. Кемли. Что это не была *Cuculus optatus* Gould, здѣсь тогда же замѣченная, доказываетъ то, что въ июнѣ того же года въ этомъ мѣстѣ удода былъ убитъ. Въ сѣверной половинѣ Нижег. губ. удода наблюдался чаще. Вотъ факты: 21.VII.905 удода былъ убитъ подъ Кадницами, Макарьевскаго уѣзда (на прав. бер. Волги). Чучело этого экземпляра я видѣлъ въ Музеѣ Нижегородскаго Земства. Въ половинѣ мая 1910 года я наблюдалъ въ 45 верстахъ на востокъ отъ Лыкова-Никольскаго, Семеновскаго уѣзда, удода, кричащаго среди безграничнаго лѣснаго пространства, далеко отъ сѣль, полей и луговъ въ рѣдкомъ высокоствольномъ сосновомъ бору, т.-е. въ мѣстѣ для удода настолько необыкновенномъ, что я сначала, не видя птицы, предположилъ, что имѣю дѣло съ *Cuculus optatus* и убѣдился лишь, когда совершенно ясно разсмотрѣлъ птичку. Позднѣе, 1.VI., я снова встрѣтилъ удода и тамъ

же среди лѣса въ 8 верстахъ отъ ближайшаго села Нестяръ, Макарьевскаго уѣзда. На этотъ разъ удода (какъ кажется, не одинъ, а два) держался среди рѣдкихъ молодыхъ листовыхъ деревьевъ, выросшихъ въ обширной лѣсной „гари“ (пожарище). Крестьяне Семеновскаго и Макарьевскаго уѣздовъ не разъ начинали разспрашивать меня о появившейся у нихъ рѣдкой птицѣ, изъ описанія которой всегда легко можно было узнать удода. Одинъ изъ мужиковъ Лыкова, Семеновскаго у., нѣкто Носовъ, очень удачно передавалъ мнѣ крикъ и спену ухаживанія самца удода за самкой¹⁾. Въ 1911 году, коллектируя въ Макарьевскомъ уѣздѣ на лѣвомъ берегу Волги въ Жуковскомъ затонѣ (противъ Кадницъ, гдѣ, напоминая, въ 1905 г. былъ убитъ удода), я наблюдалъ двухъ усердно кричавшихъ удодовъ, изъ которыхъ 27.IV. одного убилъ, а на другой день въ томъ же мѣстѣ была убита ♀ съ хорошо развитымъ яичникомъ. Повидимому около мѣстѣ: Кадницы—Жуковскій затонъ удода живутъ ежегодно. Здѣсь мнѣ даже пришлось слышать отъ одного охотника правильное названіе этой птицы: удода. Въ этомъ же году, 10.VII (1) въ окрестностяхъ села Красная Рамень, Семеновскаго уѣзда, была найдена кладка яицъ удода. Объ этомъ мнѣ любезно сообщилъ Н. А. Покровский. Въ Балахнинскомъ уѣздѣ удода наблюдался мною 20.VI.912 у ст. Сейма М.-Н. ж. д. На основаніи изложеннаго я считаю удода рѣдкой гнѣздящейся птицей Нижегородской губерніи.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 27.IV.911 ♂ Жуковскій затонъ, Макарьевск. у.
- 2) 28.IV.911 ♀ ibidem.

135. *Cuculus canorus canorus* (L.).

Cuculus canorus, L. Мезенбургъ (5), стр. 330.

Кукушка—одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.V.909 ♂ ad. Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 24.VII.909 juv. ibidem.
- 3) 1.V.911 ♀ ad. Красный Яръ (село), Макарьевск. у.
- 4) 21.V.911 ♀ ad. Р. Калша, Лукояновск. уѣзда.
- 5) 29.VII.911 ♂ juv. Нов.-Ичалки, Лукояновск. уѣзда.

¹⁾ Недавно я получилъ экземпляръ ♂ удода, добытаго 13.V.912 моимъ братомъ Б. В. Серебровскимъ у Лыкова.

136. *Cuculus optatus* (Gould).*Cuculus intermedius*, Vahl. Мензбирь (5), стр. 335.

Для Семеновского и Макарьевского уездов это нередкая птица. В этих уездах я слышал крики шести птиц, из которых две были добыты. Местные жители хорошо знают этот крик. Несомненно, что она бывает здесь правильно каждый год. Эту же кукушку я встретил и в лесах по р. Алатырю в Луколинском уезде: около Козулейского кордона, где я коллектировал в конце мая, в продолжение недели ежедневно перекликались 2 кукушки. Птицы были так осторожны, что мне не удавалось убить их и даже рассмотреть хорошо удалось только однажды. На Алатырь, на границе Нижегородской и Симбирской губ. в конце июня мною было добыто несколько молодых кукушек. Одну из них я склонен считать *C. optatus* Gould, основываясь на небольшой длине крыльев и хвоста (184 и 141 мм.), а также на характере окраски перьев под крылышком. Строго говоря, это определение не может быть очень надежным в виду возраста кукушки. В Арзамасском уезде я этих кукушек не нашел, но крестьяне, когда я воспроизводил им крик этой птицы, определенно говорили, что так кричит кукушка. Следовательно возможно, что *C. optatus* бывает и здесь, но, вероятно, редко. Нахождение этой птицы в Нижегородской губ. нельзя было предвидеть. Дело в том, что она не найдена Русским в северо-западных уездах Казанской губ. и не известно, чтобы кто-нибудь находил ее в Симбирской. В списке птиц Костромской губ. Кириичникова (материалы и т. д., стр. 412) автор приводит *C. intermedius*, ссылаясь на один экземп. Но криков малой кукушки он не слышал, а потому один экземпляр, подошедший по размерам к *C. optatus*, не может служить достаточно убедительным доказательством присутствия этой птицы в Костромской губ. Таким образом самым западным углом области распространения *C. optatus* будет пока Нижегородская губерния. Вообще малая кукушка отличается от обыкновенной малыми размерами, что заметно и на лету, но в размерах как той, так и другой наблюдаются значительные половые, возрастные и индивидуальные колебания. Hartert в „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ приводит для крыла *C. optatus* Gould размеры от 184 до 215 мм. Но бывают экземпляры с значительно более длинными крыльями. Напр., один из ♂♂,

добытых мною в Семеновском уезде, имеет крыло равное 221 мм., т.-е. больше, чем у иной *C. canopus*. Замечу здесь, что в данном случае в точности определения не может быть сомнения: этот экземп. имеет более широкия, чем у *C. canopus*, черныя полосы на нижней стороне, белая без темных полос перья под крылышком и, что очень важно, найден мной кричащим характерное для *C. optatus* „ут-ут-ут“. Другой самец, убитый под Лыковым, имеет нормальные для этого вида размеры—крыло 196 и хвост 160 мм., нормальную окраску перьев под крылышком, но полосы нижней стороны совсем как у *C. optatus*. Вообще возможно, что имеются гибриды между этими двумя видами кукушек. Крик *C. optatus*, как известно, очень напоминает крик удода, но отличается большей мощностью и грубостью. Кто слышал и ту и другую птицу, тот на расстоянии 200—300 шагов не ошибется. *C. optatus* держится в тех же станциях, что *C. canopus*.

Экземпляры коллекции:

- 1) 13.V.910 ♂ Берег Керженца, 20 верст ниже Лыкова.
- 2) 16.V.911 ♂ Лыково, Семеновского уезда.
- 3) 29.VII.911 ♀ Нов.-Ичалки, Луколинск. уезда.

137. *Iynx torquilla* (L.).*Iynx torquilla*, L. Мензбирь (5), стр. 339.

Вертиголовка довольно обыкновенна в Нижегородской губ. Прилетает во второй трети апреля, а в 1910 г., когда была ранняя весна, первых вертиголовок, по словам лесничего В. А. Семенова, можно было видеть 6.IV.

Экземпляры коллекции:

- 1) 11.VI.909 ♀ (?) Фроловское, Нижегородского уезда.
- 2) 31.V.910 ♂ Пестярь, Макарьевск. у.
- 3) 21.IV.911 ♀ } Остров на Волге у Безводнаго.
- 4) 21.IV.911 ♂ }
- 5) 2.V.921 ♂ Красный Яр, Макарьевск. у.

138. *Dryocopus martius* (L.).*Picus martius*, L. Мензбирь (5), стр. 345.

Я встречал желну во всех больших лесах Нижегородской губ. В южной половине этот дятел малочисленнее, чем в северной.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.VIII.909 ♀ Фроловское, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 12.VIII.909 ♀ (?) *ibidem*.
- 3) 5.V.910 ♂ Дер. Красн. Яришка, Макарьевскаго уѣзда.
- 4) 16.V.910 ♂ Лыково, Семеновскаго уѣзда.
- 5) 24.VII.911 ♀ juv. Н-Ичалки, Лукояновск. уѣзда.

139. *Dendrocopus major major* (L.).

Picus major, L. Меззбиръ (5), стр. 351.

Picus major относится къ числу самыхъ обыкновенныхъ дятловъ. Гнѣздится обыкновенно въ большомъ количествѣ какъ въ тайгѣ, такъ и въ островныхъ лѣсахъ. По окраскѣ низа здѣсь встрѣчаются какъ темныя, такъ и очень блѣдыя птицы.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 3.V.910 ♂ Окр. дер. Красный Яришка, Макарьевск. у.
- 2) 6.VII.911 ♂ Стар. Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 3) 6.VII.911 ♀ *ibidem*.
- 4) 28.XII.911 ♂ Окр. Н.-Новгорода.

140. *Dendrocopus minor minor* (L.).

Picus minor, L. Меззбиръ (5), стр. 358.

Этотъ дятель значительно рѣже предыдущаго. Осенью и зимой количество ихъ возрастаетъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 22.V.910 ♂ Окр. Н.-Новгорода (Марьяна Роца).
- 2) 22.XII.910 ♂ *ibidem*.

141. *Dendrocopus leucotos leucotos* (Bechst.).

Picus leucotos, Bechst. Меззбиръ (5), стр. 363.

Бѣлоспинный дятель встрѣчался мнѣ какъ въ Заволжѣ, такъ и въ южной половинѣ губерніи. Всюду онъ значительно рѣже, чѣмъ *P. major*. Молодыхъ я находилъ обыкновенно въ началѣ іюня. Переходныхъ къ сибирской формѣ у меня нѣтъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 6.VI.910 juv. Нестіарь, Макарьевскаго уѣзда.
- 2) 14.VI.910 juv. Дер. Аниенка на Ветлугѣ, Макарьевск. у.
- 3) 23.IV.911 ♀ Жуковский затонъ, Макарьевскаго у.
- 4) 25.IV.911 ♂ *ibidem*.
- 5) 20.VII.911 ♀ juv. Пойма Калши, Лукояновск. у.
- 6) 27.VII.911 ♀ juv. *ibidem*.
- 7) 26.V.III.911 ♂ Жуковский затонъ на Волгѣ.

142. *Picoides tridactylus tridactylus* (L.).

Picus tridactylus, L. Меззбиръ (5), стр. 371.

Трехпалый дятель былъ добытъ въ Нижегородской губерніи лѣтомъ 2 раза: мною 26.V.910 въ Макарьевскомъ уѣздѣ и Н. А. Покровскимъ въ окр. Н.-Новгорода 15.VI.907. На основаніи этого я считаю его гнѣздящимся въ Нижегородской губ.

Экземпляръ коллекціи:

- 26.V.910 ♂ ad. Нестіарь, Макарьевскаго уѣзда.

143. *Picus viridis* (L.).

Cecinus viridis, L. Меззбиръ (5), стр. 374.

Мѣстное названіе: *медля* (Семеновск. и Макарьевск. уу.).

Зеленый дятель очень обыкновененъ на гнѣздовѣ въ сѣверной половинѣ губерніи. Гнѣздится и въ Арзамасскомъ уѣздѣ, но въ Лукояновскомъ я его не встрѣчалъ. На сѣверѣ губерніи онъ держится обыкновенно въ смѣшанныхъ, состоящихъ изъ осины, березы и ели лѣсахъ. На еловыхъ деревьяхъ этотъ дятель особенно часто держится. Осенью количество зеленыхъ дятловъ увеличивается. Однажды я убилъ молодого самца, уродливо окрашеннаго. Отъ нормально окрашенныхъ онъ отличается слѣдующимъ: бровь желтовато-зеленая; крылья и спина оливково-желтыя (а не оливково-зеленыя); надхвостье оранжево-желтое (а не зеленовато-желтое); горло съ едва замѣтнымъ палевымъ налетомъ; весь низъ съ хорошо выраженнымъ палевымъ налетомъ; рисунокъ перьевъ нигдѣ не измѣненъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.V.910 ♂ ad. Лыково-Никольское, Семеновск. у.
- 2) 22.VIII.910 ♂ juv. Хахалы, Семеновск. у.
- 3) 24.IV.911 ♂ } Жуковский затонъ, Макарьевскаго у.
- 4) 27.IV.911 ♂ }
- 5) 8.VII.911 ♂ juv. aberr. } Ст. Пустынь, Арзамасскаго у.
- 6) 11.VII.911 ♂ juv. }

144. *Picus canus* (Gm.).

Picus canus, Gm. Мензбирь (5), стр. 378.

" " " Рузский (4), стр. 174.

Сѣдоголовый дятель въ Нижегородской губ. на гнѣздовьяхъ не найденъ. Да и на пролетѣ убитъ пока лишь однажды: 22.IX.900 подл. П.-Новгородомъ Н. А. Покровскимъ. Если же упомянуть еще о имѣющемся у меня январскомъ экземплярѣ ♂ ad. изъ окрестн. с. Борь, Семеновскаго у., то этимъ и исчерпываются наши свѣдѣнія о пахожденіи *P. canus* въ Нижегородск. губ. Данныя относительно сосѣднихъ губ. небезынтересны: въ Костромской (по Кирпичникову) не найденъ, въ Тамбовской не гнѣздится, въ Московской если и гнѣздится, то во всякомъ случаѣ очень рѣдко, зато въ Казанской, по Рузскому (l. c.), нѣтъ *G. viridis* и очень обыкновененъ *Pec. canus*.

Пока, такимъ образомъ, сѣдоголоваго дятла можно причислить къ рѣдкимъ пролетнымъ и, можетъ быть, зимующимъ птицамъ Нижегородской губерніи.

Экземпляръ коллекціи:

4.I.913 ♂ окр. села Борь, Семеновскаго уѣзда.

145. *Alcedo ispida ispida* (L.).

Alcedo ispida, L. Мензбирь (5), стр. 381.

Зимородокъ въ Нижегородской губ. найденъ гнѣздящимся всюду, гдѣ мнѣ приходилось коллектировать. Встрѣчается всюду, за исключеніемъ Керженца, рѣдко, что зависитъ отъ его умѣнья скрываться, въ дѣйствительности же онъ довольно обыкновененъ. Особенно обилень этими милыми птичками Керженецъ. Тамъ я встрѣтилъ парочки зимородковъ приблизительно на разстояніи одной версты другъ отъ друга. Отмѣченъ мной гнѣздящимся: на Керженцѣ, на нѣкоторыхъ озерахъ Макарьевскаго уѣзда (Свѣтломъ, Мал.-Плотовомъ), въ поймѣ Волги, на Рудьмѣ, Серезѣ и Алатырѣ. По Рузскому, гнѣздится на Сурѣ. Прилетаютъ зимородки, вѣроятно, около середины апрѣля, потому что въ концѣ этого мѣсяца я убилъ однажды самку съ почти готовымъ яйцомъ. 16.V. на Керженцѣ мнѣ вырыли кладку яицъ (4 шт.).

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.IV.910 ♂ } Керженецъ близъ дер. Красный Яршка, Макарьевскаго уѣзда.
- 2) 29.IV.911 ♀ }
- 3) 7.V. 910 ♂ Лыково, Семеновск. уѣзда (на Керженцѣ).
- 4) 15.VII.911 ♀ юв. Оз. Глубокое на Серезѣ въ Арзамаск. у.

Passeres.

146. *Otocoris alpestris* (L.).

Otocoris alpestris, L. Мензбирь (5), стр. 423.

Н. А. Покровскій встрѣтилъ стайку въ 7 экз. этихъ птицъ близъ Н.-Новгорода 1.IV.1901. Изъ этой стайки былъ убитъ одинъ экземпляръ. Извѣстенъ случай поимки этой птицы весной птицеловами.

147. *Alauda arvensis* (L.).

Alauda arvensis, L. Мензбирь (5), стр. 425.

Обыкновенная птица.

148. *Lullula arborea* (L.).

Alauda arborea, L. Мензбирь (5), стр. 452.

Юла гнѣздится въ Нижегородской губ. Въ южной половинѣ гораздо болѣе обыкновенна, нежели въ сѣверной. Прилетаетъ въ первыхъ числахъ апрѣля.

Экземпляръ коллекціи:

25.IV.911 ♂ Жуковский затонъ, Макарьевскаго у.

149. *Corvus corax* (L.).

Corvus corax, L. Мензбирь (5), стр. 457.

Воронъ встрѣчается въ Нижегородской губ. круглый годъ.

150. *Truраносорax frugilegus* (L.).

Corvus frugilegus, L. Мензбирь (5), стр. 469.

Обыкновенная гнѣздящаяся птица Нижегородской губ.

151. *Corvus cornix* (L.).

Corvus cornix, L. Мензбирь (5), стр. 469.

Ворона—обыкновенная осѣдлая птица. Она живетъ и не только около жилья: ее можно встрѣтить также среди обширныхъ болотъ и по берегамъ озеръ Макарьевскаго и Семеновскаго уѣздовъ далеко отъ какого-либо строенія. Осенью во второй половинѣ августа я встрѣчалъ большія стаи воронъ, кормящихся по отмелямъ Волги. Эти стаи въ большинствѣ случаевъ очень легко подпускали на выстрѣлъ и не только съ лодки, но и съ подхода. Если принять во вниманіе, что

ворона въ Поволжьѣ одна изъ самыхъ гонимыхъ птицъ, что здѣсь по этой птицѣ не только учатся стрѣлять, но и просто разряжаютъ при случаѣ ружья многочисленные охотники, то невольно является мысль: не пролетныя ли это птицы? Мѣстовыя несомнѣнно осторожныѣ.

Экземпляръ коллекціи:

16.XII.911 ♀ (?) Окр. Н.-Новгорода.

152. *Colaptes monedula collaris* (Drum.).

Colaptes monedula collaris, Drum. Мезѣбирь. (5), стр. 477.

Очень обыкновенная птица. Гнѣздится обычно среди селеній, но въ старыхъ рѣдкихъ осокоревыхъ рощахъ Волжской поймы гадки гнѣздятся совсѣмъ не рѣдко. Гнѣзда въ такихъ случаяхъ я находилъ всегда въ дуплахъ деревь.

Экземпляръ коллекціи:

1) 25.XII.910 ♂ Окр. Н.-Новгорода.

2) 18.V.911 ♀ Пойма Алатыря, Лукояновск. у.

153 *Pica pica* (L.).

Pica caudata, Ger. и *P. leucoptera*, Gould. Мезѣбирь. (5), стр. 483 и 487.

Обыкновенная осѣдлая птица Нижегородской губ. Кладки яицъ находили въ первой половинѣ апрѣля.

Экземпляръ коллекціи:

1) 16.IV.911 ♂ Кстово, Нижегородскаго уѣзда.

2) 16.IV.911 ♀ *ibidem*.

3) 22.IV.911 ♂ Жуковский затонъ на Волгѣ.

4) 25.IV.911 ♂ *ibidem*.

5) 29.VII.911 ♀ Дер. Н.-Ичалки, Лукояновскаго уѣзда.

6) 25.VIII.911 ♀ (?) Жуковский затонъ на Волгѣ.

154. *Garrulus glandarius* (L.).

Garrulus glandarius, L. Мезѣбирь. (5), стр. 490.

Ронжа, какъ здѣсь зовутъ эту птицу, гнѣздится во всей губерніи въ большомъ количествѣ.

Обыкновенно мнѣ встрѣчались экземпляры типичной окраски и лишь однажды попалась сойка съ очень темной головой, почти какъ у *G. kryniskii* (Kalen.).

Экземпляръ коллекціи:

1) 20.VIII.910 ♀ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.

2) 27.IV.911 ♂ Жуковский затонъ, Макарьевскаго у.

3) 2.V.911 ♂ Красный Яръ, Макарьевскаго уѣзда.

155. *Perisoreus infaustus* (L.).

Garrulus infaustus, L. Мезѣбирь. (5), стр. 499.

Кукша гнѣздится только въ сѣверной таежной половинѣ Нижегородской губерніи, гдѣ и добытъ ее въ Семеновскомъ уѣздѣ и на Ветлугѣ. Въ настоящее время она очень рѣдка, но по рассказамъ не такъ давно была здѣсь обыкновеннѣе.

Экземпляръ коллекціи:

1) 13.VI.910 ♀ Дер. Аппенка на Ветлугѣ, Макарьевск. у.

2) 20.VIII.910 ♂ *juv.* Хахалы, Семеновскаго уѣзда.

3) 20.VIII.910 ♀ *juv. ibidem*.

Nucifraga caryocatactes subsp.?

Орѣховку я встрѣтилъ во второй половинѣ мая 1910 г. близъ Лыкова, Семеновскаго у. Тогда же ее наблюдалъ неподалеку отъ того же мѣста лѣсничій М. Т. Здорикъ. Кромѣ этого случая орѣховка въ гнѣздовую пору мнѣ не встрѣчалась, но, вѣроятно, въ небольшомъ количествѣ она гнѣздится, по крайней мѣрѣ въ таежной части Нижегородской губ. Къ какому подвиду относились замѣченные подъ Лыковымъ орѣховки, къ сожалѣнію, остается неизвѣстнымъ: птицы добыты не были. Здѣсь можно ожидать на гнѣздовѣ какъ типичную орѣховку, такъ и уклоняющуюся въ сторону *N. c. macrohynchos* (Brehm).

156. *Nucifraga caryocatactes macrohynchos* (Brehm).

Nucifraga macrohynchos Brehm. Lehrb. Nat. europ. Vögel. I, p. 103.

Я имѣю изъ Нижегородской губ. только такихъ орѣховокъ. Добыты осенью 1910 (1 экз.) и 1911 годовъ. Пролетъ 1911 года былъ чрезвычайно обилень, что было отмѣчено и для другихъ губерній Европейской Россіи. Какъ извѣстно, *macrohynchos* отличается отъ типичной главнымъ образомъ болѣе тонкимъ и длиннымъ клювомъ. Я промѣрилъ 21 экз. *N. c. macrohynchos* (13 изъ центр. губ. Европ. Россіи, осеннихъ миграцій и 7 экз. изъ Минусинскаго у. и съ Алтая, лѣтн. и осеннихъ) и 6 экз. *N. c. caryocatactes* (5 Смол. губ.,

лѣтнія и 1 изъ Московск. губ., ноябрьская). Большая часть экзempl. изъ колл. П. П. Сушкина. Привожу *средніе* размѣры клюва того и другого подвидовъ въ миллиметрахъ.

	Длина клюва по коньку. Отъ конца до лобн. оперен.	Высота клюва на уровн. носдри.	Ширина клюва на ур. носдри.
<i>N. s. macrohynchos.</i>	48	14,4	14,8
<i>N. s. sargocatactes.</i>	44,6	16,5	17,5

Высота и ширина клюва являются самыми надежными признаками; тогда какъ длина въ отдѣльныхъ случаяхъ можетъ значительно уклоняться отъ среднихъ размѣровъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 28.VIII.910 ♀ Хахалы, Семеновскаго у.
- 2) 13.VIII.911 ♀ juv. Жуковский затонъ, Макарьевск. у.
- 3) 24.VIII.911 ♀ juv. ididem.
- 4) 24.VIII.911 ♂ ididem.

157. *Sturnus vulgaris intermedius* (Prazák).

Sturnus vulgaris intermedius Prazák, Ornith. Monatsber. 1895, стр. 144.

Обыкновенная гнѣздящаяся птица Нижегородской губерніи. Неоднократно находилъ я скворцовъ въ лѣсу, почти всегда рѣдкомъ смѣшанномъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ ближайшаго жилья. Охотно держится въ поймахъ рѣкъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 8.IV.911 ♂ Окр. Н. Новгорода. Изъ стайки въ 6 экз.
- 2) 25.V.911 ♀ ad. Пойма р. Калши, Лукояновск. у.

158. *Plectrophanes nivalis* (L.).

Plectrophanes nivalis, L. Мензбиръ. (5), стр. 527.

Подорожникъ бываетъ въ Нижегородской губ. въ серединѣ зимы. О его пролетахъ я знаю больше со словъ Н. А. Покровскаго, который добылъ 21.XII.908 ♂ изъ стайки штукъ въ 30 въ окр. дер. Пи-

киной, Семеновскаго уѣзда. (Этотъ экзempl. находится въ коллекціи Музея Нижегородскаго Земства.) 22.XII.911 я видѣлъ стайку въ 7 экз. этихъ птицъ подъ Н.-Новгородомъ.

159. *Synchramus schoeniclus* (L.).

Emberiza schoeniclus, L. Мензбиръ. (5), стр. 535.

Камышевую овсянку я наблюдалъ всюду въ долинѣ Волги, въ Нижегородскомъ уѣздѣ, въ Арзамасскомъ и Лукояновскомъ. Въ южной половинѣ губ. она несомнѣнно обыкновенна, но въ сѣверной таежной части она встрѣчалась мнѣ лишь на Ветлугѣ. Первыхъ видѣлъ съ половины апрѣля.

Экземпляръ коллекціи:

- 17.VI.909, ♂ ad. Кудьма, Нижегородскій уѣздъ.

160. *Emberiza citrinella erythrogenys* (Brehm).

Emberiza citrinella erythrogenys Brehm. Hartert. (11) p. 169.

Гнѣздящаяся *Emb. citrinella* изъ Нижегородской губ. въ общемъ сходна по окраскѣ съ овсянками другихъ губерній центральной Россіи, но среди зимнихъ экзempl. коллекціи Нижегородскаго Земскаго Музея имѣется 2 экзempl. (№№ 433 и 671, ♀ и ♂), отличающіеся отъ овсянокъ (соотвѣтв. пера) Тульской, Московской и Уфимской губ. тѣмъ, что перья спины менѣе рыжеваты, преобладающій тонъ ихъ оливково-ржаво-бурый; темныя наствольныя полоски шире; перья нижней части спины (Bügel) лишь немного рыже въ верхнихъ и имѣютъ у экз. № 433 ♀ темныя настволья, тогда какъ у овсянокъ другихъ губ. эти перья рыжаго цвѣта, очень немного потемнѣе, или совсѣмъ не отличающіяся отъ перьевъ надхвостья и имѣютъ очень узкія, иногда едва замѣтные, наствольные штрихи. Въ слѣдствіе такихъ особенностей обѣ птички сверху выглядятъ потемнѣе другихъ. Можетъ быть, это та форма, которую Hartert считаетъ за типичную *Emb. citrinella*?

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.VI.906 ♂ Дер. Фроловская, Нижегородскаго у.
- 2) 4.VI.910 ♂ Несгарь, Макарьевскаго у.

161. *Emberiza aureola* (Pall.).

Emberiza aureola, Pall. Мензбиръ. (5), стр. 570.

Очень обыкновененъ дубровникъ въ долинѣ Волги и не рѣдокъ къ югу отсюда. Въ сѣверной части Нижегород. губ. я находилъ его довольно часто на Ветлугѣ. На Керженцѣ очень рѣдокъ.

Экземпляръ коллекціи:

1) 17.VI.911, ♂. Ветлуга близъ Апшенки, Макарьевск. у.

162. *Emberiza hortulana* (L.).

Emberiza hortulana, Briss. Мензбиръ (5), стр. 545.

Садовая овсянка найдена довольно обыкновенной въ окрестностяхъ Н.-Новгорода.

Экземпляръ коллекціи:

23.VI.913, ♂, Окрестн. Н.-Новгорода.

163. *Loxia curvirostra curvirostra* (L.).

Loxia curvirostra, L. Мензбиръ. (5), стр. 577.

Этотъ клестъ вообще довольно обыкновененъ по хвойнымъ лѣсамъ посѣщенныхъ мною мѣстъ. Иногда изъ-за недостатка корма перебирается въ лиственные лѣса.

164. *Loxia bifasciata* (Brehm).

Loxia bifasciata, Brehm. Мензбиръ. (5), стр. 583.

Бѣлокрылый клестъ появляется въ Нижегородской губ. осенью, иногда начиная съ первыхъ чиселъ сентября. Чаше въ незначительномъ количествѣ. Зимуетъ ли этотъ клестъ въ Нижегородской губ. — мнѣ не извѣстно. Хотя у меня имѣется экземпляръ, пойманный 3.III, но онъ пойманъ въ городѣ, слѣдовательно могъ быть вынужденъ зимою изъ клѣтки.

Экземпляръ коллекціи:

13.III.911 ♀ Н.-Новгородъ.

165. *Loxia pityopsittacus* (Borkh.).

Loxia pityopsittacus, Bchst. Мензбиръ. (5), стр. 581.

Въ 1911 г. осенью, на Нижегородскомъ рынкѣ оказалось 4 клеста этого вида, пойманные въ окрестн. Н.-Новгорода. 2 изъ нихъ — старые самцы.

Отношу этотъ видъ къ числу залетающихъ въ неодинаковомъ числѣ и, можетъ быть, не ежегодно птицъ Нижегородской губ.

Экземпляръ коллекціи:

14—15.IX.911 (♀) Окрестн. Н.-Новгорода.

166. *Pinicola enucleator* (L.).

Pinicola enucleator, L. Мензбиръ. (5), стр. 585.

Щуры появляются здѣсь въ началѣ зимы, почти ежегодно. Я этихъ птицъ видѣлъ въ Н.-Новгородѣ у птицелововъ въ концѣ 1909 и 1910 годовъ.

Экземпляръ коллекціи:

11.XII. 910 ♂ Н.-Новгородъ. Окрестности.

167. *Pyrrhula pyrrhula* (L.).

Pyrrhula coccinea, De Sel. Мензбиръ. (5), стр. 589.

Я нашелъ эту птичку на гнѣздовъ только въ сѣверной половинѣ Нижегородской губерніи. Да и тамъ она очень рѣдка. Въ 1910 г. я встрѣчалъ синьгирей въ слѣдующихъ лѣсахъ: на рѣчкѣ Ялокшѣ (стар. ♂) въ Макарьевскомъ уѣздѣ въ первыхъ числахъ мая, затѣмъ наблюдалъ парочку въ половинѣ мая подъ Лыковымъ, Семеновск. у. и 17.VI нашелъ выводокъ на Ветлугѣ.

Экземпляръ коллекціи:

17.VI.910 juv. Богданово (на Ветлугѣ), Макарьевск. у.

168. *Carpodacus erythrina* (Pall.).

Carpodacus erythrinus, Pall. Мензбиръ. (5), стр. 596.

Гнѣздится въ большомъ количествѣ.

Экземпляры коллекціи:

1) 27.V. 909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегород. у.

2) 5.V. 909 ♂ ad. } ibidem.

3) 5.V. 909 ♂ ad. }

4) 17.VI.909 ♂ ad. }

5) 4.VI.910 ♂ semiad. Нестіаръ, Макарьевскаго уѣзда.

169. *Acanthis linaria linaria* (L.).

Acanthis linaria, L. Мензбиръ. (5), стр. 607.

Acanthis holboelli, Brehm. Мензбиръ. (5), стр. 612.

На гнѣздовъ четку я не нашелъ, но очень возможно, что она гнѣздится въ сѣверной ташной полосѣ, потому что по Мензбиру (l. c.) гнѣздится въ Московской и Тверской губерніяхъ и, вѣроятно, гнѣздится въ сѣверной части Казанской. Я встрѣчалъ чететокъ весной

до 17.IV включительно и въ это время чечетки очень обыкновенны, что до нѣкоторой степени можетъ служить указаніемъ на то, что южная граница гнѣздовой области этой птицы проходитъ если не черезъ Нижегородскую губернію, то во всякомъ случаѣ гдѣ-то неподалеку. Бываютъ годы, какъ напр., 1910, когда чечетокъ осенью и зимой почти не бываетъ.

Экземпляръ коллекціи:

21.III.911 ♂ „Кадочка“ въ окр. Н.-Новгорода.

170. *Acanthis linaria exilipes* (Coues).

Acanthis exilipes, Coues. Меназбирь. (5), стр. 611.

Бѣлая чечетка бываетъ зимой въ Нижегородской губ., но какъ и всюду въ центральныхъ губерніяхъ, не ежегодно. Въ концѣ 1909 года на рынкѣ въ Н.-Новгородѣ были въ небольшомъ количествѣ чечетки этого вида, тогда какъ въ то время обыкновенныхъ птицеловы почти не встрѣчали. Въ 1910 г. чечетокъ того и другого вида было, наоборотъ, очень много.

Экземпляръ коллекціи:

6.III.910 ♀ Окр. Н.-Новгорода.

171. *Linota cannabina* (L.).

Acanthis cannabina, L. Меназбирь. (5), стр. 613.

Коноплянка очень обыкновенна на гнѣздовѣ къ югу отъ Волги. Сѣвернѣе же этой границы встрѣчается рѣже, но въ общемъ все же не рѣдка.

Экземпляры коллекціи:

- 1) VII.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородскаго у.
- 2) 17.VII.911 ♂ ad. Ст. Пустынь, Арзамасскаго у.
- 3) 22.VII.911 ♂ Пойма Алатыря въ Лукояновскомъ у.

172. *Fringilla montifringilla* (L.).

Fringilla montifringilla, Briss. Меназбирь. (5), стр. 621.

Fringilla montifringilla, Briss. Кирпичниковъ. (14).

Мнѣ эта птица на гнѣздовѣ не встрѣчалась, но принимая во вниманіе, что въ іюлѣ юрки были находимы сравнительно рано—16.VII.907 близъ ст. „Растяпино“ Московско-Нижег. ж. д. былъ убитъ ♂, поступившій въ коллекцію Естеств. Музея Нижегородскаго Земства—и

что въ Ветлужскомъ и Варнавинскомъ уѣздахъ, Костромской губерніи, юрки, по Кирпичникову (l. c.), „встрѣчаются въ значительномъ количествѣ“, необходимо признать, что эта птица должна гнѣздиться въ сѣверной части Нижегородской губ. хотя бы мѣстами и въ небольшомъ количествѣ. Осенью на пролетѣ юрки очень обыкновенны.

173. *Fringilla coelebs* (L.).

Fringilla coelebs, L. Меназбирь. (5), стр. 626.

Гнѣздится во множествѣ.

Экземпляръ коллекціи:

11.VIII.910 ♂ juv. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.

174. *Passer domestica* (L.).

Passer domesticus, Briss. Меназбирь. (5), стр. 632.

175. *Passer montana* (L.).

Passer montanus, Briss. Меназбирь. (5), стр. 636.

Оба воробья очень обыкновенны.

176. *Chrysomitris spinus* (L.).

Chrysomitris spinus, L. Меназбирь. (5), стр. 646.

Чижь, какъ гнѣздящаяся птица, найденъ въ Семеновскомъ, Макарьевскомъ и Нижегородскомъ уѣздахъ. Въ этихъ уѣздахъ, особенно въ послѣднемъ, онъ довольно обыкновененъ по хвойнымъ, преимущественно еловымъ лѣсамъ. На пролетѣ бываетъ въ большомъ количествѣ.

177. *Carduelis carduelis* subsp.?

Carduelis elegans, Stph. Меназбирь. (5), стр. 646.

Щеголь гнѣздится по всей губерніи, но неравномерно: на сѣверѣ, вълѣдствіе преобладанія сплошныхъ хвойныхъ боровъ, онъ малочисленъ, въ южной половинѣ обыкновененъ. Мнѣ извѣстно, что въ центральныхъ уѣздахъ Нижегородской губ. щеголь живетъ осѣло, отпосительно другихъ уѣздовъ свѣдѣній не имѣю.

Экземпляры коллекціи:

27.XI.909 ♂ Н.-Новгородъ.

178. *Coccothraustes coccothraustes* (L.).

Coccothraustes vulgaris, Pall. Меназбирь. (5), стр. 657.

Гнѣздованіе дубоноса констатировано въ окр. Н.-Новгорода, въ такъ наз. „Марьиной Рощѣ“. 23.V.912 было найдено два гнѣзда: съ 5-ю и съ 3-мя яйцами. У одного гнѣзда добыта самка. Гнѣзда, яйца и чучело ♀ хранятся въ Музеѣ Нижегородскаго Земства. Въ другихъ мѣстахъ Нижегородской губ. дубоносъ пока не найденъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) ♀ осень 1908 г. Окр. Н.-Новгорода.
- 2) 25.III.911 ♀ Н.-Новгородъ.

179. *Chloris chloris* (L.).

Chloris chloris, Briss. Меназбирь. (5), стр. 661.

Зеленушка гнѣздится и не рѣдка въ Нижегородскомъ, Арзамаскомъ, Лукояновскомъ и, вѣроятно, въ другихъ уѣздахъ южной половины губерніи. Въ Семеновскомъ и Макарьевскомъ въ гнѣздовую пору мнѣ не встрѣчалась, но въ концѣ апрѣля 1911 г. я добылъ спарившихся ♂ и ♀ въ Жуковскомъ затонѣ на Волгѣ (Макарьевскій у.) Н. А. Покровскій убилъ зеленушку 5.XII.912 г. въ окр. Печорскаго монастыря подъ Н.-Новгородомъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 4.VI.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 4.VI.909 ♀ ad. ibidem.
- 3) 24.IV.911 ♀ } Жуковскій затонъ на лѣвомъ бер. Волги, Макарьевскаго уѣзда.
- 4) 24.IV.911 ♂ }

180. *Certhia familiaris* (L.).

Certhia familiaris, L. Меназбирь. (5), стр. 669.

По даннымъ орнитологической литературы эта птичка въ небольшомъ количествѣ встрѣчается лѣтомъ въ губ. Пензенской, Тамбовской и Казанской. Слѣдовательно вполне возможно, что будетъ найдена и въ Нижегородской, за что говоритъ также сравнительно раннее нахожденіе ея— 5.VII—въ Арзамаскомъ уѣздѣ. Осенью и зимой это обыкновенная птица.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 5.VII.911 Пустынь, Арзамаскаго уѣзда.
- 2) " " " ibidem.
- 3) 18.XII.911 Окр. Н.-Новгорода.

181. *Riparia riparia* (L.).

Cotile riparia, Briss. Меназбирь. (5), стр. 179.

182. *Hirundo urbica* (L.).

Hirundo urbica, L. Меназбирь. (5), стр. 674.

183. *Chelidon rustica* (L.).

Hirundo rustica, L. Меназбирь. (5), стр. 686.

Всѣ три приведенныя ласточки очень обыкновенны на гнѣздовѣ въ описываемой области.

184. *Siphia parva* (Bechst.).

Muscicapa parva, Bechst. Меназбирь. (5), стр. 693.

Эта мухоловка довольно обыкновенная гнѣздящаяся птица Нижегородскаго уѣзда. На гнѣздовѣ же найдена въ Арзамаскомъ и Лукояновскомъ у.у. Въ сѣверныхъ уѣздахъ ее встрѣчалъ лѣтомъ Н. А. Покровскій. Въ половинѣ августа одинъ экземп. былъ пойманъ въ одномъ изъ садовъ Н.-Новгорода.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 26.V.911 ♂ ad. Калша, притокъ Алатыря, Лукоян. у.
- 2) 5.VI.911 ♂ ad. Пустынь, Арзамаскаго уѣзда.

185. *Hedymela atricapilla* (L.).

Muscicapa atricapilla, L. Меназбирь. (5), стр. 701.

Обыкновенная гнѣздящаяся птица нашей губерніи.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 10.VI.909 ♀ Дер. Фроловская, Нижегородск. у.
- 2) 8.VIII.910 ♂ Н.-Новгородъ.

186. *Muscicapa striata* (Pall.).

Muscicapa grisola, L. Меназбирь. (5), стр. 704.

Одна изъ обыкновенныхъ встрѣчающихся здѣсь птицъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 1.VI.909 ♀ ad. Дер. Фроловская, Нижегородск. уѣзда.
- 2) 22.VI.909 ♀ ad. ibidem.

Первая птица была снята съ гнѣзда, содержащаго 5 яицъ. Яйца эти были взяты. 22.VI въ томъ же гнѣздѣ сидѣла новая самка и было снова 5 яицъ.

187. *Ampelis garrulus* (L.).

Ampelis garrulus, L. Мензбирь. (5), стр. 708.

Свиристель зимою бывает ежегодно въ значительномъ количествѣ. Въ апрѣлѣ, въ первыхъ числахъ свиристелей еще можно наблюдать здѣсь стайками въ 10—15 штукъ.

Экземпляръ коллекціи:

10.XI.911 ♂ Окр. Н.-Новгорода.

188. *Lanius collurio* (L.).

Lanius collurio, L. Мензбирь. (5), стр. 717.

Очень обыкновенная птица.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 1.VI.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородскаго у.
- 2) 21.V.911 ♂ ad. Калша, Лукояновскаго уѣзда.
- 3) 22.V.911 ♂ ad. ibidem.
- 4) 13.VII.911 ♂ juv. } Ст.-Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 5) 13.VII.911 ♀ juv. }

189. *Lanius excubitor excubitor* L.

Lanius excubitor, L. Мензбирь. (5), стр. 728.

Lanius excubitor на пролетѣ весной и осенью встрѣчается не особенно рѣдко. Хотя я не нашелъ его на гнѣздовьяхъ, но вѣроятно, что въ очень незначительномъ количествѣ эта птица все же въ Нижегородской губ. гнѣздится. За это говорятъ прежде всего данныя орнитологической литературы для сосѣднихъ губерній. Онъ найденъ гнѣздящимся Рузскимъ въ Казанской губ., Кирпичниковымъ въ Костромской и по Полякову („Орнитолог. Вѣстникъ“ за 1911 г., № 3—4) во Владимирской. Въ Нижегородской губ. въ гнѣздовую пору этотъ сорокопуть былъ убитъ дважды. Первый разъ Н. А. Покровскимъ 14.V.907, ♂ ad., на Ветлугѣ въ окр. дер. Анненки и въ этомъ случаѣ, очень возможно, на гнѣздовьяхъ. Другой разъ сорокопуть былъ убитъ 18.VII.911 въ Арзамасскомъ уѣздѣ мной. Это былъ старый самецъ, больной (съ патологическими наростами на языкѣ и въ области горла), съ очень жалкимъ рѣдкимъ опереніемъ.

Экземпляръ коллекціи:

18.VII.911 ♂ ad. Окр. Стар.-Пустыни, Арзамасск. у.

190. *Lanius excubitor major* (Pall.).

Lanius garrax, Brehm. Мензбирь. (5), стр. 732.

Этотъ сорокопуть бываетъ въ Нижегородской губ. на пролетѣ. Я видѣлъ экземпляръ, убитый весной, когда еще лежалъ кой-гдѣ снѣгъ, подъ Н.-Новгородомъ въ коллекціи любителя Макарова. Осенній экземпляръ имѣется въ Музеѣ Нижегородскаго Земства (25.IX.911 окр. Страхова). Интересно, что во Владимирской губ. въ окр. Орѣхова-Зуева этотъ сорокопуть былъ однажды убитъ 3.VIII.895. Этотъ экземпляръ я видѣлъ въ коллекціи проф. П. П. Сушкина. Дата написана рукой Ф. К. Лоренца.

191. *Oriolus oriolus* (L.).

Oriolus galbula, L. Мензбирь. (5), стр. 735.

Очень обыкновенная птица. Первыхъ прилетѣвшихъ слышалъ 29.IV.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 21.VII.911 juv. Пойма Калши, Лукояновскаго у.
- 2) 23.VII.911 ♂ juv. ibidem.

192. *Anthus pratensis* (L.).

Anthus pratensis, Briss. Мензбирь. (5), стр. 761.

A. pratensis найденъ Н. А. Покровскимъ на гнѣздовьяхъ въ Семеновскомъ уѣздѣ близъ дер. Пикиной. Попадался также на весеннемъ и осеннемъ пролетахъ. 4 экземпляра, добытыхъ въ разное время въ окр. названной деревни, находятся въ Музеѣ Нижегородскаго Земства.

193. *Anthus trivialis* (L.).

Anthus arboreus, Briss. Мензбирь. (5), стр. 753.

Гнѣздится въ огромномъ количествѣ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 21.VI.909 ♀ ad. Фроловская, Нижегородскаго у.
- 2) 29.IV.910 ♂ ad. Близъ устья Керженца.
- 3) 13.IV.911 ♀ Окрестн. Н.-Новгорода.

194. *Anthus cervina* (Pall.).

Anthus cervinus, Pall. Мензбирь. (5), стр. 457.

A. cervina, какъ выяснилъ Н. А. Покровскій, бываетъ въ окрестностяхъ Н.-Новгорода на пролетѣ весной и осенью въ сравнительно большомъ количествѣ. Въ Нижегородскомъ Земскомъ Музеѣ есть нѣсколько экземпляровъ этого конька.

195. *Budytes flava flava* (L.).

и

196. *Budytes flava borealis* (Sund.).

Motacilla flava, L. Мензбирь. (5), стр. 770.

Motacilla borealis, Sundev. ididem.

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ осматрѣнныя мною желтыя трясогузки относились къ типичной *flava*. Типичная *B. fl. borealis* (совершенно безъ брови) въ моемъ сборѣ имѣется только одна, но не вполне типичныхъ я находилъ сравнительно рѣдко. Напр., къ числу такихъ экземпляровъ относится № 4 моей коллекціи. Этотъ экземпляръ не можетъ быть названъ вполне типичнымъ на томъ основаніи, что у него имѣется позади глаза очень узкая небольшая бѣлая полоска. Другіе признаки: очень темныя кроющія уха, отсутствіе передней половины бѣлой брови, немного болѣе темной, чѣмъ у типичн. *B. f. flava*, окрасъ головы и т. д. указываютъ на принадлежность этой птицы къ *B. fl. borealis* (Sund.).

Экземпляры коллекціи:

- 1) VII.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородск. у.
- 2) 26. V. 910 ♂ ad. Камское оз., Макарьевского уѣзда.
- 3) 4. VI. 910 ♀ Нестяръ, Макарьевск. у.
- 4) 23. IV. 911 ♂ Жуковский затонъ на Волгѣ, Макар. у.
- 5) 25. IV. 911 ♂ } ibidem.
- 6) 25. IV. 911 ♂ }
- 7) 1. V. 911 ♀
- 8) 2. V. 911 ♀ Оз. Язы, Макарьевского у.

197. *Budytes citreola werae* (Buturl.).

Motacilla citreola, Pall (partim). (5). Мензбирь, стр. 778.

Budytes citreola werae But. Buturlin. Ornitholog. Monatsber. 1907.

Budytes citreola гнѣздится въ Нижегородской губ., но не всюду, а лишь мѣстами. Одна колонія ихъ найдена въ долинахъ Алатыря и Калши, другая—Н. А. Покровскимъ въ Семеновскомъ уѣздѣ около с. Боръ. Насколько я могу судить, предпочитаетъ болотные луга.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 16. V. 911 ♂ ad. } Берегъ Алатыря недалеко отъ Кемли, Лукояновскаго уѣзда.
- 2) 16. V. 911 ♂ ad. }
- 3) 17. V. 911 ♂ ad. }
- 4) 24. V. 911 ♀ ad. Калша, лѣв. притокъ Алатыря.

198. *Motacilla alba* (L.).

Motacilla alba, L. Мензбирь. (5), стр. 784.

Очень обыкновенная птица.

199. *Troglodytes troglodytes* (L.).

Troglodytes parvulus, L. Мензбирь. (5), 789.

Кравивника на гнѣздовѣ я наблюдалъ только однажды въ Макарьевскомъ уѣздѣ, близъ дер. Анненки на Ветлугѣ. 13. VI. 910 г. я услышалъ незнакомую мнѣ пѣсенку и вскорѣ увидаль птичку. Убить кравивника мнѣ не удавалось нѣсколько дней, а послѣ неудачнаго выстрѣла 16. VI я болѣе не слыхалъ его писка. Кромѣ этого случая мнѣ не удалось видѣть кравивниковъ. Н. А. Покровскій убивалъ ихъ и иногда въ значительномъ числѣ на осеннемъ пролетѣ подѣ Н.-Новгородомъ. По его словамъ, кравивники летать не каждый годъ, но иногда, какъ это было осенью 911 года, этихъ птичекъ держалось довольно много. Отношу кравивника къ числу пролетныхъ и рѣдко гнѣздящихся птицъ Нижегородской губ.

200. *Sitta europaea europaea* (L.).

Sitta europaea, L. Мензбирь. (5), стр. 794.

Дуболазь, какъ называютъ въ Нижнемъ эту птицу, очень обыкновененъ по лиственнымъ и смѣшаннымъ лѣсамъ. Въ сѣверной половинѣ, заполненной въ большей части хвойными лѣсами, онъ сравнительно рѣдокъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 20. VII. 910 juv. Козловка, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 19. V. 911 ♂ ad. } Пойма Калши, Лукояновскаго уѣзда.
- 3) 27. V. 911 ♀ ad. }
- 4) 10. VII. 911 Берегъ Сережи, Арзамасскаго уѣзда.
- 5) 22. XII. 911 ♀ } Окр. Н.-Новгорода.
- 6) 22. XII. 911 ♂ }

201. *Lophophanes cristatus* (L.).

Lophophanes cristatus, Briss. Мензбирь. (5), 794.

Хохлатая синица найдена мною гнѣздящейся какъ на сѣверѣ губерніи, такъ и на югѣ, но обыкновенной она становится только южнее Волги. Здѣсь мѣстами она не уступаетъ въ численности *Poecilo borealis*.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 5.VI.909 Фроловская, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 16.V.910 ♂ Рѣчка Пугай, притокъ Керженца.
- 3) 13.VIII.910 ♂ С. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 4) 6.VII.910 ♂ Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.

202. *Cyanistes caeruleus caeruleus* (L.).

Cyanistes caeruleus, L. Меззбирь. (5), стр. 806.

Я этой лазоревки самъ не встрѣчалъ лѣтомъ, но думаю, что она гнѣздится въ Нижегородской губерніи въ небольшомъ количествѣ, какъ какъ подъ Н.-Новгородомъ выводки этихъ синичекъ наблюдались уже въ первыхъ числахъ іюля. Осенью и зимой лазоревка очень обыкновенна.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 26.VIII.910 (♀) Н.-Новгородъ.
- 2) 22.XII.910 Окр. Н.-Новгорода.
- 3) 18.XII.911 Окр. Н.-Новгорода.

203. *Cyanistes cyanus* (Pall.).

Cyanistes cyanus, Pall. Меззбирь. (5), стр. 811.

Бѣлая лазоревка гнѣздится и не рѣдка въ поймѣ Волгѣ. Вѣроятно, гнѣздится и во многихъ другихъ мѣстахъ Нижегородской губерніи, потому что выводки этихъ лазоревокъ съ первыхъ чиселъ іюля становятся довольно обыкновенными по поймамъ рѣкъ и рѣчекъ. Прилетѣвшихъ и уже спарившихся бѣлыхъ лазоревокъ я наблюдалъ 21.IV. Какъ долго держатся онѣ осенью не знаю, а зимой я ихъ не встрѣчалъ совсѣмъ.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 15.VII.910 ♂ (?) juv. } Собчинскій затонъ на Волгѣ.
- 2) 15.VII.910 juv. }
- 3) 5.VII.911 ♂ (?) juv. Новая Пустынь, Арзамасскаго у.
- 4) 27.VIII. ♀ ad. Кадицы, Макарьевскаго уѣзда.

204. *Poecile borealis* (Sel.).

Poecile borealis, De Selys. Меззбирь. (5), стр. 815.

Гнѣздится въ большомъ количествѣ. Зимой ихъ меньше, но и въ это время гачки не рѣдки.

Экземпляры коллекцій:

- 1 и 2) 13.VIII.910, 2 ♂, Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 3, 4 и 5) 14.VIII.910, 3 ♂ *ibidem*, 6) 19.VIII.910 ♀ *ibidem*.
- 7 и 8) 17.VII.911, ♂, Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 9) 22.VII.911, ♂, Нов.-Ичалки, Лукояновскаго уѣзда.

205. *Poecile cinctus* (Bodd.).

Poecile cincta, Bodd. Меззбирь. (5), стр. 822.

Добыта въ Нижегородской губ. Н. А. Покровскимъ.

206. *Parus ater* (L.).

Parus ater, L. Меззбирь. (5), 824.

Московка на гнѣздовѣ не найдена и если гнѣздится вообще здѣсь, то въ очень незначительномъ количествѣ. Ранѣ послѣднихъ чиселъ іюля мнѣ не удавалось убивать этихъ птицъ. На пролетѣ бываетъ ежегодно, но не въ одинаковомъ количествѣ.

207. *Parus major* (L.).

Parus major, L. Меззбирь. (5), стр. 828.

Большая синица довольно обыкновенна лѣтомъ, многочисленна осенью и весной и не рѣдка въ срединѣ зимы. Выводки молодыхъ летныхъ я наблюдалъ не ранѣ 11.VI.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 4.V.910 ♂ Рѣчка Ялокша, притокъ Керженца.
- 2) 11.VIII.910 ♂ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 3) 28.IV.911 ♂ Жуковский затонъ, Макарьевскаго у.

208. *Aegithalos caudatus* (L.).

Aegithalos caudatus, L. Меззбирь. (5), стр. 833.

Довольно нерѣдка осѣдая птичка Нижегородской губерніи. Осенью и зимой количество ихъ увеличивается. Выводки уже летающихъ долгохвостыхъ синицъ наблюдалъ не ранѣ 11.VI. Спарившіяся птички чрезвычайно привязаны другъ къ другу.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 9.V.910 ♂ Лыково, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 20.VIII.910 ♂ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 3) 20.VIII.911 ♀ *ibidem*.
- 4) 18.XII.911 ♂ }
- 5) 18.XII.911 ♀ } Марьяна Роца, Нижегородскаго уѣзда.

209. *Regulus regulus* (L.).

Regulus cristatus, Koch. Меззбирь. (5), стр. 849.

Королекъ гнѣздится въ уѣздахъ Макарьевскомъ, Семеновскомъ и Нижегородскомъ по еловымъ и отчасти елово-сосновымъ лѣсамъ. Мѣстами очень обыкновененъ. Осенью бываетъ въ значительно большемъ количествѣ.

210. *Locustella fluviatilis* (Wolf).

Locustella fluviatilis, Wolf. Меззбирь. (5), стр. 861.

L. fluviatilis на гнѣздовѣ обыкновенна въ долинѣ Волги и къ югу отъ этой границы. Мѣстами, напр., въ долинѣ Алатыря, она многочисленна. Въ сѣверной половинѣ губерніи добыта на осеннемъ прелетѣ на Керженцѣ. Первые крики слышатся въ первыхъ числахъ мая.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 15.VIII.910 Хахалы, Семеновскаго уѣзда
- 2) 16.V.911 ♂ ad. Кемля, Лукояновскаго уѣзда.
- 3) 17.V.911 ♂ ad. ibidem.

211. *Locustella naevia naevia* (Bodd.).

Locustella locustella, Lath. Меззбирь. (5), стр. 868.

Камышевка сверчокъ гнѣздится въ Нижегородской губерніи, но распространена настолько спорадично, что лично мнѣ не удалось ни разу ее встрѣтить. Н. А. Покровский ежегодно убивалъ этихъ птичекъ въ Ивановской казенной дачѣ, недалеко отъ с. Боръ, въ Семеновскомъ уѣздѣ, гдѣ очевидно живетъ какъ бы колонія ихъ. До сихъ поръ были убиваемы птицы только означеннаго подвида.

212. *Acrocephalus aquatica* (Gm.).

Acrocephalus aquaticus, Temm. Меззбирь. (5), стр. 884.

Добыта въ Нижегородской губерніи Н. А. Покровскимъ.

213. *Acrocephalus schoenobaenus* (L.).

Acrocephalus phragmitis, Bechst. Меззбирь. (5), стр. 880.

Очень обыкновенная гнѣздящаяся птичка по всемъ рѣкамъ и озерамъ описываемой мѣстности.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 26.VII.909 juv. Фроловская, Нижегородской губерніи.
- 2) 18.VI.910 ♂ ad. Анненка на Ветлугѣ, Макарьевск. у.
- 3) 18.VI.910 ♂ ad. ibidem.
- 4) 26.VII.910 ♂ ad. } Собчинскій затонъ на Волгѣ въ Семеновскомъ
- 5) 26.VII.910 ♂ juv. } уѣздѣ.
- 6) 24.V.911 ♂ ad. Пойма Калши, Лукояновск. уѣзда.

214. *Acrocephalus palustris* (Bechst.).

Acrocephalus palustris, Bechst. Меззбирь. (5), стр. 893.

На Керженцѣ эта камышевка мнѣ не встрѣчалась, можетъ быть, случайно; на озерахъ между Керженцемъ и Ветлугой ее опредѣленно не было. Съ Ветлуги экземпляровъ не имѣю, но я тамъ былъ не долго и возможно, что пропустилъ эту птичку. Въ долинѣ Волги она обыкновенна, но въ численности уступаетъ предыдущему виду. То же можно сказать и объ Алатырѣ. Живетъ по кустарникамъ около воды, но подъ Н.-Новгородомъ она обыкновенна въ бурьянѣ на свалкѣ нечистоты, откуда до ближайшаго ручейка около полуверсты. Экземпляръ № 1, изъ Собчинскаго затона, отличается отъ всякихъ другихъ *A. palustris*, даже и молодыхъ, замѣтно болѣе рыжимъ тономъ головы, спины, проксимальныхъ маховыхъ, надхвостья, боковъ шеи и туловища. Возможно, что это *Acroceph. strepera* (Vieill.), но опредѣлить точно нельзя: разбиты крылья.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 15.VII.910 juv. (?) Собчинскій затонъ на Волгѣ.
- 2) 19.V.911 ♂ ad. Калша, Лукояновскаго уѣзда.
- 3) 19.V.911 ♂ ad. ibidem.
- 4) 20.V.911 ♂ ad. ibidem.
- 5) 22.V.911 ♂ ad. ibidem.
- 6, 7, 8, 9, 10, 11) 23.VI.913, ♂♂ Окр. Н.-Новгорода.

215. *Acrocephalus dumetorum* (Blyth).

Acrocephalus dumetorum, Blyth. Меззбирь. (5), стр. 899.

Гнѣздящаяся птица Нижегородской губерніи. Въ сравненіи съ двумя предыдущими видами эта камышевка довольно рѣдка. Я наблюдалъ ее лѣтомъ на Алатырѣ, Серезѣ и въ садахъ Н.-Новгорода. Н. А. Покровский находилъ ее въ сѣверныхъ уѣздахъ и въ окрестн. Н.-Новгорода.

Экземпляръ коллекціи:

- 1) 26. V. 911 ♂ ad. Пойма Калши, Лукояновскаго у.

216. Hippolais icterina (Vieill.).

Hippolais icterina, Vieill. Меназбирь. (5), стр. 903.

Лѣсная малиновка—обыкновенная гнѣздящаяся птица южной половины Нижегородской губерніи. Гнѣздится она и въ сѣверныхъ уѣздахъ, но здѣсь рѣже вслѣдствіе преобладанія хвойныхъ боровъ, въ которыхъ она встрѣчается только въ видѣ исключенія.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 1. VI. 910 ♂ ad. Оз. Свѣтлое, Макарьевскаго у.
2) 20. V. 911 ♂ ad. Лѣса на Калшѣ въ Лукояновск. у.
3) 20. V. 911 ♂ ad. ibidem.

Hippolais caligata (Licht.).

Hippolais caligata, Licht. Меназбирь. (5), стр. 907.

Разсматривая область распространенія бормотушки, М. А. Меназбирь (1. с.) пишетъ: „Что касается губерній, лежащихъ между Олопецкой и Рязанской съ одной стороны и Вятской и Саратовской съ другой, то нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ широкомъ распространеніи здѣсь бормотушки“. О нахожденіи *H. caligata* въ Нижегородской губерніи я не имѣю никакихъ свѣдѣній. Также и Н. А. Покровский. Русскимъ эта птица не указывается для Казанской губерніи. Для меня несомнѣнно, что если бормотушка и гнѣздится въ Нижегородской губерніи, то въ ничтожномъ количествѣ.

217. Phylloscopus viridanus (Blyth).

Phylloscopus viridanus, Blyth. Меназбирь. (5), стр. 918.

Зеленая пѣночка, какъ гнѣздящаяся птица, мѣстами довольно обыкновенна. Я слышалъ ее нѣрѣдко на Ветлугѣ въ Макарьевскомъ уѣздѣ, гдѣ добытъ однажды. Особенно часто я наблюдалъ эту пѣночку въ Нижегородскомъ уѣздѣ. Однажды на пути изъ Кстова во Фроловскую на разстояніи 2-хъ верстъ я слышалъ пятерыхъ самцовъ, изъ которыхъ трехъ убилъ. Въ Н.-Новгородѣ *Ph. viridanus* можно услышать въ каждомъ большомъ саду, особенно въ городскомъ „Александровскомъ“. Я добывалъ ее также въ Арзамасскомъ и Лукояновскомъ уѣздахъ. Н. А. Покровский въ окрестн. Н.-Новгорода застрѣлилъ нѣ-

сколько такихъ птичекъ для Земскаго Музея, гдѣ онѣ и сохраняются. *Phylloscopus viridanus* держится въ самыхъ разнообразныхъ лѣсахъ: чисто еловыхъ, еловыхъ съ примѣсю лиственныхъ породъ, сосновыхъ; лиственныхъ: липовыхъ, осиновыхъ, осокоревыхъ, а однажды я убилъ парочку изъ выводка, который держался по таловымъ кустамъ, росшимъ по теченію маленькой рѣчки недалеко отъ сосноваго лѣса. Въ смежныхъ губерніяхъ *Ph. viridanus* найдена въ Казанской и Костромской.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 13. VI. 190 ♂ ad. Ветлуга близъ дер. Анненки.
2) 22. V. 1911 ♂ ad. Кстова, Нижегородскаго уѣзда.
3) 15. VII. 911 ♂ juv. Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
4) 22. VII. 911 ♀ juv. } Пойма Калши, притока Алатыря, Лукояновскаго уѣзда.
5) 22. VII. 911 ♂ juv. }

Экземпляры 3, 4 и 5 уже перелиняли.

218. Phylloscopus sibilatrix (Bechst.).

Phylloscopus sibilatrix, Bechst. Меназбирь. (5), стр. 922.

Одна изъ обыкновенныхъ пѣночекъ Нижегородской губ.

Экземпляръ коллекціи:

1. V. 910. ♂ ad. Дер. Красный Яршкя близъ г. Макарьева.

219. Phylloscopus trochilus (L.).

Phylloscopus trochilus, L. Меназбирь. (5), стр. 926.

Одна изъ самыхъ многочисленныхъ формъ нашихъ лѣсовъ. Прилетъ въ половинѣ апрѣля.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 17. VI. 909 juv. Дер. Новая, Нижегородскаго уѣзда.
2) 12. V. 910 ♂ ad. Лыково-Никольское, Семеновскаго уѣзда.
3) 15. VII. 910 juv. Собчянскій затонъ на Волгѣ.
4) 12. VIII. 910 juv. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
5) 26. VII. 911 ♂ Пойма Алатыря, Лукояновскаго у.
6) 10. VII. 911 ♂ juv. Р. Сережа, Арзамасск. у.
7) 15. VII. 911 ♂ Стар. Пустынь, Арзамасскаго у.

220. Phylloscopus collybita (Vieill.).

Phylloscopus collybita, Vieill. Меназбирь. (5), стр. 931.

Пѣночка кузнечикъ очень обыкновенна, но въ численности уступаетъ предыдущему виду. Я наблюдалъ кузнечиковъ уже въ первой

половинѣ апрѣля. Держится эта птичка въ густыхъ сосновыхъ, сосново-еловыхъ или въ смѣшанныхъ лѣсахъ. Однажды весной я услышалъ ее въ тальникахъ Волжскаго острова.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 14.VIII.910 juv. } Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 17.VIII.910 juv. }
- 3) 22.VIII.911 ♀ Жуковский затопъ на Волгѣ.

221. *Sylvia nisoria* (Bechst.).

Sylvia nisoria, Bechst. Мензбиръ. (5), стр. 946.

Ястребиная славка принадлежит къ очень рѣдкимъ птицамъ Нижегородской губерніи. Я находилъ ее дважды въ Макарьевскомъ уѣздѣ и одинъ разъ въ Лукояновскомъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 24.V.910 ♂ ad. Нестіаръ, Макарьевскаго уѣзда.
- 2) 22.VII.911 ♀ ad. Пойма Алатыря близъ Н.Ичалокъ.

222. *Sylvia communis* (Lath.).

Sylvia cinerea, Bechst. Мензбиръ. (5), стр. 950.

Обыкновенная птица описываемой области. Прилетаетъ по моимъ наблюденіямъ въ самыхъ послѣднихъ числахъ апрѣля. Гнѣздится по кустарникамъ на опушкахъ лѣсовъ, не избѣгаетъ и невысокихъ, одиночныхъ расположенныхъ еловыхъ острововъ лѣса.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.VII.910 ♂ Н.-Новгородъ.
- 2) 19.V.911 ♂ ad. Калша, притокъ Алатыря, Лукояновск. у.
- 3) 26.V.911 ♂ ad. ibidem.

223. *Sylvia borin* (Bodd.).

Sylvia hortensis, Bechst. Мензбиръ. (5), стр. 955.

Садовая славка по численности превосходить всѣхъ другихъ славокъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 26.V.910 ♂ Оз. Камское, Макарьевскаго уѣзда.
- 2) 13.VI.910 ♂ ad. Дер. Анненка на Веплугѣ, Макар. уѣзда.
- 3) 10.VIII.910 ♀ } Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 4) 17.VIII.910 ♂ }
- 5) 17.V.911 ♂ ad. Кемля, Лукояновскаго уѣзда.
- 6) 18.V.911 ♂ ad. Пойма Алатыря, Лукояновск. у.

224. *Sylvia curruca* (L.).

Sylvia curruca, L. Мензбиръ. (5), стр. 630.

Я нашелъ эту славку рѣдкой гнѣздящейся птицей южной половины Нижегородской губерніи. Для меня не совсѣмъ понятно, почему это птичка не попадалась мнѣ въ сѣверныхъ уѣздахъ. Въ моихъ дневникахъ нѣтъ записей о ней изъ сѣверныхъ уѣздовъ и я не помню, чтобъ когда слышалъ ее тамъ. Однако несомнѣнно завирушка тамъ гнѣздится, потому что въ Костромской Кирпичниковъ нашелъ ее очень обыкновенной.

Экземпляръ коллекціи:

- 6.VI.911 ♂ ad. Пустынь, Арамасскаго уѣзда.

225. *Sylvia atricapilla* (L.).

Sylvia atricapilla, L. Мензбиръ. (5), стр. 966.

Черноголовая славка гнѣздится по всей губерніи, но рѣже, чѣмъ сѣрая и садовая. Гнѣздится по старымъ смѣшаннымъ и листовымъ лѣсамъ. Осенью наблюдалъ ее часто въ бурьянѣ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 9.V.910 ♂ ad. Лыково, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 15.VIII.910 ♀ ad. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 3) 22.V.911 ♂ ad. Лѣсъ по лѣвому берегу Алатыря, Лукояновскаго у.

226. *Luscinia philomela* (Bechst.).

Erithacus philomela, Bechst. Мензбиръ. (5), стр. 976.

Очень обыкновенная птица. Прилетъ во второй половинѣ апрѣля. Среди типичныхъ птицъ мнѣ встрѣтилась однажды осенью var. *infusata* Сѣверцова.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.V.911 ♂ ad. Лѣса по Алатырю въ Лукояновск. у.
- 2) 26.V.911 ♀ ad. ibidem.

227. *Cyanecula svecica svecica* (L.).

и

228. *Cyanecula svecica cyanecula* (Wolf).

A) *Erithacus svecicus*, L. и B) *Erithacus leucocyanus*, Brehm. Мензбиръ. (5), стр. 985.

Въ Нижегородской губерніи варагушки вообще довольно обыкновенны. Въ особенности много ихъ въ долинѣ Волги. Обыкновенно

селятся около текущей воды, но иногда случается наблюдать варакушек сравнительно далеко от какой-либо воды. Однажды, например, я наблюдал поющего самца на свалке нечистоты в бурьян в окр. Н.-Новгорода. Осенью выводки варакушек можно видеть по коноплиям, огородам и садам. Прилетают, вероятно, в первой половине апреля, потому что уже в середине этого месяца пение самцов в полном разгаре. В Нижегородской губ. преобладает варакушка с рыжим пятном, но и *E. leucosyana* нельзя назвать редкой. Кроме того, довольно много особей переходных. Из имеющихся в моей коллекции можно набрать серию весьма постепенного перехода от *C. s. svecica* к *C. s. cyanescula*. Один из экземпляров от 22.V. 911 представляет типичную *C. s. cyanescula* с чисто белым пятном на голубом шейном пятне, один из добытых 17.V.911 отличается от только что упомянутого тем, что на белом пятне на середине, ближе к его верхнему краю имеется несколько рыжих перьев, довольно резко выделяющихся. Другой экземп. от 17.IV.911 имеет рыжих перышек на том же месте уже значительно больше, так что трудно сказать, который цвет преобладает — белый или рыжий. Затем имеются экземпляры с более или менее типичной для *C. s. svecica* окраской груди, но рыжее пятно обведено узкой белой каемкой. Чаще такой ободок не замыкается. Наконец, есть экземпляры с чисто рыжим пятном. Н. А. Покровский однажды добыл варакушку с белым пятном, скрытым за голубыми кончиками перьев [*Cyanescula Wolfii* (Brehm)].

Экземпляры коллекции:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) 3.VI.909 ♂ ad. | Кудьма близ дер. Новой, Нижегородск. у. |
| 2) 17.IV.911 ♂ ad. | Левый берег Волги против Кетова. |
| 3) 17.IV.911 ♂ ad. | |
| 4) 17.IV.911 ♂ ad. | |
| 5) 17.IV.911 ♂ ad. | |
| 6) 22.V.911 ♂ ad. | |
| 7) 22.V.911 ♂ ad. | Рычка Калша, приток Алатыря, Лукояновского уезда. |
| 8) 22.V.911 ♀ ad. | |
| 9) 24.V.911 ♀ ad. | |
| 10) 11.VI.911 ♂ ad. | Окр. Н.-Новгорода. |
| 11) 22.VII.911 ♂ ad. | Пойма Алатыря, Лукояновск. у. |

229. *Erithacus rubecula* (L.).

Erithacus rubecula, L. Мензбирь. (5), стр. 990.

Огневка (Нижегородское название) очень обыкновенна всюду в описываемой местности. Пение слышится в начале апреля.

Экземпляры коллекции:

- 1) 13.V.910 ♂ ad. Рычка Черная в Семеновском у.
- 2) 15.V.910 ♂ ad. Рычка Пугай ibidem.
- 3) 12.VIII.910 ♂ Хахалы, Семеновского уезда.

230. *Phoenicurus phoenicurus* (L.).

Ruticilla phoenicurus, L. Мензбирь. (5), стр. 1001.

Очень обыкновенная гнездящаяся птица. Прилет в второй трети апреля.

Экземпляры коллекции:

- 1) 16.VI.909 ♂ ad. Дер. Фроловская, Нижегородского у.
- 2) 1.V.910 ♂ ad. Красный Яршк близ Макарьева.
- 3) 15.VIII.910 ♂ Хахалы, Семеновского уезда.

231. *Pratincola ruberta* (L.).

Pratincola ruberta, L. Мензбирь. (5), 1017.

Гнездится в изобилии.

Экземпляры коллекции:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1) 3.VI.909 ♂ ad. | } Фроловская, Нижегородского уезда. |
| 2) 11.VI.900 ♂ ad. | |
| 3) 9.V.910 ♀ ad. | } Лысково, Семеновского уезда. |
| 4) 9.V.910 ♂ ad. | |
| 5) 22.VII.911 ♂ ad. | |

232. *Saxicola oenanthe* (L.).

Saxicola oenanthe, L. Мензбирь. (5), стр. 1022.

Чекань каменка принадлежит к обыкновенным гнездящимся птицам Нижегородской губ.

Экземпляры коллекции:

- 1) 3.VI.910 ♂ ad. Пестярь, Макарьевского уезда.
- 2) 16.VIII.911 ♂ juv. Стар. Пустынь, Арзамасского уезда.

233. *Prunella modularis* (L.).

Accentor modularis, L. Меназбирь. (5), стр. 1044.

Повидимому, завирушка въ Нижегородской губ. нормально не гнѣздится. На пролетѣ осенью убита Н. А. Покровскимъ 12.IX.899 (♂) подѣ Н.-Новгородомъ и мною 29.VIII.911 (♀) на лѣвомъ берегу Волги противъ Кадницъ.

Экземпляръ коллекціи:

29.VIII.911 ♀ лѣв. бер. Волги противъ Кадницъ, Макар. у.

234. *Merula merula* (L.).

Merula merula, L. Меназбирь. (5), стр. 1061.

Гнѣздящаяся и вообще довольно обыкновенная птица Нижегородской губерніи.

Экземпляръ коллекціи:

11.VI.910 ♂ ad. Берегъ Ветлуги, Макарьевского уѣзда. У выводка.

235. *Turdus viscivorus* (L.).

Обыкновенная птица описываемой области. Выводки плохо летающихъ находилъ начиная съ 16.V. (!).

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1) 28.V.909 ♂ ad. | } Фроловская, Нижегородскаго уѣзда. |
| 2) 28.V.909 juv. | |
| 3) 16.V.910 ♂ juv. | Окр. оз. Чернаго, Семеновскаго уѣзда. |
| 4) 16.V.911 ♂ ad. | } Кемля, Лукояновскаго уѣзда. |
| 5) 16.V.911 ♀ ad. | |

236. *Turdus philomelos* (Brehm).

Turdus musicus, L. Меназбирь. (5), стр. 1073.

Гнѣздится въ огромномъ количествѣ. Какъ и предыдущій дроздъ, на сѣверѣ губерніи значительно рѣже, чѣмъ въ центральныхъ и южныхъ уѣздахъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 23.V.909 ♀ ad. Кстово, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 15.VIII.910 ♀ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 3) 17.V.911 ♂ ad. Кемля, Лукояновскаго уѣзда.

237. *Turdus musicus* (L.).

(*Turdus iliacus* auct.)

Гнѣздится, повидимому, во всей губерніи, но спорадиченъ, а поэтому трудно установить, въ какомъ количественномъ соотношеніи находится со своими сородичами. Весенній пролетъ продолжается до половины апрѣля.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 7.IV.911 Окр. дер. Фроловской, Нижегородскаго у.
- 2) 11.IV.911 ♀ „Марьяна Роца“ близъ Н.-Новгорода.

238. *Turdus pilaris* (L.).

Turdus pilaris, L. Меназбирь. (5), стр. 1078.

Рябинникъ гнѣздится здѣсь рѣже, чѣмъ другіе дрозды, но вообще все же не рѣдокъ. Остается ли на зиму—увѣренно сказать не могу. На рынкѣ стрѣляные дрозды этого вида продаются всю зиму.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 8.IV.911 ♀ „Марьяна Роца“ подѣ Н.-Новгородомъ.
- 2) 23.VII.911 ♂ juv. Пойма Алатыря, Лукояновскаго уѣзда.


- 60. *Lagopus lagopus* (L.) s.
- 61. *Perdix perdix* (L.) s.
- 62. *Coturnix coturnix* (L.) n.
- 63. *Syrhaptes paradoxa* (Pall.) err.
- 64. *Turtur turtur* (L.) n.
- 65. *Columba livia domestica* (Bohd.) s.
- 66. *Columba oenas* (L.) n.
- 67. *Columba palumbus* (L.) n.
- 68. *Mergellus albellus* (L.) tr.
- 69. *Mergus serrator* (L.) tr.
- 70. *Mergus merganser* (L.) tr. irr.?
- 71. *Oidemia nigra* (L.) tr. irr.?
- 72. *Oidemia fusca* (L.) tr.
- 73. *Harelda glacialis* (L.) tr.
- 74. *Clangula clangula* (L.) n.
- 75. *Fuligula nyroca* (Güld.) tr. irr.
- 76. *Netta rufina* (Pall.) err.
- 77. *Fuligula fuligula* (L.) n.
- 78. *Marila marila* (L.) tr.
- 79. *Aythya ferina* (L.) tr.
- 80. *Anas boschas* (L.) n.
- 81. *Spatula clypeata* (L.) tr.
- 82. *Querquedula circa* (L.) n.
- 83. *Nettion crecca* (L.) h.
- 84. *Chaulelasmus strepera* (Linn.) tr. n.?
- 85. *Dafila acuta* (L.) n.
- 86. *Mareca penelope* (L.) tr.
- 87. *Cygnus cygnus* (L.) n.
- 88. *Rufibrenta ruficollis* (Pall.) err.
- 89. *Anser albifrons* (Scop.) tr.
- 90. *Melanonyx segetum segetum* (Gm.) tr.
- 91. *Ciconia nigra* (L.) n.
- 92. *Botaurus stellaris* (L.) n.
- 93. *Ardetta minuta* (L.) n.
- 94. *Ardea cinerea* (L.) n.
- 95. *Pandion haliaëtus* (L.) n.
- 96. *Tinnunculus tinnunculus* (L.) n.
- 97. *Hypotriorchis subbuteo* (L.) n.

- 98. *Falco peregrinus* (Tunst.) tr. n.?
- 99. *Erythropus vespertinus* (L.) n.
- 100. *Aesalon aesalon* (Tunstall) n. s.?
- 101. *Pernis apivorus* (L.) n.
- 102. *Milvus ater* (Gm.) n.
- 103. *Haliaëtus albicilla* (L.) tr.
- 104. *Aquila chrysaëtus chrysaëtus* (L.) s.
- 105. *Aquila heliaca* (Sav.) n.
- 106. *Aquila maculata* (Gm.) n.
- 107. *Circaëtus gallicus* (Gm.) n.
- 108. *Archibuteo lagopus* (Brünn.) h. tr. n.?
- 109. *Archibuteo pallidus* (Menzb.) h. tr.
- 110. *Buteo vulpinus* (Licht.) n.
- 111. *Accipiter nisus* (L.) n. s.?
- 112. *Astur palumbarius* (L.) s.
- 113. *Circus cineraceus* (Mont.) n.
- 114. *Circus macrurus* (Gm.) n. tr.
- 115. *Circus cyaneus* (L.) n.
- 116. *Circus aeruginosus* (L.) n.
- 117. *Athene noctua subsp.?* n.
- 118. *Glaucidium passerinum* (L.) tr. n.?
- 119. *Bubo bubo bubo* (L.) s.
- 120. *Bubo bubo ruthenus* (Buturl. et Zhitk.) s.
- 121. *Scops scops pulchella* (Pallas) n.
- 122. *Surnia ulula* (L.) s.
- 123. *Nyctala tengmalmi* (Gm.) s.
- 124. *Scotiaptex cinerea lapponica* (Thunb.) h.
- 125. *Syrnium uralense* (Pall.) s.
- 126. *Syrnium aluco* (L.) s.
- 127. *Nyctea nyctea* (L.) h.
- 128. *Asio accipitrinus* (Pall.) r.
- 129. *Asio otus* (L.) n.
- 130. *Coracias garrulus* (L.) n.
- 131. *Merops apiaster* (L.) err. tr.?
- 132. *Caprimulgus europaeus* (L.) n.
- 133. *Cypselus apus* (L.) n.
- 134. *Upupa epops* (L.) n. spor.
- 135. *Cuculus canorus canorus* (L.) n.

136. <i>Cuculus optatus</i> (Gould)	n.
137. <i>Lynx torquilla</i> (L.)	n.
138. <i>Dryocopus martius</i> (L.)	n. s.?
139. <i>Dryobates major major</i> (L.)	s.
140. <i>Dryobates minor minor</i> (L.)	s.
141. <i>Dryobates leucotos leucotos</i> (Bechst.)	n.
142. <i>Picoides tridactylus tridactylus</i> (L.)	n. s.?
143. <i>Picus viridis</i> (L.)	n.
144. <i>Picus canus</i> (Gm.)	tr. irr.; h. irr.?
145. <i>Alcedo ispida ispida</i> (L.)	n.
146. <i>Otocoris alpestris</i> (L.)	tr.
147. <i>Alauda arvensis</i> (L.)	n.
148. <i>Lullula arborea</i> (L.)	n.
149. <i>Corvus corax</i> (L.)	s.
150. <i>Trypanocorax frugilegus</i> (L.)	n.
151. <i>Corvus cornix</i> (L.)	s.
152. <i>Colaeus monedula collaris</i> (Drumm.)	s.
153. <i>Pica pica</i> (L.)	s.
154. <i>Garrulus glandarius</i> (L.)	s.
155. <i>Perisoreus infaustus</i> (L.)	s.
156. <i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i> (Brehm)	tr.
157. <i>Sturnus vulgaris intermedius</i> (Prazak.)	n.
158. <i>Plectrophanes nivalis</i> (L.)	h.
159. <i>Cynchramus schoeniclus</i> (L.)	n.
160. <i>Emberiza citrinella erythrogegens</i> (Brehm)	s.
161. <i>Emberiza aureola</i> (Pall.)	n.
162. <i>Emberiza hortulana</i> (L.)	n.
163. <i>Loxia curvirostra curvirostra</i> (L.)	n.
164. <i>Loxia bifasciata</i> (Brehm)	tr.
165. <i>Loxia pytyopsittacus</i> (Borkh.)	tr. irr.
166. <i>Pinicola enucleator</i> (L.)	h.
167. <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L.)	s.
168. <i>Carpodacus erythrina</i> (Pall.)	n.
169. <i>Acanthis linaria linaria</i> (L.)	tr. h. n.?
170. <i>Acanthis linaria exilipes</i> (Coues)	tr. irr.
171. <i>Linota cannabina</i> (L.)	n.
172. <i>Fringilla montifringilla</i> (L.)	n. spor.; tr.

173. <i>Fringilla coelebs</i> (L.)	n.
174. <i>Passer domesticá</i> (L.)	s.
175. <i>Passer montana</i> (L.)	s.
176. <i>Chrysomitris spiuus</i> (L.)	n.
177. <i>Carduelis carduelis subsp.?</i>	s.
178. <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L.)	n.
179. <i>Chloris chloris</i> (L.)	n.
180. <i>Certhia familiaris</i> L.	tr. h. n.?
181. <i>Riparia riparia</i> (L.)	n.
182. <i>Hirundo urtica</i> (L.)	n.
183. <i>Chelidon rustica</i> (L.)	n.
184. <i>Siphia parva</i> (Bechst.)	n.
185. <i>Hedymela atricapilla</i> (L.)	n.
186. <i>Muscicapa striata</i> (Pall.)	n.
187. <i>Ampelis garrulus</i> (L.)	h. tr.
188. <i>Lanius collurio</i> (L.)	n.
189. <i>Lanius excubitor excubitor</i> (L.)	n. spor.
190. <i>Lanius excubitor major</i> Pall.	tr.
191. <i>Oriolus oriolus</i> (L.)	n.
192. <i>Anthus pratensis</i> (L.)	n.
193. <i>Anthus trivialis</i> (L.)	n.
194. <i>Anthus cervina</i> (Pall.)	tr.
195. <i>Budytes flava flava</i> (L.)	n.
196. <i>Budytes flava borealis</i> (Sund.)	n.
197. <i>Budytes citreola werae</i> (Buturl.)	n.
198. <i>Motacilla alba</i> (L.)	n.
199. <i>Troglodytes troglodytes</i> (L.)	n. spor., tr.
200. <i>Sitta europaea europaea</i> (L.)	s.
201. <i>Lophophanes cristatus</i> (L.)	n.
202. <i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i> (L.)	s.
203. <i>Cyanistes cyanus</i> (Pall.)	n. s.?
204. <i>Poecile borealis</i> (Sel.)	s.
205. <i>Poecile cinctus</i> (Bodd.)	tr. irr.?
206. <i>Parus ater</i> (L.)	tr. n.?
207. <i>Parus major</i> (L.)	s.
208. <i>Aegithalos caudatus</i> (L.)	s.
209. <i>Regulus regulus</i> (L.)	n.
210. <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf)	n.

211. <i>Locustella naevia naevia</i> (Bodd.)	n. spor.
212. <i>Acrocephalus aquatica</i> (Gm.)	n?
213. <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)	n.
214. <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)	n.
215. <i>Acrocephalus dumetorum</i> (Blyth)	n.
216. <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	n.
217. <i>Phylloscopus viridanus</i> (Blyth)	n.
218. <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechst.)	n.
219. <i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)	n.
220. <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieill.)	n.
221. <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.)	n.
222. <i>Sylvia communis</i> (Lath.)	n.
223. <i>Sylvia borin</i> (Bodd.)	n.
224. <i>Sylvia curruca</i> (L.)	n.
225. <i>Sylvia atricapilla</i> (L.)	n.
226. <i>Luscinia philomela</i> (Bechst.)	n.
226. <i>Luscinia philomela</i> (Bechst.)	n.
227. <i>Cyanecula svecica svecica</i> (L.)	n.
228. <i>Cyanecula svecica cyanecula</i> (Wolf)	n.
229. <i>Eritacus rubecula</i> (L.)	n.
230. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)	n.
231. <i>Pratincola rubetra</i> (L.)	n.
232. <i>Saxicola oenanthe</i> (L.)	n.
233. <i>Prunella modularis</i> (L.)	n.
234. <i>Merula merula</i> (L.)	n.
235. <i>Turdus viscivorus</i> (L.)	n.
236. <i>Turdus philomelus</i> (Brehm)	n.
237. <i>Turdus musicus</i> (L.) (= <i>iliacus</i> auct.)	n.
238. <i>Turdus pilaris</i> (L.)	n. spor.; h.?



по фаунѣ, XV.